

Appendiks 4 til T.S. Jensen *et al.* 2023: Ynglefuglenes bestandsudvikling i en dansk blandskov 1966, 1973 og 1997-2020. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 117: 185-199.

Pearson-korrelationskoefficienter for observationer af ynglefugle i Søvind Skov sammenlignet med antallet af ynglefugle i Strødamreservatet (N = 17) 1997-2014 (Meltofte *et al.* 2016). Statistisk signifikante værdier (P < 0,05) er angivet med fede typer.

Pearson correlation coefficients between the number of breeding pairs in Søvind Skov and in the Strødam Reserve (Meltofte et al. 2016). Statistically significant values (p < 0.05) are shown in bold.

| Art Species | r_{pearson} | P |
|--|----------------------------|--------------|
| Ringdue <i>Columba palumbus</i> | 0,45 | 0,064 |
| Sortmejse <i>Periparus ater</i> | -0,49 | 0,093 |
| Sumpmejse <i>Poecile palustris</i> | 0,05 | 0,838 |
| Blåmejse <i>Cyanistes caeruleus</i> | 0,06 | 0,803 |
| Musvit <i>Parus major</i> | -0,27 | 0,282 |
| Løvsanger <i>Phylloscopus trochilus</i> | 0,02 | 0,949 |
| Gransanger <i>Phylloscopus collybita</i> | -0,06 | 0,816 |
| Munk <i>Sylvia atricapilla</i> | -0,10 | 0,680 |
| Gærdesmutte <i>Troglodytes troglodytes</i> | 0,63 | 0,006 |
| Spætmejse <i>Sitta europaea</i> | 0,07 | 0,789 |
| Sangdrossel <i>Turdus philomelos</i> | 0,24 | 0,332 |
| Solsort <i>Turdus merula</i> | -0,02 | 0,951 |
| Rødhals <i>Erithacus rubecula</i> | 0,31 | 0,204 |
| Jernspurv <i>Prunella modularis</i> | 0,57 | 0,014 |
| Bogfinke <i>Fringilla coelebs</i> | -0,35 | 0,160 |