

logisk Forenings Tidsskrift and FO Feltornithologen. Short commentary notes are added for some species.

Records of 63 species have been approved in 1970. Among these the following are new to Denmark: *Diomedea* sp. (probably *D. melanophris*), *Phoebezia* sp., Marsh Sandpiper (*Tringa stagnatilis*), Subalpine Warbler (*Sylvia cantillans*), Common Grackle (*Quiscalus quiscula*) and Black-

headed Bunting (*Emberiza melanocephala*). The two last-mentioned may have been escapes. Green Sandpiper (*Tringa ochropus*) was new to the Faeroes. Hoopoe (*Upupa epops*) bred for the first time for nearly a century. Two records of Pallas' Sandgrouse (*Syrrhaptes paradoxus*) from northern Jutland in May and October have parallels in records from Finland, Lapland, Holland and Britain in the same periods.

LITTERATUR

- DYCK, J., J. RAMSØE JACOBSEN, E. KRAMSHØJ og J. RABØL, 1970: Rapport fra sjældenhedsudvalget med oversigt over godkendte forekomster 1965-69. — Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 64: 126-151.
- FERGUSON-LÉES, I. J. og J. T. R. SHARROCK, 1969: Recent reports. — Brit. Birds 62: 452.
- HUMMEL, D. og R. BERNDT, 1971: Der Einfluss der Grosstrappe (*Otis tarda* L.) nach West-Europa im Winter 1969/70. — Journ. f. Ornith. 112: 138-157.
- LØRPENTHIN, B., 1967: Danske ynglefugle i fortid og nutid. — Odense.
- PREUSS, N. O., 1967: Savisanger (*Locustella luscinioides*) i Danmark 1964 og 1965. — Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 61: 164-167.
- SALOMONSEN, F., 1963: Oversigt over Danmarks Fugle. — København.
- , 1967: Fuglene på Grønland. — København.
- SMITH, F. R., 1968: Report on rare birds in Great Britain in 1967. — Brit. Birds 61: 329-365.
- WARHAM, J., W. R. P. BOURNE og H. F. I. ELLIOTT, 1966: Albatross identifikation in the North Atlantic. — Brit. Birds 59: 376-384.
- WILLIAMSON, K., 1970: The Atlantic Islands. — London.

Manuskriptet modtaget 19. juli 1971.

Mindre meddelelser

Iagttagelser, som er godkendt af sjældenhedsudvalget, er mærket med stjerne (*).

Records approved by the rarity-commitee are marked with asterisk ()*.

IAGTTAGELSER FRA FÆRØERNE 1970

Under et »Ø-krydstogt« arrangeret af »The National Trust for Scotland« var jeg d. 26. maj 1970 i land på Sandø. Her hørte og så jeg en Svaleklire (*Tringa ochropus*)* ved enden af Sandsvatn. Dette er første iagttagelse på Færøerne.

Senere, ved et vandhul nær nordenden af Grót-húsvatn, så Dr. W. J. EGELING og jeg en Tink-smed (*Tringa glareola*)*; denne er den femte rekord fra Færøerne.

Af ænder sås denne dag 2 par + 1 ♂ af Pibe-and (*Anas penelope*) ved Gréthúsvatn; i alt 16 Troldænder (*Aythya fuligula*) (de fleste i en lille flok, men også enkelte par) i Sandsvatn; 2 par Toppet Skallesluger (*Mergus serrator*) i Sandsvatn; 1 Krikand (*Anas crecca*) ved Hálsavatnar; og 1 par Gråænder (*Anas platyrhynchos*) ved Grót-húsvatn.

Af andre vadefugle sås en flok Stenvendere (*Arenaria interpres*) (17-18 stk.) flyvende mod havet nær sydenden af Grót-húsvatn, mens 10 Stor

Kobbersneppe (*Limosa limosa*) og 2 Odinshøns (*Phalaropus lobatus*) sås i samme område. Almindelige Ryler (*Calidris alpina*) og Store Præstekraver (*Charadrius hiaticula*) sås også her.

Blandt mere interessante spurvefugle kan nævnes en Allike (*Corvus monedula*) (uden tydelig grå nakkeplet) fouragerende i den eksponerede jord i en kartoffelmark nær den lille fyreplantage ved nordenden af Sandsvatn. En Gransanger (*Phylloscopus collybita*) sang fra træerne og syngeende Sanglærker (*Alauda arvensis*) hørtes to steder på heden. Tidligere den samme dag var en Gransanger og en Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*) blevet hørt og set i haver nær kajen i Tvøroyri, Suderø. Dr. W. J. EGELING så en Dværg-falk (*Falco columbarius*) angribe Gråspurve (*Passer domesticus*) i byen.

I fyreplantagen på Sandø var der også et par Ringduer (*Columba palumbus*), men jeg ledte forgæves efter bevis for ynglen. Ringduer sås også den næste dag, d. 27., i plantagen ved Tórshavn,

og ANDRIAS REINART fortalte mig, at han fandt en rede, hvor yngelen lykkedes, i 1969. I plantagen ved Tórshavn sang endvidere en Bogfinke (*Fringilla coelebs*) og en Vindrossel (*Turdus iliacus*) sås.

Den mest iøjnefaldende ændring i plantagens fuglefauna sammenlignet med tidligere besøg var imidlertid det store antal Solsorte (*Turdus merula*). Denne art siges at have ynglet første gang i Tórshavn i 1947 og blev måske ikke en regelmæssig ynglefugl her før midt i 1950'erne; nu er den veletableret som ynglefugl i og omkring byen. Jeg brugte to timer om eftermiddagen d. 27. til at skønne bestandens størrelse i plantagen, og føler mig ret sikker på, at der var 20-25 par (jeg har megen erfaring i ynglefugleoptællinger i skove fra England). Mange af fuglene sang. Flere af parrene havde udflojne unger, som så ud til at have været udflojne ca. en uge, hvilket indicerer at ynglesæsonen skulle være startet i anden eller tredie uge af april.

Jeg takker Dr. W. J. EGGELING og Mr. og Mrs. G. WATERSTON for at have bidraget med iagttagelser.

K. WILLIAMSON
Beech Grove, Tring, Hertfordshire, England

SUMMARY: Observations in the Faeroe Islands, 1970. — A Green Sandpiper (*Tringa ochropus*)*

and Wood Sandpiper (*Tringa glareola*)* were seen at the lakes Sandsvatn and Gróthúsvatn respectively, on Sandoy, Faeroe Islands, on 26th May 1970. These are the first and fifth records for the islands. Also observed were two pairs plus a ♂ Wigeon (*Anas penelope*) and a total of 16 Tufted Ducks (*Aythya fuligula*), some in pairs.

Passerines recorded were a Jackdaw (*Corvus monedula*), a Chiffchaff (*Phylloscopus collybita*) (one, and a Willow Warbler (*Ph. trochilus*), also in song at Tvøroyri, Suduroy, on 25th-26th); while the small pine plantation at the head of Sandsvatn contained a pair of Woodpigeons (*Columba palumbus*). Another pair was disturbed on 27th June in the large plantation at Torshavn, where ANDRIAS REINART first proved the breeding of this species in summer 1969. A Chaffinch (*Fringilla coelebs*) was in song and a Redwing (*Turdus iliacus*) was seen.

The most striking difference from many previous visits to the Torshavn plantation was the large number of Blackbirds (*Turdus merula*) present, between 20-25 pairs. Clearly this bird, which first nested in Faeroe in 1947 and did not do so regularly till the mid-1950's, is now a well established breeding bird. Several pairs were attending fledged young which appeared to be at least a week out of the nest, indicating an onset of nesting in the second and third weeks of April.