

transatlantic migration. There is one recovery of *Plectrophenax nivalis* ringed in West Greenland, and one of this species ringed in Northeast Greenland. The latter recovery is of some interest. It has been well documented that the Northeast Greenland population winters in Russia, in which country five winter and spring recoveries have been made.

The present recovery, made in the Shetland Islands, is the first one from the autumn migration. It may show that the migration from Northeast Greenland passes to the southeast, *via* the British Isles, or that it is a case of drift-migration due to N.W.-storms, but it is not possible to draw any conclusions from a single recovery.

Manuskriptet modtaget 26. marts 1965

Forfatterens adresse: Dr. phil. FINN SALOMONSEN

Zoologisk Museum, Universitetsparken 15,

København Ø.

Mindre meddelelser

Tagttagelser, som er godkendt af sjældenhedsudvalget, er mærket med stjerne (*).

Records approved by the rarity-committee are marked with asterisks ().*

SOLSORT

(*Turdus merula*)

SYNGENDE PÅ USÆDVANLIGT TIDSPUNKT

Den 15. januar 1965 kl. 23.56 hørtes en syngende Solsort (*Turdus merula*) i højhuskvarteret ved Roskildevej vest for København.

Fuglen sang kraftigt, idet den tydelig kunne høres på den anden side af den på dette tidspunkt stadig ret befærdede hovedvej. Der var således ikke tale om svag »subsong«, som ikke sjældent høres fra Solsorte i vinterhalvåret.

Det, hvad årstiden angår, usædvanlige tidspunkt, må utvivlsomt ses i forbindelse med det for årstiden milde vejr, som havde hersket de foregående dage. På sangtidspunktet var temperaturen + 3° C, det blæste en del fra SV og regnede let. SNOW (1958) angiver, at den første sang som regel høres i mildt, fugtigt og stille vejr, mens tørt og blæsende vejr omvendt hæmmer sangudfoldelsen. I Oxford, hvor SNOW studerede Solsortene, har han tidligst hørt arten synge den 4. februar.

Også tidspunktet på døgnet er usædvanligt for arten, som ikke normalt synger om natten, men morgen eller aften. SNOW nævner ikke noget om nattesang og Dr. BONDESEN har meddelt mig (i brev), at han heller ikke kender til noget sådant.

Jeg har i de foregående år flere gange tidligere hørt nattesang fra Solsorte i samme kvartér, men

det har altid været i artens typiske sangperiode om foråret. Den 28. marts 1965 hørtes den samme (?) fugl igen, og det konstateredes, at den sad i ung egebevoksning ca. 5 m fra den kraftigt belyste hovedvej. Hvorvidt nattesangen kan hænge sammen med den stærkere belysning i området, som følge af højhuse og hovedvej, kan man kun gisne om, men det er jo kendt at nogle fugle kan ændre deres aktivitetsperiode i storbyens lyshav, jvf. duerne på »Strøget« i København.

Formodentlig er der dog tale om et abnormt eksemplar.

JAN DYCK

Valhøjs Allé 85, 6, Vanløse.

SUMMARY: Blackbird (*Turdus merula*) singing at an unusual time. – A Blackbird was heard singing clear and loudly about midnight on 15. January and again on 28. March 1965 near Copenhagen. The bird – probably an abnormal specimen – was perched near a high-way when singing and possibly influenced by the artificial light.

LITTERATUR

Snow, D.W., 1958: A Study of Blackbirds. – London.

IAGTTAGELSER AF
MINDRE ALMINDELIGE FUGLE PÅ
SYDVESTAMAGER,
1960-1963.

I de senere år har et stadig stigende antal ornithologer foretaget observationer af fugle på Amager. I denne oversigt er i summarisk form samlet oplysninger om iagttagelser af en række mindre almindelige arter. Der er opgivet dato, arten, antallet, lokaliteten, samt enkelte bemærkninger. Forkortelserne »rst« og »trk« betyder henholdsvis rastende og trækkende fugle. Følgende personer har leveret materiale til denne oversigt (i parentes den forkortelse, som er anvendt i oversigten) PELLE ANDERSEN-HARILD (P.A.H.), TIM ANDERSEN (T.A.), STEEN CHRISTENSEN (S.C.), POUL HANSEN (P.H.), ERIK KRAMSHØJ (E.K.), ERIK NIELSEN (E.N.) og JOHN SPEICH (J.S.).

Kongelunden, samt stranden vest og sydvest herfor går under betegnelsen Kongelunden.

HVID STORK (*Ciconia ciconia*).

1962: 5. juni 1 rst. Kongelunden (T.A.).

SANGSVANE (*Cygnus cygnus*).

1963: 11. maj 1 rst. Kongelunden (P.A.H.).

PIBESVANE (*Cygnus columbianus bewicki*).

1960: 1. april 7 trk. Kongelunden (S.C.).
1961: 22. marts 6 trk. Kongelunden (S.C.); 8. okt. 1 ad. rst. Kongelunden (P.A.H., E.K., E.N.).
1962: 18. marts 3 rst. Kongelunden (T.A.); 12. okt. 50 trk. Kongelunden (T.A.); 10. nov. 1 rst. Kongelunden (S.C.).
1963: 21. april 18 trk. Kongelunden (S.C., T.A.).

BLISGÅS (*Anser albifrons*).

1960: 8. april 10 trk. Kongelunden (T.A.); 2. okt. 2 trk. Kongelunden (P.A.H.).

BRAMGÅS (*Branta leucopsis*).

1961: 17. marts 1 trk. Kongelunden (S.C.); Dec. 1961-jan. 1962. 1 holdt til i en tamgåseflok i Dragør, var tilsyneladende i god form.
1963: 13. april ca. 180 trk. SØ Kongelunden (J.S., E.K.); 1. maj 9 trk. Kongelunden (S.C.); 3. maj 1 trk. Kongelunden (S.C.).

KNORTEGÅS (*Branta bernicla*).

1960: 1. okt. 3 trk. Kongelunden (P.A.H.); 2. okt. 3 trk. Kongelunden (P.A.H.); 20. okt. 8 trk. Kongelunden (P.A.H.).
1961: 9. april 1 trk. Kongelunden (S.C.).
1962: 20. april 50 trk. SW Kongelunden (T.A.); 13. maj 6 rst. Kongelunden (T.A.); 30. sept. 1 trk. Kongelunden (P.A.H., E.K., E.N.); 7. okt. 3 rst. Kongelunden (E.K., T.A., J.S.).

LILLE SKALLESLUGER (*Mergus albellus*).

1962: 22. juli 1 hun Kongelunden (J.S.).

HAVØRN (*Haliaetus albicilla*).

1963: Februar 1-3 fugle (juv.) sås dagligt igennem hele måneden, de holdt fortrinsvis til på Kalvebod skydeterræn samt på isen i Køge Bugt, men brugte Kongelundskoven som overnatningssted (S.C., T.A., E.N., J.S., E.K.).

DUEHØG (*Accipiter gentilis*).

1961: 9. april 1 trk. Kongelunden (S.C.); 9. sept. 1 trk. Kongelunden (S.C.).
1962: 24. nov. 1 trk. Kongelunden (J.S.).
1963: 16.-17. feb. 1 rst. Kongelunden (S.C., E.N.).

RØD GLENTE (*Milvus milvus*).

1960: 4. sept. 2 trk. Kongelunden (S.C.).
1961: 7. april 1 trk. Kongelunden (S.C.).
1962: 24. marts 1 trk. Kongelunden (P.H.).
1963: 7. april 1 rst. Kongelunden (T.A.); 15. april 1 trk. Aflandshage (S.C., E.K.); 16. april 2 trk. Aflandshage (E.K.); 18. april 1 rst. Kongelunden (E.K.); 19. april 1 trk. Kongelunden (T.A.); 28. juli 1 trk. NØ Kongelunden (S.C., T.A.).

BLÅ KÆRHØG (*Circus cyaneus*).

1963: 2. maj 1 trk. Kongelunden (S.C.).

HEDEHØG (*Circus pygargus*).

1963: Juli-august 1 juv. holdt til på Kalvebod skydeterræn (S.C., T.A.).

FISKEØRN (*Pandion haliaetus*).

1960: 2. april 1 trk. Kongelunden (S.C.); 15. april 1 trk. Kongelunden (S.C.).
1961: 4. sept. 2 trk. Kongelunden (S.C.).
1962: 1. april 1 trk. Kongelunden (J.S., P.A.H., E.N.); 5. april 1 trk. Kongelunden (J.S., E.K.); 7. april 1 trk. Kongelunden (S.C.); 29. april 1 trk. Kongelunden (T.A.); 14. maj 1 trk. Kongelunden (E.K., J.S.); 18. maj 1 trk. Kongelunden (T.A.); 1. juli 1 trk. NØ Aflandshage (S.C.); 31. aug. 3 rst. Kongelunden (T.A.); 7. sept. 1 trk. Kongelunden (T.A.); 9. sept. 1 trk. Kongelunden (T.A.); 14. sept. 1 trk. Kongelunden (T.A.); 15. sept. 2 trk. Kongelunden (E.K.).
1963: 31. marts 1 trk. Kongelunden (T.A.); 5. april 1 trk. Kongelunden (T.A.); 7. april 1 trk. Kongelunden (E.K.); 8. april 1 trk. Kongelunden (T.A.); 10. april 1 rst. Kongelunden (T.A.); 11. april 5 trk. Kongelunden (T.A., S.C., E.K., J.S.); 12. april 3 trk. Kongelunden (T.A., S.C.); 11. maj 1 trk. Kongelunden (T.A., S.C.); 26. juli 1 trk. WSW Kongelunden (T.A., S.C.); 3. aug. 1 trk. Aflandshage (S.C.); 14. aug. 1 rst. Aflandshage (S.C.); 18. aug. 2 (1 rst. 1 trk.) Kongelunden (T.A., J.S.), 4. sept. 1 rst. Kongelunden (T.A.); 11. sept. 1 trk. Kongelunden (T.A.); 16. sept. 1 trk. Kongelunden (J.S.); 18. sept. 1 rst. Kongelunden (S.C.).

LÆRKEFALK (*Falco subbuteo*).

1960: 18. april 1 rst. Kongelunden (S.C.); 29. april 1 trk. Kongelunden (S.C.), 20. maj 1 trk. Konge-

lunden (S.C.); 6. juni 1 trk. Kongelunden (S.C.); 26. aug. 1 trk. Kongelunden (S.C.); 29. aug. 1 trk. Kongelunden (S.C.); 4. sept. 1 trk. Kongelunden (S.C.); 11. sept. 1 trk. Kongelunden (P.A.H.). 1961: 11. maj 1 trk. Kongelunden (S.C.); 4. sept. 1 trk. Kongelunden (S.C.); 8. sept. 3 (2 trk. 1 rst.) Kongelunden (J.S., S.C.); 9. sept. 2 trk. Kongelunden (S.C.); 10. sept. 2 rst. Kongelunden (E.K., E.N., J.S.); 16. sept. 2 rst. Kongelunden (E.K., E.N.).

1963: 11. maj 1 rst. Kongelunden (T.A.); 18. aug. 1 rst. Kongelunden (T.A.); 11. sept. 1 trk. Kongelunden (T.A.); 20. sept. 1 rst. Kongelunden (T.A.).

VANDREFALK (*Falco peregrinus*).

1960: 27. aug. 1 trk. Kongelunden (S.C.); 19.–20. okt. 1 rst. Kongelunden (P.A.H.).

1961: 13. aug. 1 rst. Kongelunden (T.A.); 20. aug. 2 rst. Kongelunden (T.A., S.C.); 8. sept. 1 rst. Kongelunden (J.S.); 14. okt. 1 trk. Kongelunden (S.C.).

1962: 17. sept. 1 rst. Kalvebod skydeterrain (T.A.); 12.–15. okt. 1 rst. Kalvebod skydeterrain (T.A.).

1963: 10. maj 1 trk. Kongelunden (J.S.).

TRANE (*Grus grus*).

1962: 24. april 61 trk. Kongelunden (T.A., J.S.); 1. maj 1 trk. Kongelunden (E.N.); 17. juli 17 trk. SSW Kongelunden (S.C.).

1963: 8. april 14 trk. Kongelunden (T.A.); 14. april 1 trk. Kongelunden (J.S., E.K.); 27. april 8 trk. Kongelunden (S.C.); 7. maj 1 trk. Kongelunden (S.C.); 12. maj 6 trk. WSW Kongelunden (T.A.); 21. sept. 8 trk. Kongelunden (S.C.).

VANDRIKSE (*Rallus arquatius*).

1960: 6. nov. 1 rst. Kongelunden (S.C.).

PLETTET RØRVAGTEL (*Porzana porzana*).

1963: 12. maj 1 rst. Kongelunden (T.A., S.C., J.S.).

STRANDSKADE (*Haematopus ostragelus*).

1962: 4. feb. 1 trk. SW Dragør Havn (J.S., E.K., P.A.H.).

HVIDBRYSTET PRÆSTEKRAVE (*Charadrius alexandrinus*).

1960: 26. april 1 rst. Kongelunden (S.C.).

1962: 21. juli 1 rst. Kongelunden (T.A.).

1963: 18. juni 1 rst. Kongelunden (T.A.).

HJEJLE (*Pluvialis apricaria*).

1960: 6. nov. ca. 7000 rst. Kalvebod skydeterrain (S.C., P.A.H.).

DOBBELTBEEKASIN (*Gallinago gallinago*).

1961: 3. sept. 200 rst. Aflandshage (P.A.H.).

SKOVSNEPPE (*Scolopax rusticola*).

1961: 27. dec. 1 rst. Kongelunden (J.S., E.K.); 29. dec. 2 rst. Kongelunden (J.S., E.K.).

1963: 6. jan. 1 rst. Aflandshage (S.C., E.K., E.N.);

6. april 12 rst. Kongelunden (T.A.).

STOR KOBBERSNEPPE (*Limosa limosa*).

1960: 8. maj 1 rst. Kongelunden (S.C.).

1961: 3. juli 1 rst. Kongelunden (S.C.); 9. juli 1 rst. Kongelunden (S.C.).

1962: 28. marts 1 rst. Kongelunden (T.A.); 1. maj 3 rst. Kongelunden (T.A.); 5. maj 1 rst. Kongelunden (S.C.); 1. juli 2 trk. Aflandshage (S.C.);

19. juli 1 rst. Aflandshage (S.C.); 30. juli 1 rst. Kongelunden (J.S., T.A.).

1963: 11. april 1 rst. Kongelunden (T.A.); 20. april 1 rst. Aflandshage (S.C., E.K.); 21. april 1 rst. Kongelunden (T.A.).

TINKSMED (*Tringa glareola*).

1961: 17. juli 225 rst. Aflandshage (S.C.).

1962: 16. juli 200–225 Aflandshage og Kongelunden (P.A.H.).

ISLANDSK RYLE (*Calidris canutus*).

1962: 3. aug. 104 rst. Aflandshage (T.A.).

SORTGRÅ RYLE (*Calidris maritima*).

1960: 31. jan. 1 rst. Kongelunden (S.C.); 6.–7. feb. 2 rst. Kongelunden (P.H., S.C.); 5. marts 1 rst. Kongelunden (S.C.); 20. marts 1 rst. Aflandshage (S.C., D.H.).

1963: 10. maj 1 trk. Kongelunden (J.S.).

KRUMNÆBBET RYLE (*Calidris ferruginea*).

1961: 17. maj 1 rst. Kalvebod skydeterrain (S.C.).

1962: 18. maj 1 rst. Kongelunden (E.N.).

DVÆRGRYLE (*Calidris minuta*).

1961: 15. maj 2 rst. Kongelunden (S.C.); 16. maj 1 rst. Kongelunden (S.C.); 18. maj 2 rst. Kongelunden (S.C.).

1962: 21. maj 2 rst. Aflandshage (S.C.).

1963: 14. juni 2 rst. Kongelunden (T.A., S.C.).

SANDLØBER (*Crocethia alba*).

1961: 10. sept. 1 rst. Kongelunden (P.A.H.).

1962: 16. juli 1 rst. Kongelunden (P.A.H.); 30. juli 1 rst. Kongelunden (T.A.); 31. juli 2 rst. Kongelunden (T.A.); 5. aug. 1 rst. Kongelunden (S.C.); 9. aug. 1 rst. Kongelunden (T.A.); 10. aug. 2 rst. Kongelunden (T.A.); 11. aug. 1 rst. Kongelunden (T.A.); 18. aug. 2 rst. Aflandshage (S.C.); 26. aug. 1 rst. Kongelunden (E.N.).

1963: 3. aug. 1 rst. Aflandshage (S.C.); 6. aug. 1 trk. Aflandshage (S.C.); 10. aug. 1 rst. Kongelunden (T.A.).

(fortsættes)

STEEN CHRISTENSEN,
ERIK KRAMSHØJ.

SUMMARY: In the last years a number of ornithologists have made regular observations on birds on the island Amager, situated south of Copenhagen. In this paper records of some less common species are listed. The observations were made by five young ornithologists. The informations given are: species, date, number, place, and some remarks. Abbreviations "rst." and "trk." stand for "stationary in the area" and "on migration" respectively.

ENKELTE FOREKOMSTER AF SJÆLD-
NERE DANSKE FUGLE

Ved publiceringen af FINN SALOMONSENS »Oversigt over Danmarks Fugle« (1963) med de mere detaljerede oplysninger i »Nordens Fugle i Farver«, bind 7, er den aktuelle viden om vor fugleverden lagt frem til gennemsyn, og kan kun virke inspirerende på videre undersøgelser — særlig velkommen er de præcise oplysninger der i denne fugleliste har afløst mange af de tidligere anvendte mere generelle og ofte vage angivelser.

Hovedsagelig efter en gennemgang af fuglesamlingen i Naturhistorisk Museum, Århus, kan jeg bidrage med nogle upåagtede forekomster af mere sjældne arter. Museumsinspektør, dr. phil. P. BONDESEN og konservator JAKOBSEN er jeg tak skyldig for venlig bistand.

SODFARVET SKRÅPE (*Puffinus griseus* (GM))*

Et individ fra Endelave, efteråret 1952, er af skolebestyrer BERTHELSEN skænket til Naturhistorisk Museum.

AMERIKANSK RØRDRUM (*Botaurus lentiginosus* (MONT.))*

Et eksemplar på Naturhistorisk Museum blev skudt ved Tingmiarmiut s. f. Angmagsalik i januar 1963. Fuglen var i god stand, da den blev nedlagt (B. BREDMOSE). Det er første gang Amerikansk Rørdrum er truffet på Grønlands østkyst. På det tørre skind har jeg taget målene: vinge (flad): 252 mm, hale: 91 mm, tarse: 86 mm, næb (til fjer): 69 mm.

HVIDØJET AND (*Aythya n. nyroca* (GÜLD.))*

Den 1. september 1958 blev en ung ♀ skudt i Skjern enge. Findes nu i Naturhistorisk Museums samling.

RUSTAND (*Tadorna ferruginea* (PALL.))*

På Naturhistorisk Museum en adult ♂ skudt nær Udbyhøj, Randers Fjord (E. SØRENSEN), den 30. august 1952.

LILLE SKRIGEØRN (*Aquila p. pomarina* BR.)*

Den 26. august 1957 blev en ♂ skudt ved et fasaneri i Krenkerup, Lolland (medd. L. NOVROP). Den findes nu i Naturhistorisk Museum.

ØRKENLØBER (*Cursorius c. cursor* (LATH.))*

En fugl skudt i Hanstholm den 5. oktober 1955, findes i privat samling. Ørkenløberen blev om morgenen opdaget på skolens legeplads, hvor drenge forgæves forsøgte at fange den, da den trods uskadte vinger ikke prøvede at flyve, men pilede lynhurtigt omkring på ganske nært hold. Konservator STAUSHOLM, Vildsund, meddeler, at det ikke var muligt at bestemme fuglens køn, da den var stærkt forskudt.

STOR GULBENET KLIRE (*Tringa melanoleuca* (GM))*

En adult ♂ nedlagt den 24. maj 1961 ved Thule, Grønland (SVARRER). Fuglen findes nu i Naturhistorisk Museums skindsamling, og jeg har taget målene: vinge (flad): 187, tarse: 59, mellemtå: 43, og næb (fra skal): 58 mm.

BLÆDER (*Merops apiaster*)*

I Naturhistorisk Museum en ♀ fra Stege, Møn, den 29. august 1960.

I privat samling har jeg desuden fundet en adult Blæder fra Åkirkeby, Bornholm, 30. juni 1952.

TRETÅET SPÆTTE (*Picoides t. tridactylus* (L.))*

Den 4. januar 1941 blev en ♂ skudt i Uggerby Pl., i Vendsyssel, (J. HIMMELSTRUP). Spætten findes i privat samling, og er den tredje sikre forekomst i Danmark fra 1941—42 — med to fra Uggerby Pl.

POUL HALD MORTENSEN

SUMMARY: Some records of rare birds in Denmark. — The author has in the Natural History Museum, Århus, and other collections found some specimens of rare birds, i.e. the following (place and date of the record are given in brackets): *Puffinus griseus* (Endelave, autumn 1952), *Botaurus lentiginosus* (Angmagsalik, Greenland, January 1963), *Aythya nyroca* (Skjern, 1. September 1958), *Tadorna ferruginea* (Randers Fjord, 30. August 1952), *Aquila pomarina* (Lolland, 26. August 1957), *Cursorius cursor* (Hanstholm, 5. October 1955), *Tringa melanoleuca* (Thule, Greenland, 24. May 1961), *Merops apiaster* (one Møn, 29. August 1960; one Bornholm, 30. June 1952), *Picoides tridactyla* (Vendsyssel, 4. January 1941).