

Mindre meddelelser

Amerikansk Rørdrum

(*Botaurus lentiginosus* (Mont.))
ny for Danmark.

Den 10. november 1961 fik jeg fra Fanø tilsendt en rørdrum, som viste sig at være en Amerikansk Rørdrum.

En hund havde fanget rørdrummen og bidt den i ryggen.

Det var en hun, der målte 59 cm fra næbspids til halespids. Vinge 22,8 cm, hale 7,9 cm, tarse 7,5 cm og overnæb fra mundvig 9,5 cm.

Kun få gange har denne art vist sig i Europa som tilfældig gæst i Spanien, på De Britiske Øer og Kanaløerne, Færøerne og Island*). Fundet på Fanø er derfor meget interessant, og en ny fuglearart er dermed konstateret i Danmark.

LEO NOVBRUP




Fig. 1. Den amerikanske Rørdrum.

Fig. 1. American Bittern

*) På De Britiske Øer er den truffet ca. 40 gange.

RED.

Sort Glente

(*Milvus migrans* (Bodd.))
på Fanø.

Den 19. april 1962 kl. 9,10 iagttoges en Sort Glente på Fanø's nordspids. Den kom flyvende fra klitterrænet ud over strandengen og fortsatte mod stranden i nordlig retning.

FREDDY LARSEN, JENS GRAFF

Sort Glente

(*Milvus migrans* (Bodd.))
ved Henne Strand.

Under et ophold ved Henne Strand iagttoges den 19. april 1962 kl. 11,30 en Sort Glente.

Fuglen kom langs klitrækken og forsvandt nordpå, den var alene. Der var næsten ingen vind (svag østenvind), overskyet men god sigt.

FREDDY JENSEN

Ederfugl

(*Somateria mollissima* (L.))
i Upperslev Mose.

Den 5. maj 1962 iagttoges en udfarvet Ederfugl han ved Tegholmen i Upperslev Mose.

HENNING JENSEN

Vinterforekomster af Svaleklire

(*Tringa ochropus* L.)
i Sydsjælland.

Ved Holløse Mølle ved Susåen sås den 14. januar og den 25. februar 1961 en Svaleklire, den 31. januar samme år sås tre eksemplarer på en gang. I vinteren 1961—62 fandtes ved gentagne besøg ingen overvintrende Svaleklirer.

JOHN ANDERSEN

**Supplerende oplysninger om
Odinshannens
(*Phalaropus lobatus* (L.))
trækforhold.**

Civilingeniør N. HESSELBJERG CHRISTENSEN meddeler i D.O.F.T. **55**, 1961, p. 224, nogle interessante oplysninger vedrørende *O d i n s h a n n e n s* træk. Jeg kan supplere disse med et par iagttagelser, som muligvis kan bidrage til vort kendskab om artens trækveje.

Den 1. maj 1959 besøgte jeg sammen med hr. OLE GEERTZ-HANSEN og hr. HANS-JØRGEN SPEYER et stort moseområde, der er beliggende på Den Iranske Højslette, ca. 80 km. vest for Teheran. Blandt andre vadefugle så vi ser en flok på ca. 40 *O d i n s h ø n s*.

Man har længe været klar over, at der går et betydeligt vadefugletræk mellem Det Kaspiske Hav og Den Persiske Golf. I det sydvestlige hjørne af Det Kaspiske Hav, ved havnebyen Pahlevi, er der foretaget adskillige interessante iagttagelser. Derimod foreligger der så godt som ingen trækobservationer fra det sydøstlige hjørne af Det Kaspiske Hav, fra distriktet Gurgan.

Hr. HANS-JØRGEN SPEYER meddeler mig (in litt.), at han den 27. april 1961 besøgte Gurgan. I nogle strandsøer syd for byen Bander Shah så han mindst 10.000 *O d i n s h ø n s*, næsten alle i vinterdragt. Fuglene var genstand for en ejendommelig form for jagt, idet den lokale befolkning dræbte adskillige ved hjælp af stenslynger, som blev kastet lavt over vandet og lige ind i flokkene. Jeg nævner dette, fordi det efter min mening synes at vise, at denne masseforekomst af *O d i n s h ø n s* slet ikke var nogen tilfældig forekomst, men måske en årlig tilbagevendende foreteelse.

Også andre vadefugle blev iagttaget, bl. a. ca. 1000 *B r u s h ø n s* (*Philomachus pugnax* (L.)) og 6—800 *S t y l t e l ø b e r e* (*Himantopus himantopus* (L.)).

Området vil sikkert vise sig at være en vadefuglelokalitet af de helt store.

Litteratur

Schüz, Ernst, 1959: Die Vogelwelt des südkaspischen Tieflandes.

BENT PORS NIELSEN

**En aprilagttagelse af Hvepsevåge
(*Pernis apivorus* (L.)).**

I tilknytning til hr. JØRGEN VILLER-SLEV HANSENS meddelelse om tidlige iagttagelser af *H v e p s e v å g e* i D.O.F.T. **55**, 1961, p. 162, kan jeg oplyse følgende

Den 27. april 1961 så jeg i Hornbæk et rovfugletræk, der bestod af: 2 *F i s k e ø r n e* (*Pandion haliaetus* (L.)), 5 *H e p s e v å g e r* (*Pernis apivorus* (L.)), 2 *M u s v å g e r* (*Buteo buteo* (L.)), 3 ubestemte *V å g e r* (*Buteo/Pernis*), 2 *S p u r v e h ø g e*, (*Accipiter nisus* (L.)) samt 1 *L æ r k e f a l k* (*Falco subbuteo* (L.)). Vinden var øst, styrke 1. De fleste af fuglene fløj ret lavt og alle i østlig retning, langs kysten.

Trods ihærdige iagttagelser så jeg ikke flere våger før den 20. maj, da Hvepsevågernes hovedtræk satte ind.

BENT PORS NIELSEN

**Krumnæbbet Ryle
(*Calidris ferrugineus* (Pont.))
på forårstræk i Sydslesvig.**

Den 20. maj 1962 iagttog undertegnede 2 *K r u m n æ b b e d e R y l e r* i ren sommerdragt på Reesholm i Slien. De stod i en mindre vandsamling inde på holmen sammen med 4 *D v æ r g r y l e r* (*Calidris minuta* Leisler) i sommerdragt og 9 *A l m i n d e l i g R y l e* (*Calidris alpina* (L.)), hvoraf den ene var i vinterdragt og lidt derfra 2 *S o r t k l i r e r* (*Tringa erythropus* (Pall.)) fuldt udfarvede.

JØRGEN JØRGENSEN

Ellekrage
(*Coracias garrulus* L.)
på Bornholm.

Den 22. juni 1962 iagttog min kone og jeg en Ellekrage i Paradisbakkerne. Fuglen sås i en lysning med en del udgåede træer, fra hvis grene den foretog jagtudflugter efter flyvende insekter. Næste morgen iagttog jeg den et par timer, og sammen med lærer ARNE PETERSEN og SØREN P. SILLEHOVED, Neksø, tog jeg om eftermiddagen op til lokaliteten, hvor fuglen stadig opholdt sig. — Eftersøgninger de påfølgende dage gav intet resultat, muligvis på grund af oprydningsarbejde i lysningen.

GERHARD ANDERSEN.

Sommeriagttagelser af Kjover.

Den 10. juli 1961 sås fra stranden ved Læsø's sydvestlige hjørne en Storkjove (*Stercorarius skua* (Brünn)), der fløj mod sydøst nogle hundrede meter fra land. Den pågældende dag herskede på andet døgn en kraftig sydvestlig blæst.

Almindelig Kjove (*Stercorarius parasiticus* (L.)) synes at oversomre regelmæssigt på Læsø, idet op til tre fugle er iagttaget på en gang i juli måned i 1960 og 1961.

JAN DYCK

Iagttagelser af Drosselrørsanger
(*Acrocephalus arundinaceus* (L.))
i Vestsjælland.

Om Drosselrørsangeren (*Acrocephalus arundinaceus* (L.)) skriver C. A. BLUME (D.O.F.T. 53, 1959, p. 26) kort: „Drosselrørsangerens forekomst her i landet er meget sporadisk; nogle år hører man intet om den.“ Da der i overensstemmelse hermed kun er fremkommet få meddelelser om arten i D.O.F.T. de sidste 3 år, kan følgende iagttagelser måske interessere. Det drejer

sig udelukkende om (enlige?) syngende hanner.

Den 13. juni 59 hørtes 6 synge i rørskov N for kanalen, der forbinder Tystrup og Bavelse søer. Iflg. O. SCHELDE (mundtlig medd.) var der yderligere 4—5 i rørene S for omtalte kanal, så tallet kommer op på en halv snes ♂♂.

Den 24. maj 60 hørtes og sås 2 på lokalitet N, den 28. s.m.s.å. hørtes 4 og den 4. juni 3.

I Gyrstinge sø hørtes og sås 1 ♂ den 29. maj 60; samme dag hørtes og sås 1 eksp. på samme lokalitet, som er omtalt i D.O. F.T. 54, 1960, p. 59. Herfra var arten imidlertid forsvundet i 1961, hvorimod 1 eksp. atter den 11. juni 61 hørtes ved Gyrstinge sø.

KARSTEN NØRGAARD

Svaleklire
(*Tringa ochropus* L.)
som ynglefugl i Nordslesvig.

Lærer DIRCH JØRGENSEN, Slesvig, så den 9. juni på en skovvej en halvvoxen vadefugleunge foran bilen nær Søgård. Da han standsede for at sætte ungen ind til siden, så han en af de gamle fugle, en Svaleklire, sidde og skælde ud fra grenene på et ca. 10 m. højt grantræ. Der findes en mindre delvis sivomkranset skovsø tæt ved stedet.

JØRGEN JØRGENSEN

Søkonige
(*Plotus alle* (L.))
ved Liseleje.

En fugl i vinterdragt blev fundet ved stranden ud for Liseleje, Nordsjælland. Det havde i foregående dage været storm af nordvest. Fuglen var tydeligt afkræftet og døde efter et par timer.

POUL HOLM JOENSEN

Hvidøjet And
(*Aythya nyroca* (Güldenstädt))
i Stadil Fjord.

Den 6. oktober 1962 blev der skudt en Hvidøjet And, ad. ♂, i Stadil Fjord, Vestjylland. Skindet og skelettet findes nu på Vildtbiologisk Station, Kalø.

JØRGEN FOG

Observationer af Havørn
(*Haliaeetus albicilla* (L.))
ved Stevns i vinteren 1961—62.

Den 14/1 1962 blev en ungfugl set ved Gjorslev Møllesø.

Den 18/2 samme år sås en ældre Havørn med synligt hvidt på halen sydvest for havnen „Bøgeskov“.

Den 25/2 samme år, forsøgte en næsten mørkebrun ung Havørn udtræk ved Køge Sydstrand.

FINN LARSEN

Sortstrubet Bynkefugl
(*Saxicola torquata* (L.))
ved Henne Strand.

Et par sås ved Henne Strand den 30. april 1961, og på omtrent samme lokalitet igen 21. maj 1961.

POUL HOLM JOENSEN

Rødhovedet Tornskade
(*Lanius senator* L.)
ved Kærgård plantage i Vestjylland.

Den 31. juli 1961 så Thomas Thelle, Poul Holm Joensen og jeg en Rødhovedet Tornskade ved Kærgård plantage i Vestjylland.

Den fangede på tornskadevis skarnbaser, spindere og andre insekter, som den fortærede straks efter fangsten. Under hele iagttagelsesperioden var den tavs.

Tornskaden holdt sig på stedet, og i de følgende dage sås den af ca. 20 ornitologer.

BO NETTERSTRØM

Rødhovedet Tornskade
(*Lanius senator* L.)
ringmærket i Vestjylland.

I den første uge af august 1961 holdt et adult eksemplar til på et kombineret plantage- og hedeterræn nogle få kilometer SE for Henne Strand. Fuglen observeredes første gang af lærer Poul Holm Joensen, som viste mig den nogle senere. Ved daglige besøg på lokaliteten viste det sig, at den hovedsagelig levede af store Bjørnespindere, som den fangede rundt omkring på heden. Da der således var føde nok, viste fuglen heller ikke tegn til at ville forlade stedet foreløbig, hvorfor det besluttedes, at den skulle ringmærkes.

Efter mange forgæves forsøg med Bjørnespindere som lokkemad lykkedes det den 6. aug. 1961 at få fuglen til at gå i en opstillet smækfælde. Eksemplaret havde de for arten karakteristiske kendetegn: Mørke vinger med hvidt felt og dertil en meget smuk, mørk orange hætte. Efter at være blevet ringmærket blev den igen sluppet løs og kunne de første dage ofte ses i landskabet, fra hvilket den dog forsvandt 4—5 dage senere.

FLEMMING GRAND

**Den 14. Internationale
Ornithologkongres.**

Ved afslutningen af den 15. Internationale Ornithologkongres i Ithaca, USA, blev det besluttet at afholde den næste kongres i England i 1966 med Dr. David Lack som præsident. De engelske medlemmer af den Internationale Ornithologiske Komite valgte Dr. N. Tinbergen til generalsekretær, og det blev besluttet at holde kongressen i Oxford. Der blev dannet en britisk eksekutiv-komite.

Da den Internationale Ornithologiske Komite ikke fandt, at kongressen nødvendigvis måtte holdes i yngletiden (idet man mente, at den, dersom det var praktisk gennemførligt, netop burde afholdes

udenfor ynglesæsonen) besluttede den britiske komite, at kongressen skal finde sted i juli. Det er ikke muligt at samles i Oxford i august.

Den Internationale Komite har besluttet, at der ikke nødvendigvis bør afholdes ekskursioner før eller efter kongressen, og den engelske eksekutiv-komite har derfor

besluttet, hvis det er praktisk gennemførligt, kun at arrangere en ekskursion — en uges krydstogt til skotske søfugle-øer i et skib stort nok til at rumme de fleste deltagere i kongressen.

De foreløbige datoer er: 16.—23. juli 1966 for krydstogtet og 24.—30. juli 1966 for selve kongressen i Oxford.

SUMMARY IN ENGLISH

Short communications

American Bittern (*Botaurus lentiginosus* (Mont.)). An adult ♀ was taken by a dog on the island of Fanø, SW Jutland on Nov. 10th 1961.

Black Kite (*Milvus migrans* (Bodd.)). One was seen on April 19th 1962 at the island of Fanø at 9,10 a. m. and one (the same?) at 11,30 a. m. appr. at Henne Strand 30—40 km further north.

Green Sandpiper (*Tringa ochropus* L.) was found wintering at the river Suså in SW Sealand in Jan. and Feb. 1961.

Red-necked Phalarope (*Phalaropus lobatus* L.). On May 1st 1959 some 40 individuals were seen in marshes some 80 km N of Teheran, Persia. On April 27th 1961 at least 10,000 Red-necked Phalaropes were observed in lagoons S of the town of Bander Shah, District Gurgan. Simultaneously ab. 1000 Ruffs (*Philomachus pugnax* (L.)) and 6—800 Black-winged Stilts (*Himantopus himantopus* (L.)) were observed.

Hony-Buzzard (*Pernis apivorus* (L.)). One early migrant was seen on April 27th 1961 at Hornbæk, N. Sealand.

Curlew-Sandpiper (*Calidris ferrugineus* (Pont.)). Two adults in breeding plumage were observed on May 20th 1962 near Schleswig, N. Germany.

Roller (*Coracias garrulus* L.). One was observed on June 22th 1962 on the island of Bornholm.

Little Auk (*Plutus alle* (L.)). One in winter plumage was found at Liseleje, N. Sealand.

Ferruginous Duck (*Aythya nyroca* (Güldenstädt)). One ♂ adult was shot at Stadil Fjord, W. Jutland, on Oct. 6th 1962.

Stonechat (*Saxicola torquata* (L.)). A pair was observed near Henne, W. Jutland, on April 30th and on May 21st 1961.

Woodchat Shrike (*Lanius senator* L.). One adult was observed during the first ten days of August 1961 in Kærgård Plantation, W. Jutland. The bird was ringed.