



HANS MADSEN FOT.

Grønlandsk Jagtfalk (*Falco rusticolus candicans* Gm.), Bækmarksbro,
26. februar 1952.

Grønlandsk Jagtfalk (*Falco rusticolus candicans* Gm.) skudt i Danmark.

Af LEIF LYNEBORG JENSEN.

(With a summary in English: The Greenland Falcon (*Falco rusticolus candicans* Gm.) obtained in Denmark).

Et eksemplar, ♀ juv., af denne race af Jagtfalken (*Falco rusticolus* L.) blev skudt ved Bækmarksbro i Vestjylland den 26. februar 1952. Kun en gang før er Grønlandsk Jagtfalk iagttaget i Danmark, nemlig 11.1.1950 i Gribskov i Nordsjælland (LØPPENTHIN D.O.F.T. 44), men det fund, der skal omtales her, må betragtes som det første bevis på racens forekomst her i landet.

F. r. candicans yngler i den højarktiske region, fra Grønland mod vest til Alaska, muligvis også i det nordligste Sibirien,

på Baffin Island strækkende sig mod syd omtrent til Hudson strædet (SALOMONSEN 1950).

Det er naturligt at antage, at fuglen er kommet hertil fra Grønland, og den kendsgerning, at der den 10.–11. febr. rasede en ualmindelig stærk NV.-storm, taler også for denne antagelse.

På Grønland forekommer to racer af Jagtfalk ynglende, tidligere regnede man med tre, nemlig *F. r. obsoletus* Gm., *F. r. holboelli* Sharpe og *F. r. candicans* Gm. Helhedsindtrykket af den første er mørk (som hos den skandinaviske Jagtfalk (*F. r. rusticolus* L.)), af den anden grå (meget lig den islandske Jagtfalk (*F. r. islandus* Brünn.)), og af den tredje hvid. SALOMONSEN mener imidlertid, at variationen mellem de oprindelige *F. r. obsoletus* og *F. r. holboelli* er for lille til, at man kan opretholde dem som to racer, og han har derfor slået dem sammen til een, nemlig *F. r. obsoletus*. Herefter forekommer der altså to racer på Grønland: *F. r. obsoletus* (delt i en mørk og en grå fase), der findes i Syd- og Vestgrønland, og *F. r. candicans*, der er udbredt i Nord- og Østgrønland.

Eksemplaret fra Vestjylland tilhører absolut *F. r. candicans*-gruppen, der beskrives af SALOMONSEN (1950, p. 445) således: »Hovedets overside renhvid, kun med meget fine skaftstriber, rygside overvejende hvid, med mørke tværbånd og pletter af varierende udstrækning. Undersiden hvid med spredt pletning, undertiden renhvid, underhaledekfjerene altid renhvide. Helhedsindtrykket hvidt.«

Denne beskrivelse passer fuldstændig på det vestjyske stykke. Især SCHIØLER (1931) fremhæver underhaledekfjerenes hvide farve som et godt kendetegn for *F. r. candicans*, idet alle andre racer har mørke tværbånd eller pletter på underhaledekfjerene. Vingelængden for fuglen er ca. 390 mm, hvilket også stemmer med SALOMONSENS angivelser:

	mørke	grå	hvide
♀♀ juv.	408,1	406,4	401,3
	<i>F. r. obsoletus</i>		<i>F. r. candicans</i>

Jagtfalken fra Vestjylland blev skudt ved en gård i Flynder ved Bækmarksbro, da den var ved at fortære en due. Den blev foræret til førstelærer O. BENDTSEN, Brandborg skole pr. Bækmarksbro, i hvis eje den nu befinder sig.

SUMMARY IN ENGLISH**The Greenland Falcon (*Falco rusticolus candicans* Gm.)
obtained in Denmark.**

In 1952, on 26. february, a Greenland Falcon was shot in the western part of Jutland near the village Bækmarksbro. The bird has no doubt arrived to Denmark with a big gale from N.W., which prevailed on 10.–11. february. It is the first certain record of this subspecies in Denmark. However, a specimen was observed on 11. january 1950 in North-Zealand (LØPPENTHIN 1950, p. 175).

Literatur.

- DONARK, TORBEN, 1952: Falkenes udbredelse i Danmark. I. Jagtfalk (*Falco rusticolus* L.) og Vandrefalk (*Falco peregrinus* Tunst.). – Dansk Ornith. For. Tidsskr. **46**.
- LØPPENTHIN, B. 1950: Grønlandsfalk (*Falco rusticolus candicans* Gm.) iagttaget i Danmark. – Dansk Ornith. For. Tidsskr. **44**.
- SALOMONSEN, F. 1950: Grønlands fugle. – København.
- SCHIØLER, E. LEHN, 1931: Danmarks fugle, **3**. Rovfugle (*Falconiformes*). – København.