

Sorthovedet Måge (*Larus m. melanocephalus*  
Temm.) skudt i Danmark.

Af ERNST TORP PEDERSEN.

(With a Summary in English: Mediterranean Black-headed Gull  
(*Larus m. melanocephalus* Temm.) obtained in Denmark).

I Holstebro Dagblad for 23. nov. 1949 fandtes en lille notits om, at en jæger i Vejrum ved Struer havde skudt "en Havmåge, der var ringmærket i Sovjetunionen". Jeg satte mig straks i forbindelse med jægeren — landmand PEDER HALGAARD —, som sendte mig ringen (MOSKWA-202251-E) og meddelte, at den havde siddet på en "grå Havmåge", som han havde skudt på Vester Lundby mark i Vejrum den 18. september 1949. Kort tid efter sendte jeg meddelelse til ringmærkningscentralen i Moskwa, men fik intet svar.

Senere har stud. mag. LEIF LYNEBORG JENSEN, Humlum, indsendt meddelelse om en ringmærket Sølvmåge (*Larus a. argentatus* Pont.) (MOSKWA-41284-C), skudt i Ølby ved Struer i november 1949, og han modtog meddelelse om, at den var mærket som unge den 6. juli 1949 på øgruppen Seven Islands ved Murmankysten i det nordvestlige Rusland.

Heldigvis havde hr. LYNEBORG JENSEN også omtalt 202251-E, og det blev oplyst, at det drejede sig om arten *Larus m. melanocephalus* Temm., der på dansk har fået navnet Sorthovedet Måge. Den var ringmærket den 2. juli 1949 i nærheden af Kherson ved Dnjeprflodens udløb i Sortehavet.

Denne mågeart er kun truffet én gang før i Norden (HENRICI 1947, p. 1985) nemlig den 28. juni 1939 på Græsholm ved Christiansø, NØ for Bornholm (R. HØRRING 1942, p. 48)<sup>1)</sup>. Det er en syd-palæarktisk art, hvis yngleområde er Grækenland, Rumænien (Dobrogea), Sydrusland (Krim og Sortehavet) og Lilleasien (H. F. WITHERBY 1943—44, p. 73—76).

At jægeren har smidt fuglen bort i den tro, at det var en almindelig Sølvmåge, er beklageligt, da den således ikke blev konserveret. Mange data om sjældne arters besøg går sikkert tabt, og havde denne måge ikke været ringmærket, var det altså gået den på samme måde.

<sup>1)</sup> Et eksemplar dog truffet i Skåne 19. august 1950. (Red.)

## SUMMARY IN ENGLISH

**Mediterranean Black-headed Gull (*Larus m. melanocephalus* Temm.) obtained in Denmark.**

A Mediterranean Black-headed Gull (*Larus m. melanocephalus* Temm.) ringed on July 2, 1949 near Kherson, mouth of the Dniepr-river, was shot on September 18, 1949 in Vejrum by Struer (in North West Jutland). This species has been observed in Denmark only once before (on the islet Græsholm by Bornholm on June 28, 1939).

**Litteratur.**

- HENRICI, Poul, et al.: Våra Fåglar i Norden. 4. — Stockholm 1947.  
 HØRRING, R. 1942: Om 6 for Danmarks Fauna nye Fuglearter. — Dansk Ornith. Foren. Tidsskrift 36.  
 LØPPENTHIN, B. 1946: Fortegnelse over Danmarks Fugle, p. 38. — Kbhnv.  
 WITHERBY, H. F., JOURDAIN, F. C. R., TICEHURST, N. F. and TUCKER, B. W.: The Handbook of British Birds 5. — London 1943—44.

**Danske Stormmågers (*Larus canus* L.) træk.**

Af HOLGER MUNK.

(Roskildefjordens Ringmærkningsstation)

(With a summary in English: The Migration of Danish Common Gulls (*Larus canus* L.)).

I årene 1921—1923 foretages ringmærkning af 3600 Stormmåger (*Larus canus*) fordelt mellem mærkningsstederne, som nedenstående oversigt viser.

Tabel 1.

	Øksneholm	Jyllinge-holmene	Eskildsø	Nakskov Fjord	Lindholm v. Ourø	ialt
1921	56		1			
1922	179		8			
1923	94	14		198 222	729 2099	
	329	14	9	420	2828	3600

Da der nu er forløbet 26 år, siden den sidste måge blev mærket, må det formodes, at ingen af de 3600 lever mere, således at denne undersøgelse kan betragtes som fuldt afsluttet med den sidst tilbagmeldte måge fra 1939. Det er bemerkel-