

hvad der jo foreligger udsagn om fra Sverige og Tyskland, har ynglet anden gang. Har de gjort det, er det rimeligvis sket i træerne øst for Susåen.

Reden befinder sig, sammen med en Gulirisk, der angives som skudt ved Hardenberg (det nuværende Krenkerup ved Sakskøbing) 1. maj 1891, i en glasmontre i Svendborg zoologiske Museums fuglesamling. Ynglefundet ved Næstved er det første i landet, idet Gulirisken som bekendt ikke tidligere med sikkerhed var fundet ynglende i Danmark; der findes kun en ubekræftet og meget tvivlsom meddelelse fra Als 1930 om redefund.

SUMMARY IN ENGLISH

The Serin (*Serinus canarius serinus* (L.)) breeding at Næstved, Denmark.

The Serin (*Serinus canarius serinus* (L.)) was hitherto unknown as breeding-bird in Denmark. In 1948 the author found a pair nesting in a small grove in the vicinity of the city Næstved in southern Zealand. The nest was situated in a young larch (fig. 1), and contained four nestlings May 27th. The young left the nest on June 3rd.

Ornithologiske iagttagelser fra Ulfshale og Nyord.

Af J. CHR. HARBOE.

ARTHUR CHRISTIANSEN har i Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 42, 1948, p. 149—61, skrevet en artikel om fuglene på Ulfshale og Nyord. I indledningen skriver forf., at det er et af de fuglerigeste steder i det østlige Danmark. Det er det også; men jeg synes blot ikke, det fremgår af omtalen af de forskellige arter. Selv om opholdets hovedformål har været optagelse af film, synes jeg dog, at et 3 ugers ophold kunde have givet lidt mere indblik i de forskellige arters forekomst; men jeg kan godt tænke mig, at et ophold i et telt i en fugtig og kold maj kan stemme iagttageren pessimistisk. Jeg har på mine ekskursioner 10-12 gange fra juli 1944 truffet flere arter, som ikke er nævnt, og jeg skal indskrænke mig til at omtale disse og enkelte andre arter, som jeg synes trænger til lidt mere udførlig omtale.

Toppet Lappedykker (*Podiceps cristatus*). Sjælden som ynglefugl i Vedlen. Den træffes hyppigere ved kysten.

Gråand (*Anas platyrhynchos*). Fåttallig ynglefugl i forhold til de mange gode lokaliteter især på Nyord, hvor jeg kun har fundet dens rede 2 gange.

Atlingand (*Anas querquedula*). Nogle par yngler hvert år på Nyord og Ulfshale-engene; mens antallet synes at svinge noget fra år til år. 10. maj 1946 sås 2 reder med 10 og 12 æg på Nyord.

Krikand (*Anas crecca*). Almindelig i træktiden både på Nyord og Vedlen, men sjælden som ynglende. Jeg har kun truffet den een gang som ynglefugl, idet jeg 3. juni 1942 traf en ♀ med ællinger i et vandhul ved stenvaskeriet.

Spidsand (*Anas acuta*). Meget almindelig ynglefugl både på engene ved Ulfshale og Nyord; især sidste sted synes den at være i stærk tiltagende. Under 2 besøg i 1948 fandt jeg 17 reder med æg. Jeg vil antage, at der yngler mindst 30 par på øen. Rederne lægges mere åbent end Skeandens, og fuglen forlader reden, når man kommer den på 10-12 m afstand. I modsætning til Skeanden, hvis rede gerne er godt skjult i tæt græs, og som flyver fra reden, vralter spidsanden oftest fra reden og søger at lokke fredsforstyrrelsen bort.

Pibeand (*Anas penelope*). Yngler næppe, da jeg aldrig har set den efter midten af maj.

Skeand (*Spatula clypeata*). Sikkert endnu talrigere ynglefugl end Spidsanden på begge lokaliteter. Jeg vil antage, at der på Nyord ruger 50-60 par. På 2 ture til øen 11. maj og 25. maj 1947 fandt jeg 21 reder med æg.

Taffeland (*Aythya ferina*). Selv om jeg ikke har fundet den ynglende, antager jeg, at det sker af og til, da jeg har set den på velegnede lokaliteter i Vedlen.

Rørhøg (*Circus aeruginosus*). Et par yngler årlig i Vedlen. Undertiden kan man se flere fugle; men jeg har kun med sikkerhed fastslået eet rugende par.

Tårnfalk (*Falco tinnunculus*). 1945 havde 2 par unger i granskoven vest for vejen gennem Ulfshale, men siden har jeg ikke set den.

Vandrikse (*Rallus aquaticus*). Almindelig ynglefugl. Jeg har fundet dens rede flere gange både ved vandhuller og i ret tørre småmoser i skoven.

Grønbenet Rørhøne (*Gallinula chloropus*). Almindelig ynglefugl både i Vedlen og ved vandhuller i skoven. Dens kraftige parringstone høres langt ud på natten.

Strandskade (*Haematopus ostralegus*). 30-40 par yngler på Nyord, også enkelte par på Ulfshale-engene og ved Hegnede.

Stor Præstekrave (*Charadrius hiaticula*). Enkelte par yngler, som ARTHUR CHRISTIANSEN anfører, på nordkysten af Ulfshale; men hovedparten, 10-15 par, ruger på de 1-2 ha store sandflader ved stenvaskeriet. Rederne ligger her på de højeste steder, hvor der gerne findes lidt småsten. På Nyord har jeg aldrig fundet den ynglende.

Stor Kobbersnepe (*Limosa limosa*). Jeg har kun truffet den een gang på Nyord, 2. maj 1948, da et par holdt til på engene, og lokale folks udsagn om, at den yngler og hvert år møder med 4 unger, skal man vist ikke stole alt for meget på.

Stenvender (*Arenaria interpres*). På den stenede nordkyst, hvor der skulle være gode ynglesteder, og hvor den efter lokale folks udsagn skulle være, har jeg aldrig set den. Tidligere ynglede den på Ægholm et par km nord for Nyord. 1928 var der endog 3 reder; men nu findes den ikke mere.

Sydlig Ryle (*Calidris alpina schinzii*). Nogle par yngler på Ulfshale-enge; men langt flere findes på Nyord. Jeg har i hvert fald ingen steder her i landet set så stor en rylebestand. At sætte antallet af rugende par til 30-40 er sikkert ingenlunde for højt; men rederne er ret vanskelige at finde, da fuglene her, i modsætning til deres sædvane andre steder, forlader reden på lang afstand som andre vadefugle. Æglægningen kan undertiden begynde tidligt; jeg har fundet reder, hvor første æg var lagt ca. 12. april, endda i det ret kolde forår 1946.

Brushane (*Philomachus pugnax*). Nogle få par yngler på Ulfshale-enge og ved Vedlen. På Nyord vil jeg anslå antallet til 30-40 par. 12. maj 1948 fandtes 11 reder med æg. Rederne findes spredt over hele øen, ofte ret langt fra kampladserne. De findes i mere kort og tæt græs end Rødbøns og ikke sjældent lige op til små vandhuller.

Klyde (*Recurvirostra avosetta*). Yngler flere steder, dog kun få på Nyord; men antallet varierer meget fra år til år, og den yngler heller ikke de samme steder hvert år. 1945 var der på en lille ø ud for Vedlen en koloni på 31 reder, som lå i opskyllet tang. 1946 var der kun 3 reder. 10. juni 1945 sås på Sæksandene 45 reder med æg (VILLY NIELSEN).

Sølvmåge (*Larus argentatus*). Enkelte par findes mellem Stormmågerne både på nordkysten af Nyord og nord for Ulfshale-skoven. På Sæksandene fandtes 20 reder 10. juni 1945.

Havterne (*Sterna paradisaea*). Yngler af og til på Nyord og måske også på nordkysten af Ulfshale. Tidligere var der en stor koloni på Ægholm, men nu kun få par.

Splitterne (*Sterna sandvicensis*). 1937 hørtes den over Ægholm, og 1938 fandtes 4 reder; 1939 var der 70, men nu er den borte.

Gøg (*Cuculus canorus*). 3-4 ♂♂ høres årlig på Ulfshale. På Nyord har jeg aldrig hørt den. Den eneste gang, jeg har fundet dens æg her, var i en rede af Gul Vipstert (*Motacilla flava*).

Skovhornugle (*Asio otus*). De ugleskrig, som hørtes om natten, har alle været af denne art, hvoraf jeg har fundet rede med æg eller unger hvert år. Et år var der vist endda 2 par.

Natråvn (*Caprimulgus europaeus*). 30. juni 1945 fandt K. BARFOD dens "rede" med en ret stor unge. 7. juni 1945 fandt jeg reden med 2 æg, og jeg har hørt den hvert år siden. Hannen karakteristiske stemme og dens parringsflugt høres på ret lang afstand i stille forårsnætter; dog har jeg aldrig konstateret mere end eet par.

Digesvale (*Riparia riparia*). Mange par yngler i de 1/2-1 m høje grusskrænter ved stenvaskeriet.

Stenpikker (*Oenanthe oenanthe*). Et enkelt par yngler ved færgeløjet.

Bynkefugl (*Saxicola rubetra*). Fåtalig ynglefugl.

Nattergal (*Luscinia luscinia*). Enkelte ♂♂ høres om natten.

Høgesanger (*Sylvia nisoria*). Yngler årlig. 7. juni 1946 sås rede med 5 æg ved parkeringspladsen, 5. juni 1947 fandtes 2 reder med æg på samme sted. Også i udkanterne af skoven har jeg fundet dens rede; men antallet af ynglefugle svinger her som andre steder fra år til år. 1946 var der 3-4 par.

Havesanger (*Sylvia borin*). Meget almindelig ynglefugl i skoven; men terrænet passer også langt bedre til den end til de andre sangere.

Tornsanger (*Sylvia communis*) og Gærdesanger (*Sylvia curruca*). Fåtalige ynglefugle.

Gulbug (*Hippolais icterina*). Almindelig ynglefugl i skoven.

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*). Talrig ynglefugl i den åbne granskov vest for Ulfshale-vejen; kun ret få i løvskoven.

Skovsanger (*Phylloscopus sibilatrix*). Flere syngende ♂♂ høres hvert år i løvskoven.

Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*). Kun et ganske enkelt par forekommer ved Vedlen, hvor rørene er for åbne. Nogle par findes i rørpartier ved kysten og i rørene ved stenvaskeriet.

Engpiber (*Anthus pratensis*). Ikke særlig almindelig, hverken på Nyord eller på Ulfshale-engene.

Markpiber (*Anthus campestris*). K. BARFOD fandt dens rede 28. juni 1944 med unger i en græstue i sandet ved stenvaskeriet. 16. juli samme år fandt jeg andet kuld med 4 æg. Både 1945 og 1946 ynglede den på terrænet, men siden er den ikke set.

Skovpiber (*Anthus trivialis*). Enkelte par yngler i skovene, især i den ret åbne granskov.

Hvid Vipstjert (*Motacilla alba*). Enkelte par yngler ved stenkunker og under nedhængende grønsvær.

Gul Vipstjert (*Motacilla flava*). Fåtalig ynglefugl på Nyord, noget hyppigere på Ulfshale-engene.

Rødrygget Tornskade (*Lanius collurio*). Almindelig ynglefugl på åbne steder i skoven og ved markhegn.

Kærnebider (*Coccothraustes coccothraustes*). Selv om jeg ikke har fundet dens rede her, antager jeg, at den yngler, da jeg hørte den flere gange i skoven i maj 1946.

Grønirisk (*Chloris chloris*). Fåtalig ynglefugl.

Tornirisk (*Carduelis cannabina*). Talrig ynglefugl. Rederne findes næsten alle i enebærbuske.

Bomlærke (*Emberiza calandra*). Enkelte fugle er set på Nyord samt ved vejene til Ulfshale.