

This subspecies is distributed in northern Sweden (Västerbotten and Norrbotten) and entire Finland, no doubt also in the northernmost Norway. It meets *T. b. sibirica* in N.W. Russia. The type-locality of *Tetrao Bonasia* Linnaeus is restricted to Uppsala, Uppland.

The new subspecies has been described on a vere large material. Further particulars on the variation of the species *Tetrastes bonasia* will be published elsewhere in a near future.

MINDRE MEDDELELSER

Stor Stormsval (*Oceanodroma leucorhoa* (Vieill.)) i Grønsund.

Paa en Sejl tur i Grønsund d. 15. 12. 1946 saa jeg en Stor Stormsval (*Oceanodroma leucorhoa* (Vieill.)) udfør Haarbølle Bro paa Møen. Det var Snetykning og Blæst af N.Ø. Fuglen fløj nær ved Baaden og ganske tæt hen over Bølgerne, som om den spadserede paa dem. Den blev kort efter skudt af en Havlitjæger. Det lykkedes mig at erhverve Exemplaret, som var en ♂.

K. LINNET.

Rødhovedet And (*Netta rufina* (Pall.)) ved Hyllekrog.

Paa en Tur til Hyllekrog paa Lolland d. 4. 4. 1947 sammen med C. A. BLUME og TH. FRØLICH saas i en af de smaa rørkransede Søer, der strækker sig langs Dæmningens indvendige Side, 3 Rødhovede Ænder (*Netta rufina* (Pall.)), 2 Andrikker og 1 And. Ornithologer, der samme Dag var i Nakskov Inderfjord, saa ikke den Rødhovede And der, efter hvad jeg har faaet oplyst. Da jeg d. 18. 5. atter var ved Hyllekrog sammen med mønske Ornithologer, saa vi 1 Rødhovedet And, en Andrik, der var meget sky og fløj til Havs, da vi nærmede os. Samme Dag iagttog vi Arten ved Nakskov Indrefjord.

K. LINNET.

Sortterner (*Chlidonias niger* (L.)) og Dværgmaage (*Larus minutus* (Pall.)) ved Møen.

Paa Sækkesandet ved Møen iagttog jeg i Eftermiddags- og Aftentimerne d. 6. 8. 1947 fra en Skydevold en Flok paa ca. 35 unge og gamle Moseterner (*Chlidonias niger* (L.)). De var meget rastløse, og saas snart samlede, snart kun faa Stykker sammen. Af og til satte de sig en kort Tid paa Tangen i Strand-


kanten eller paa det lave Vand. Endnu da jeg forlod Sækkesandet, ca. 1 Time efter Solens Nedgang, fløj en Del Mose-terner omkring. Der har antagelig været flere end 35, men flere saa jeg ikke paa een Gang. De unge Fugle var i Overtal.

Mens jeg laa skjult i Skydevolden kom, som en særlig Sensation, en ung Dværgmaage (*Larus minutus* Pall.) flyvende forbi i sydøstlig Retning. Den forlod antagelig Sækkesandet, i det mindste saa jeg den ikke senere. K. LINNET.

Opskyllede Fugle paa Fanø.

Paa en Tur langs Nordstranden paa Fanø d. 29. 5. 1947 fandt jeg et ilanddrevet, delvis raaddent Exemplar af Stor Regnspove (*Numenius arquata*), hvis Næb langs Overkanten fra Fjergrænsen til Spidsen maalte ikke mindre end 18 Centimeter. Samme Dag fandt jeg desuden døde Exemplarer af en Bjergand (*Aythya marila*), to Fløjsænder (*Melanitta fusca*) og yderligere en Stor Regnspove, hvis Næb dog var betydeligt kortere end ovennævnte.

Paa en Tur, som jeg foretog langs samme Strækning d. 20. 6. 1947 fandt jeg en Havlit (*Clangula hyemalis*), en Fløjsand og en Hvidnæbbet Islom (*Colymbus adamsii*). At det virkelig er denne Art fremgaar af, at Næbkanten er svagt opad-



VALENTIN JENSEN fot.

Kranie af Hvidnæbbet Islom (*Colymbus adamsii*) fundet opskyllet paa Fanø 20. 6. 1947. Selve den lyse Hornskede sidder stadig paa Næbbet. Maalestok 1:1.8.

bøjjet, og at Næbfarven er hvidgul. Totallængden af Kraniet er 18 Centimeter.¹⁾

Kraniet af saavel *Colymbus* som *Numenius* var ganske ubeskadigede og opbevares begge i min Samling.

S. RASMUSSEN.

Nogle Iagttagelser fra Lolland-Falster.

Skarv (*Phalacrocorax carbo sinensis*). Enkelte Skarver er de sidste 3-4 Aar af og til set i Maribo Sø. Men omkring 1. Maj 1947 indfandt sig pludselig en Flok paa ca. 70 og forsøgte at fortrænge Raagerne fra Kolonien paa Hestø. Saa vidt jeg kan skønne, blev der dog kun dræbt et mindre Antal Raageunger. Skarverne blev paa Stedet det meste af Maj Maaned, men ingen ynglede. I Smaalands havet særlig omkring Askø holder mange Skarver til.

Rørdrum (*Botaurus s. stellaris*), som i hvert Fald de sidste 8 Aar har ynglet ved Maribo Sø, til Tider endda flere Par, er i 1947 helt udeblevet.

Drosselrørsanger (*Acrocephalus a. arundinaceus*) maa nu regnes til de faste Ynglefugle ved Maribo Sø, og den er endda ikke helt faatallig. 15. Maj 1947 saa jeg saaledes alene ved Hestø 3 syngende ♂♂.

Ellekrage (*Coracias g. garrulus*). Godsforvalter VALENTINER har meddelt mig, at 1 eller 2 Ellekrager har holdt til ved Corsetlitze paa Falster fra midt i Maj til sidst i Juli 1947. Den (de) saas ofte flyve fra Træ til Træ i Godsforvalterens Have eller Parken, som støder op dertil. Det lykkedes aldrig at se 2 samtidig, men Godsforvalteren mente flere Gange at have hørt Fuglene skrike til hinanden.

Fasanjæger JØRGENSEN saa 5. Juni 1945 1 Ellekrage ved Oreby ved Saxkjøbing.

Dompap (*Pyrhula pyrrhula*). Den 18. August 1946 og 10. Juli 1947 saa jeg en Dompap i en Skov nær Saxkjøbing. Det var begge Gange 1 ♂ ad. og begge Gange paa samme Lokaltet, som er udstrakte, tætte 10—50 Aar gamle Granplantninger.

¹⁾ Forf. har venligst paa min Anmodning sendt Kraniet af Hvidnæbbet Islom til Zool. Mus. for at faa Bestemmelsen kontrolleret og Stykket fotograferet. I en senere Skrivelse oplyser Forf., at Islommen, saa vidt det kunde ses, var i Vinterdragt, og at den rimeligvis var skyllet op i Vinterens Løb.

(Red.)

Pirol (*Oriolus o. oriolus*), som ellers var at træffe i alle Saxkjøbingegnens Skove, er i Aarene 1945, 46 og 47 helt udeblevet. Det synes dog at være et lokalt Fænomen, for i Merritskov ved Bandholm (Lærer NIELSEN, Maglemer) og i det classeske Fideikommis Skove (Godsforvalter VALENTINER) er den fremdeles ynglende.

Sortstrubet Bynkefugl (*Saxicola torquata rubicola*). 1 ♂ ad. blev sidst i Marts 1947 af nogle Drengene bragt til Konserverator LUNDAHL, Nykøbing F. Den var formentlig frosset ihjel.

Sortklire (*Tringa erythropus*). Jeg saa [2 sammen med Rødben paa Fladet ved Oreby 14. Juni 1947.

Kongeørn (*Aquila c. chrysaetos*). 1 ♂ juv., som ikke var i Stand til at flyve, saas flere Gange i November 1946 ved Oreby. Den 29. November dræbte Fasanjæger JØRGENSEN den. Det viste sig, at den i Brystet havde en dyb Saarkanal øjensynlig efter en Riffelkugle. En Kongeørn holdt Vinteren 1946-47 til ved Krenkerup.

Havørn (*Haliaeetus albicilla*). En ca. 3aarig ♀ dræbtes i det tidlige Foraar 1946 med Fosformos udlagt for Krager ved Oreby.

LINDHARD HANSEN.

Ellekrage (*Coracias garrulus* L.) ved Juelsberg.

Hofjægermester GREGERS JUEL, Juelsberg, meddeler, at en Ellekrage holdt til i Godsets Park i Dagene 8., 9., 10. og 14. Juli 1947.

S. B. ANDERSEN.

Purpurhejre (*Ardea purpurea* L.) ved Møgeltønder.

Herved kan jeg meddele, at der d. 26. 5. 1947 opholdt sig en Purpurhejre ved Mølledammen ved Lindskov Mølle, Møgeltønder Sogn. Der fløj tre Fiskehejrer rundt over Dammen, mens Purpurhejren stod blandt de tørre Tagrør ved Bredden, og da Fiskehejrerne fløj hen over den, lettede ogsaa Purpurhejren og fløj bort. Den var meget let kendelig fra Fiskehejrerne ved sin lidt mindre Størrelse og sin brunlige Farve. Selvom jeg ikke havde Kikkert med, tør jeg dog med Bestemthed sige, at det var en Purpurhejre. Møller THOMSEN havde bemærket den usædvanlige Hejre nogle Dage før, men har ikke set den siden.

VIGGO GREGERSEN.

**Gransanger (*Phylloscopus collybita* (Vieill.))
ynglende ved Aalborg.**

I Tilslutning til Meddelelsen fra H. LIND og A. STEINBACH om Gransangeren paa Randersegnen (D. O. F. T. 41, 1947, p. 75), kan jeg meddele følgende: I Slutningen af Juni og Begyndelsen af Juli 1946 iagttog jeg næsten daglig en syngende Gransanger i Lundby Krat Syd for Aalborg. Den opholdt sig hver Gang paa samme ret begrænsede Omraade. Naar jeg gik nærmere, holdt den op med at synge og udstødte et dæmpet Fløjt, omtrent som Løvsangerens. Trods gentagne Eftersøgninger lykkedes det ikke at finde Reden, men den sidste Gang jeg besøgte Stedet (3. Juli), saa jeg Fuglen med udføjne Unger.

NIELS PEDERSEN.

**Kolonier af Fiskehejre (*Ardea c. cinerea* L.)
i Danmark.**

Efter Offentliggørelsen af min Afhandling (se D. O. F. T. 40, 1946, p. 216) har jeg modtaget følgende Tilføjelser og Rettelser:

Apoteker AXEL HOLM oplyser at der fra 1922 til 1933 ikke var Koloni ved Nybjerg Vandmølle (Nr. 81) og at Kolonien tidligst kan være grundlagt omkring 1936, muligvis som Udløber fra Kolonien ved Leerbæk Skov. Samme Meddeler oplyser, at der omkring 1935 var en Koloni paa 4 Reder paa Æbelø.

O. BEHRENS, Sønderborg, har gjort mig opmærksom paa, at Kolonien i Lambjerg Indtægt (Nr. 70) blev grundlagt i 1934 med ca. 30 Reder, samt paa, at Kolonien i Skjelle Kobbelskov (Nr. 71) er anlagt i Bøge, og ikke, som i Artiklen anført, i Graner.

CHR. KRÜGER.

Ny Forekomst af Pirol (*Oriolus oriolus* (L.)) paa Fyn.

Ved nogle Arbejdsmands Spørgsmaal om en Fugl, de havde set og navnlig hørt i nogle Skove omkring Hundslev paa Østfyn, blev jeg straks klar over, at det drejede sig om Pirolen. Ved Besøg paa Stedet en tidlig, stille Morgen (1. 6. 47) blev min Antagelse bekræftet, idet min Søn og jeg hørte Hannen fløjte nogle faa Gange, og vi saa kort efter Parret flyve ud af et Skovbryn, den citrongule Han let kendelig fra den grønlig Hun. Ved gentagne Besøg har vi atter hørt Stemmen, men ikke set nogle af Fuglene. Efter Mændenes Udsagn — de stak

Asparges i en Mark mellem Skovene mellem Marslev, Birkende og Hundslev — har Pirolerne været der siden 1943 eller 44. De mener, at der maa være mindst 2 Par, idet de ofte har set 2 Hanner slaas.

S. B. ANDERSEN.

Stor Tornskade (*Lanius excubitor* L.) paa Heden ved Frederiks.

21. Juli 1946 kom mine to Sønner og jeg cyklende ad Vejen mellem Grønhøj og Kongenshus, og vi saa her 3 eller 4 store Fugle med graa og hvide Farver flyve ud fra Vejkantens Granhegn. Naar vi nærmede os, fløj de atter op og skiftede Plads. Da vi standsede og iagttog dem, saa vi, at de snappede Insekter i Luften. At det var den store Tornskade, var der ingen Tvivl om, og rimeligvis var her Tale om et nylig udflyjet Kuld+Forældre. Om der var mere end tre Fugle kunde ikke med Bestemthed afgøres, dette Antal saa vi samtidigt gentagne Gange, men vi havde Intrykket af, at der var flere, maaske 5.

S. B. ANDERSEN.

Ornithologmødet i Skotland.

Som omtalt i D. O. F. T. 41, 1947, p. 80 fandt i Juni i Aar en Ornithologkongres Sted i Skotland, arrangeret af "British Ornithologists' Union", hvortil ogsaa Medlemmer af vor Forening var indbudt. Fem danske Ornithologer havde fulgt Indbydelsen, nemlig stud. mag. J. GUILDAL, Mag. scient B. LØPPENTHIN, ORS. P. OLUFSEN og Frue og Dr. phil. FINN SALOMONSEN. Til Kongressen havde, foruden et meget stort Antal Englændere, indfundet sig ialt 55 Udlændinge fra 15 Lande. Kongressen afholdtes i det skønne Edinburgh og bød paa mange interessante Foredrag samt paa vellykkede Ekskursioner i den smukke og afvekslende Natur. Kongressen indlededes med en Modtagelse i British Museum, Natural History i London den 19. Juni, og om Aftenen foregik Afrejsen til Edinburgh. Her fandt Konferencens egentlige Aabning Sted om Morgenen den 20. Juni. Om Aftenen modtoges Medlemmerne af Edingburghs Lord Provost og Byens samlede Raad under Udfoldelse af et næsten middelalderlig Cereemoniel, der virkede meget betagende. Den næste Dag foretoges om Eftermiddagen Ekskursion til North Berwick og Bass Rock. Dette blev vel den største ornithologiske Oplevelse paa Kongressen. Paa Bass Rock, der er en lille Klippeø i Firth of Forth med store Fuglebjerger, yngler ca. 5000 Par Suler, foruden Mængder af Lomvier, Rider, Sølv- og Sildemaager, Alke, Lunder, Topskarve og Skærpibere, samt enkelte Mallemukker. Deltagerne havde Lejlighed til at komme det storslaaede Sceneri paa nærmeste Hold og iagttage samtlige Ynglefugle i fuld Udfoldelse, af hvilke naturligvis det store Antal Suler vakte den største Begejstring. Den 22.

Juni fandt flere Udflugter Sted, bl. hvilke den interessanteste gik til de bekendte Fuglebjerger ved St. Abbs Head, der naaedes over Byen Dunbar. Paa St. Abbs Head ynglede Lomvier, Rider, Mallemukker, Klippeduer, Alliker m. fl. Kongressen sluttede paa festlig Maade med en fælles Diner for Deltagerne, hvor der serveredes særlige skotske Delikatesser, ligesom man præsenteredes for mange ejendommelige skotske Skikke; heller ikke Sækkepiberne manglede.

Blandt de mange Foredrag er der Grund til at nævne et dansk, nemlig Mag. LØPPENTHNS "Recent changes in the Danish breeding birds".

Efter den egentlige Kongres var de udenlandske Deltagere inviteret til at deltage i en Rundrejse i Skotland, der blev en uforglemmelig Oplevelse. Den 24. Juni startedes i Turistbiler til Inverness over Aviemore. Den 25. Juni foretoges Udflugt til Culbin Sands, store Klitstrækninger øst for Inverness, men meget fattig paa Fugle. Dagen efter besøgte de oprindelige skotske Fyrreskove omkring Rothiemurchus, og Skotlands næsthøjeste Fjeld, Cairn Gorm (4248 Fod) blev besteget. I den alpine Region fik man Lejlighed til at iagttage den skotske Fjeldrype. Den 27. Juni gik Turen til Ashie Moor og Loch Ruthgen, hvor Vandrefalk, Sortstrubet Lom og Nordisk Lappedykker iagttoges paa Yngleplads. Paa Tilbagevejen besøgte det ejendommelige Fall of Foyers, Skotlands højeste Vandfald. Endelig foretoges den 28. Juni en Tur fra Hovedkvarteret i Inverness langs Loch Ness til Fort William paa Skotlands Vestside og langs Loch Leven til de skønne, grønklædte Bjergdrag omkring Glencoe, og herfra tilbage til Edinburgh.

Naar Kongressen blev en straalende Oplevelse for alle Deltagerne, skyldes det først og fremmest Miss PHYLLIS BARCLAY-SMITH, B. O. U.s Sekretær, samt de to kendte skotske, kvindelige Ornithologer, Miss L. J. RINTOUL og Miss E. V. BAXTER, der med en utrættelig Enthusiasme havde organiseret hele Kongressen og sørget for alle Arrangementer, ligesom de under hele Konferencen fungerede som meget charmerende Værtinder, der fik alle Deltagerne til at føle sig velkomne i Skotland.

Medlemmerne af D. O. F. vil i Vinterens Løb faa Lejlighed til at høre mere om Kongressen i et Foredrag af stud. mag. J. GUILDAL. (Red.).