

MINDRE MEDDELELSER

Bomlærke (*Emberiza calandra* L.) ynglende i Skov.

Som en noget usædvanlig Redeplads for Bomlærke (*Emberiza calandra* L.), denne det aabne Lands og Marks Fugl, kan nævnes, at den fandtes ynglende i Kapelskoven ved Rønningesøgaard 11. 6. 1946. Denne Skov er Højskov, der bestaar af Bøg, Eg og nogle Stk. Ask. Reden var anbragt ca. $\frac{1}{2}$ Meter over Skovbunden i nogle Rodskud fra et Træ. Hannen hørtes kun faa Gange syngende fra Toppen af en stor enlig Lind, der stod ved Kanten af den nærliggende Sø. Den havde noget vanskeligt ved at gøre sin Stemme gældende i Koret fra de mange Skovfugle.

AKSEL JACOBSEN.

Angriber Musvitten (*Parus major* L.) andre Fugle?

Sidst paa Vinteren 1947 gjorde jeg i Haven paa Rønningesøgaard en Iagttagelse, der maaske kunde have nogen Interesse i Forbindelse med Emnet: Angriber Musvitten andre Fugle?¹⁾

12. Marts, en af den lange Vinters strænge Frostdage, sad der i et Blommetræ uden for mit Stuevindue en halv Snes Gulspurve og morgensolede sig. De saa usædvanlig træge ud, og sad som struttende Fjerbolde med Hovederne dybt indtrukket og Halerne slapt hængende ned, hvad der skyldtes den haarde Kulde; Temperaturen var paa det Tidspunkt \div 16 Gr. C. i Solen. I en Mirabellehæk tæt derved hoppede en Musvit om paa sin sædvanlige livlige Maade undersøgende Kviste og Knopper. Pludselig satte den sig paa en Gren i Blommetræet ved Siden af en af Gulspurvene, og i samme Øjeblik ændrede den fuldstændig Karakter. Den sad nu struttende "af Kulde" som de andre, med Hovedet saa dybt indtrukket at alle mørke Farver paa den var fuldstændig forsvundet, selv den mørke Overside skjultes næsten af de struttende Brystfjer, og der skulde langt mere end et tilfældigt Øjekast til at skelne den fra Gulspurvene. Saadan sad den i $\frac{1}{2}$ —1 Minut, saa gjorde den et pludseligt uventet Udfald mod Gulspurvens Hoved med det Resultat, at denne faldt bagover og flagrende greb fat i

¹⁾ Om dette Emne se H. POULSEN, D. O. F. T. **38**, 1944, p. 100; og J. MONRAD, D. O. F. T. **39**, 1945, p. 60. (Red.).

en Gren længere nede. Den var tilsyneladende ret generende ramt af Musvittens Næbspids, for den rystede Hovedet kraftigt flere Gange en Tid. Men Musvitten satte sig paa samme Vis op ved Siden af en anden Gulspurv og gentog det samme Forsøg, derefter med en tredie og en fjerde, stadig uden Resultat, hvorefter den fløj bort. Det saa ud, som den hver Gang sigtede efter et bestemt Punkt af Fuglens Hoved, i eller omkring ved Øjet.

AKSEL JACOBSEN.

Ny Yngleplads for Knopsvane (*Cygnus olor* (Gm.)).

I Forsommeren 1946 fandt jeg et Par ynglende Knopsvaner i den saakaldte "Islingens Lergrav", beliggende ca. $\frac{1}{2}$ km Nord for Vordingborg.

Ogsaa i Sommeren 1947 var der et Par ynglende Svaner i Mosen. Dette er første Gang jeg har truffet Fuglen ynglende her, og jeg har heller ikke fra anden Side hørt, at den skulde have ynglet her før i Tiden. Derimod har jeg i tidligere Aar set Svaner tidligt om Foraaret, men de er efter en Tids Forløb trukket bort igen, uden at ruge her.

O. OLAFSSON.

Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea* Tunstall) i Hornsherred.

Som nævnt i D. O. F. T. 40, 1946, p. 263 har en Bjergvipstjert holdt til i Vintre Møller pr. Kr. Saaby i Vinteren 1946/47.

Første Gang den blev set var d. 7. 12. 1946. Siden kunde jeg altid finde den, naar jeg gik langs Aaen, hvor denne paa ca. 1 km har skraanende Bredder og nogle Steder lavt Vand.

Den 6. 3. 1947, mens jeg var bortrejst, blev den ringmærket, og ogsaa den følgende Dag blev den set i Aaen, hvor den altid var livlig og aldrig gjorde Indtryk af at være knuget af den lange Frostperiode, vi havde haft. Saa indtraf stærkt Snefald og Fygning, og det Sted i Aaen, hvor Bjergvipstjerten havde holdt mest til, blev fuldstændig dækket af en stor Sne-drive. Siden er Bjergvipstjerten ikke set.

HANS WONSILD.

Rødtoppet Fuglekonge (*Regulus ignicapillus* (Temm.))

paa Amager og ved Præstø.

Den 30. Marts 1947 om Eftermiddagen saa jeg sammen med Ekspeditionssekretær TH. FRØLICH i Kongelunden paa Amager en Rødtoppet Fuglekonge (*Regulus ignicapillus*). Den lod

sig betragte paa nært Hold gentagne Gange, medens den i uarbrudt Bevægelse søgte efter Føde i lave Graner og Ungbøge sammen med en mindre Flok alm. Fuglekonger (*Regulus regulus*), af hvilke der opholdt sig adskillige rastende Smaaflokke paa Træk i Skoven; ja selv ude paa den nye Kalvebodsdæmning saa jeg en alm. Fuglekonge ca. 2 km fra nærmeste Træbevoksning.

I Løbet af Foraaret 1947 har jeg paa Feddet ved Præstø sammen med en Del Medlemmer fra Dansk Ornithologisk Forening iagttaget Rødtoppet Fuglekonge.

Første Gang den 27. 4. om Eftermiddagen hørte jeg i Granplantagen en syngende Rødtoppet Fuglekonge, og ved at gaa Terrænet nøjere igennem lykkedes det os at se en 3-4 Stkr. Den 15. 5., ligeledes om Eftermiddagen, blev der paa samme Lokalitet iagttaget 3 Fugle, hvoraf de 2 sang ivrigt. Tredie Gang den 1. 6. opholdt jeg mig paa nøjagtig samme Sted baade Formiddag og Eftermiddag. Denne Gang var Fuglene betydelig mere flygtige og man fik kun et Glimt af dem af og til, naar de fløj fra een Trætop til en anden. Sangen hørtes kun faa Gange, men paa eet Tidspunkt hørtes dog 2 syngende Fugle.

Da der saaledes har været iagttaget Rødtoppede Fuglekonger paa nøjagtig samme Lokalitet 3 Gange i Løbet af mere end en Maaned og jeg hver Gang hørt 2 syngende Hanner, vil jeg anse det for overvejende sandsynligt, at de har ynglet der i Aar, hvilket jeg yderligere blev forvissat om, da jeg den 24. 8. paa samme Lokalitet saa en ung Fuglekonge, dog uden at jeg med Sikkerhed kunde bestemme Arten, men da jeg aldrig har set alm. Fuglekonge paa dette Sted inden for en Radius af ca. 1 km, vil jeg anse det for sandsynligt, at det har drejet sig om en Unge af Rødtoppet Fuglekonge.

ERIK HANSEN.

**Bredstjärtad labb (*Stercorarius pomarinus* (Temm.))
vid Jutlands västkust.**

I början av augusti företog jag en båtresa från Antwerpen till Göteborg, varvid båten hela dagen den 9 augusti följde Jutlands västkust ett par km från stranden. När vi hunnit några mil norr om Ringkøbing stod jag på däck och tittade på en stormfågel (*Fulmarus glacialis*), som kretsade kring båten

tillsammans med några tretåiga måsar (*Rissa tridactyla*). Då dök det upp en gammal bredstjärtad labb (*Stercorarius pomarinus*), som tätt utmed vattenytan kom flygande i nordlig riktning rätt nära båten. De förlängda mellersta stjärt pennornas karakteristiska breda spetsar sågs tydligt. Fågeln var av den ljusa fasen.

CLAËS RAMEL.

Svarbagen (*Larus marinus* L.) paa Hirsholmene 1947.

I Dr. phil. FINN SALOMONSENS Afhandling: "Maagekolonier paa Hirsholmene", D. O. F. T. 41, 1947, p. 174, omtaler Forf. Svarbagen som værende til Stede, men ikke ynglende under hans Besøg omkr. 1. Juni. Af Hensyn til fremtidig Statistik kan det maaske være af Interesse at bemærke, at Arten efter dette Tidspunkt er skredet til Ynglen. Under mit Besøg medio Juli blev en Rede indeholdende 1 stærkt ruget Æg forevist mig d. 13. Juli. Antagelig er 1ste Kuld Æg gaaet tabt (jfr. U. MØHL-HANSEN D. O. F. T. 41, 1947, p. 44) og dette Aarsagen til at SALOMONSEN ikke kunde opføre Arten som Ynglefugl.

TORBEN SVENDSEN.

Opskyllede Fugle ved Vesterhavet efter Vinteren 1947.

I Midten af April 1947 fandt jeg paa en Vandring fra Sønderho til Nordby (11 km langs Fanøs Vestkyst) 471 Fugle, som laa opskyllet paa Forstranden. Hovedparten var:

1. Dykkende Fugle, som havde lidt Hunger under den stadige Blæst og Uro paa Havet og dernæst var overmandet af Kulde og Is.

2. Strand- og Lavvandsfugle, som havde prøvet at overvintre eller tidligt var vendt hjem (førend Viben) og derfor døde, da Kulden paany satte stærkt ind. De har rimeligvis fundet Døden paa Vaderne bagved Fanø, og deres Lig er ført med Tidevandtet ud til Fanøs Vestkyst.

Nogle Uger senere gik jeg to Ture fra Vejrs til Børsmose, 4-5 km Nord for Blaavands Huk, og fandt 53 Fugle. Det var lidt for sent, idet den langvarige Østenstorm i Begyndelsen af Maj havde lagt Sanddriver fra Klitterne ud over Sandstranden. De fleste af de opskyllede Fugle var sikkert dækket til. Heroppe var temmelig mange af Dyrene mærket af Olie og er altsaa egentlig ikke døde af Vinterkulde. Desuden fandtes to

temmelig friske Havterner, som havde fundet Døden saa sent som i Maj. Blandt Fanø-Fuglene er en Del af Troldænderne ikke sikkert bestemt; nogle af dem har snarere været Bjergænder.

	Fanø 17. Apr. 1947	Vejrs 14. og 21. Maj	heraf mærket af Olie (Vejrs)
Rødstrubet Lom (<i>Colymbus stellatus</i>).....	14	3	
Sortstrubet Lom (<i>Colymbus arcticus</i>).....	3	4	1
Toppet Lappedykker (<i>Podiceps cristatus</i>).....	8	—	
Graastrubet Lappedykker (<i>Podiceps griseigena</i>)	10	1	1
Sule (<i>Morus bassanus</i>).....	—	1	1
Sangsvane (<i>Cygnus cygnus</i>).....	1	—	
Stor Svaneart (<i>Cygnus</i> sp.).....	1	2	
Pibesvane (<i>Cygnus bewickii</i>).....	1	—	
Gravand (<i>Tadorna tadorna</i>).....	47	3	
Graaand (<i>Anas platyrhynchos</i>).....	7	—	
Pibeand (<i>Anas penelope</i>).....	2	—	
Taffeland (<i>Aythya ferina</i>).....	1	—	
Troldand (<i>Aythya fuligula</i>).....	46	1	
Bjergand (<i>Aythya marila</i>).....	49	5	
Hvinand (<i>Bucephala clangula</i>).....	1♂	—	
Havlit (<i>Clangula hyematis</i>).....	3	—	
Ederfugl (<i>Somateria mollissima</i>).....	1	1	
Sortand (<i>Melanitta nigra</i>).....	46	3	
Fløjsand (<i>Melanitta fusca</i>).....	25	3	
Toppet Skallesluger (<i>Mergus serrator</i>).....	7	—	
Musvaage (<i>Buteo buteo</i>).....	1	—	
Fasan (<i>Phasianus colchicus</i>).....	1♀	—	
Tam Høne (<i>Gallus domesticus</i>).....	—	1	
Tam Gaas (<i>Anser domesticus</i>) (en Vinge).....	1	—	
Blishøne (<i>Fulica atra</i>).....	5	1	1
Strandhjejle (<i>Squatarola squatarola</i>).....	1	—	
Strandskade (<i>Haematopus ostralegus</i>).....	81	—	
Vibe (<i>Vanellus vanellus</i>).....	3	—	
Stor Regnspove (<i>Numenius arquata</i>).....	63	—	
Stormmaage (<i>Larus canus</i>) (alle gl.).....	13	—	
Sølvmaage (<i>Larus argentatus</i>) (alle gl.).....	15	—	
Sildemaage (<i>Larus fuscus</i>) (alle unge).....	4	—	
Svartbag (<i>Larus marinus</i>) (ung).....	1	—	
Hættemaage (<i>Larus ridibundus</i>) (gl.).....	1	—	
Havterne (<i>Sterna paradisaea</i>).....	—	2	
Alk (<i>Alca torda</i>).....	—	16	9
Lomvie (<i>Uria aalge</i>).....	2	—	1 Fanø
Lærke (<i>Aldauda arvensis</i>).....	1	—	
Allike (<i>Coloeus monedula</i>).....	1	2	
Krage (<i>Corvus corone cornix</i>).....	2	1	
Solsort (<i>Turdus merula</i>).....	—	1	
Stær (<i>Sturnus vulgaris</i>).....	2	2	
	471	53	

HALFDAN LANGE.