

MINDRE MEDDELELSER

Knarand, *Anas strepera*, i Gundsømagle Sø.

11. 4. 1943 saa jeg et Par Knarænder ♀ og ♂ i Gundsømagle Sø, hvor ogsaa flere andre Ornithologer kort efter havde Lejlighed til at iagttage dem samme Dag, inden Fuglene lettede og fløj bort i Retning af Roskilde Fjord.

O. HANSEN.

Fasanæg i Rede af Graaand, *Anas platyrhyncha*.

I en Graaanderede ved Sæbyholm (Lolland) var der 22. Maj 1940, foruden Artens 9 Æg, 3 Stk. af Fasan.

ERIK PETERSEN.

Troldand, *Aythya fuligula*, som ny Ynglefugl paa Bornholm.

I den store Mose Hundse Myre, S. f. Nexø, har den fugleinteresserede Fisker, GEORG KRUSE, Snogebæk, i Sommeren 1943 iagttaget ynglende Troldænder. Det ene Kuld paa 4 Ællinger blev set allerede som Dununger, medens det andet først blev opdaget, da Ungerne var godt paa Vej til at være flyvefærdige. Der er ikke tidligere ved Sommertid iagttaget Troldænder paa Bornholm, medens denne Art særlig i strenge Vintre er ret almindelig paa lavvandede Steder ved Kysten. De omtalte Ællinger opnaede alle at blive fuldt udviklede og forlod først Lokaliteten, da Jagtdagene begyndte. Desværre blev jeg gjort opmærksom paa denne Iagttagelse paa et saa sent Tidspunkt, at et Besøg paa Lokaliteten dette Aar vilde være uden Udbytte.

ARNE LARSEN.

Blisgaas, *Anser albifrons*, og Bramgaas, *Branta leucopsis*.

En Blisgaas vides skudt paa Enehøje, Nakskov Fjord, d. 7. Maj 1939 og 1 Stk. ved Albuen d. 28. Sept. 1941. 10 Bramgæs blev set d. 16. Marts 1943 flyve mod N. Ø. ved Hundige Strand.

ERIK PETERSEN.

Graagaas, *Anser anser*, ynglende i Maribo Sø.

Paa Maribo Søndersø havde jeg d. 31. Maj 1942 Lejlighed til at se 25—30 Graagæs, hvoraf 2 Par var med henholdsvis

3 og 9 Gæslinger, og iflg. Tandlæge M. KJÆRSGAARD HANSEN, Maribo, skal henved 30 Par yngle her. ERIK PETERSEN.

Kortnæbbet Gaas, *Anser brachyrhynchus*, ved Selsø.

Den 25. April 1943 saa jeg ved Selsø i Hornsherred en Kortnæbbet Gaas. Den opholdt sig sammen med en mindre Flok Graagæs, der gik og græssede paa en af de tilstødende Enge. Fuglene var meget tillidsfulde, hvorved man tydeligt kunde se Forskellen paa dem. Den $\frac{1}{5}$ saa jeg i Selskab med Hr. C. A. BLUME og flere andre Medlemmer af Foreningen Fuglen paa samme Sted. Den $\frac{8}{5}$ iagttoges den atter af en Del Medlemmer paa samme Sted, saa der har været Tale om et længere Ophold paa mindst 14 Dage. ERIK HANSEN.

Dværglappedykker, *Podiceps ruficollis*, i stort, samlet Antal.

Deltagerne i en Ekskursion til Selsø Sø d. 4. Oktober 1942 saa, omend paa nogen Afstand, en Flok Dværglappedykkere paa 10 Eksemplarer. Fuglene var hovedsagelig i Vinterdragt. C. A. BLUME.

Stor Stormsvale, *Oceanodroma leucorhoa*, ved Nakskov.

I Samlingen paa Nakskov Kommuneskole findes et Ekspl., der blev fundet død i en Have i Nakskov i Efteraaret 1936. ERIK PETERSEN.

Sen Forekomst af Trane, *Grus grus*, i Jylland.

Da jeg 27. Maj 1943 var paa Ekskursion i Hedeegnen S.V. for Krogager St., bemærkede jeg høje Traneskrig adskillige Gange; senere saa jeg 2 Traner i en nærliggende lille Hedesø ved Elbæk Plantage. J. GERNAA.

En Iagttagelse over en dykkende Unge af Strandskade, *Haematopus ostralegus*.

9. Juli 1943 forfulgte jeg i Ringmærkningsøjemed en Strandskadeunge. Under Jagten søgte Ungen ud i selve Vigen, hvor den p. Gr. af Vanddybden, ca. 40 cm, var tvunget til at svømme. Naar den følte sig truet af min Person, hvad der hændte flere Gange, dykkede den og svømmede videre under Vandet. Medens den saaledes forsøgte at undvige ved Undervandssvøm-

ning, spredte den Vingerne ud. Hvorvidt den under Svømningen brugte Vingerne, som Alkefuglene gør, var jeg ikke i Stand til at afgøre. Noget ganske tilsvarende iagttoges med en Strandskadeunge 2 Dage senere. At Vadefugle og dissers Unger er i Besiddelse af Evnen til at svømme og dykke er en kendt Sag, men at de spreder Vingerne under Undervandssvømning, maa siges at være en Omtale værd.

ELLA ADELHOLT.

Krumnæbbet Ryle, *Calidris testacea*, iagttaget første Gang i Danmark paa Foraarsstrækket.

20. 5. 1943 saa vi paa Taarnby Overdrev paa Amager 1 Krumnæbbet Ryle i Selskab med 6 Brushøns. Fuglen var endnu i Vinterdragt. Iagttagelsen var særdeles bemærkelsesværdig, eftersom det er første Gang, at denne Art er iagttaget i Danmark paa Foraarsstrækket, der ellers maa antages at følge en østligere Rute, som gaar udenom Danmark. 30. 5. 1943 saas Fuglen igen paa det samme Sted. Der bemærkedes nu svagt frembrydende røde Fjer paa dens Bryst.

THORVALD FRØLICH, ERIK HANSEN.

Stormmaage, *Larus canus*, rugende i en Frugtplantage.

Iffg. Meddelelse fra Gartner H. E. LARSEN, Hundige Strand, har siden 1939 nogle Par Stormmaager (mellem 3 og 6 Par) ruget i en Frugtplantage i Brøndbyvester ca. 2 km fra nærmeste Kyst. I Aar har 3—4 Par ruget, Rederne lægges inde under Frugttræerne.

ERIK PETERSEN.

Graamaage, *Larus hyperboreus*, i Sydhavnen.


Ved et Besøg i Sydhavnen d. 23. Marts 1942 saa AXEL LARSEN, VERNER LARSEN og undertegnede en Graamaage, der svømmede rundt i en Vaage blandt en Del Sølvmaager. Den saas ogsaa flyve en kortere Distance. Det drejede sig om en Ungfugl, formodentlig i 4. eller 5. Vinterdragt, idet hovedsagelig Næbbets Farve afveg fra den voksne Fugls.

C. A. BLUME.

Kjover, *Stercorarius parasiticus*, ved Anholt.

Paa Anholt er i Efteraaret 1943 iagttaget 3 Stkr.

HOLTEN LÜTZHØFT.



T. KJÆR fot.

Dununger af Skovsneppe, Rold Skov 8/8 1943.

Sent Fund af ynglende Skovsneppe, *Scolopax rusticola*, i Rold Skov.


Den 3. Aug. 1943 meddelte Skovfoged SØRENSEN, Jægersborg Skovpart under Lindenberg, Rold Skove, at han samme Dag havde fundet en Skovsnepperede med 4 nyklækkede Unger. Jeg tog ud til ham samme Eftermiddag og sammen fulgtes vi ad til Redepladsen, en aaben Bakkeskraaning i Skoven med gamle Træstubbe, Bregner og anden høj Skovbundsvegetation. I Reden laa kun de tomme Æggeskaller, men da vi var ca. 25 Meter fra Reden, fløj en Skovsneppe baskende op med den bekendte „knækkede Vinge“. Vi undersøgte nøje Skovbunden og fandt lige foran vore Fødder 3 smaa Dununger, ca. 2 Dage gamle. Sandsynligheden taler for, at det var Ungerne fra den omtalte Rede, selv om Skovfoged SØRENSEN mente, at de var større end de Unger, han havde set om Formiddagen; Skovsneppen flytter som bekendt ikke sjældent sine Unger.

T. KJÆR.

Søkonge, *Alle alle*, paa Lolland.

Et Eksemplar, skudt ved Vesternæs, modtog jeg d. 17. Jan. 1941 til Udstopning.

ERIK PETERSEN.



T. KJÆR fot.

Rede af Sort Stork, Lille Vildmose $\frac{2}{8}$ 1943.

Sort Stork, *Ciconia nigra*, i Tofte Skov.

I 1943 rugede den sorte Stork i Vildtreservatet i Lille Vildmose i en gammel Bøg. I mange Aar har Storkeparret — Vildmosens eneste — boet i en gammel Birk, sidst i 1942, hvor der blev udklækket 3 Unger. Det gamle Redetræ væltede af Vinterstormene 1942/43. I 1943 blev der ogsaa udklækket 3 Unger. Paa Billedet, der er taget d. $\frac{2}{8}$, ses to af Ungerne. Den tredje Unge ligger ned og er derfor ikke kommet med paa Billedet, der er taget paa ca. 15 Meters Afstand.

T. KJÆR.

Iagttagelser af Rørdrum, *Botaurus stellaris*.

Ved en Ekskursion til Selsø d. 14. Maj 1942 havde Deltaerne Lejlighed til at høre Rørdrummen. Den holdt til i Rørskoven ved Søens vestlige Bred.

C. A. BLUME.

Natten til d. 31. Maj 1942 havde jeg flere Gange Lejlighed til paa 2 forskellige Steder ved Maribo Sø at høre Rørdrummen, og iflg. Tandslæge M. KJÆRSGAARD HANSEN, Maribo, skal 2 Par yngle der.

ERIK PETERSEN.

I Mosen Hundse Myre, S. f. Nexø, har Fisker GEORG KRUSE, Snogebæk, flere Gange i Sommeren 1943 hørt Rørdrummens Brølen ude fra den vældige Skov af Dunhammer, der med rivende Hast er vokset op i de nye Tørvegrave. En svag Mulighed for at Rørdrummen har ynglet paa Bornholm, synes altsaa at foreligge.

ARNE LARSEN.

Vandrefalk, *Falco peregrinus*, i Rold Skov.

Den kendte jyske Ornitholog THORVALD KJÆR skildrer i en Artikel i „Aalborg Stiftstidende“ 20. Juni 1943 Vandrefalken som Ynglefugl i Rold Skov. Dens Ynglen her er af ret ny Dato. I 1938 fandtes dens Rede ved, at man undersøgte en gammel Rede af Sort Stork, i hvilken man til stor Overraskelse fandt to Vandrefalkeunger. Fundet blev optaget til Jagtfilmen. I 1942 var der to Par Vandrefalke i Rold Skov. Den ene Rede fandtes i en høj Bøg, og ved et nærliggende Egetræ var Mængder af Fjer og Knogler af Skovdue ophobet, foruden enkelte Hønsefjer og Kløer af Skovskade. Dette Par havde specialiseret sig paa Skovduer, hvilket havde haft til Følge, at Skovduerne i denne Del af Skoven var gaaet meget tilbage. I den anden Vandrefalkerede laa, foruden to fuldvoksne Unger, en hel Høne samt talrige Hønsefjer; dette Par var altsaa knapt saa uskyldigt. Ogsaa 1943 konstateredes begge Parrene i Rold Skov.

Det er glædeligt, at Vandrefalken har slaaet sig ned i Rold Skov og i det godt beskyttede Omraade kan holde sin Stilling, særlig paa Baggrund af, at det eneste hidtidige danske Ynglepar (i Ekkodalen paa Bornholm) nu synes at være forsvundet.

FINN SALOMONSEN.

Glente, *Milvus milvus*, i Danmark.

19. April 1940 set en rød Glente trække over Hellerup.

ERIK BEGTRUP.

Fiskeørn, *Pandion haliaetus*, i Danmark.

Over Faxinge Skov iagttog jeg d. 11. April 1938 en Fiskeørn, der fløj mod N. og d. 29. April og 4. Maj en mod N.Ø.

ERIK PETERSEN.

Natravn, *Caprimulgus europaeus*, paa Saltholm.

I Amagerskov paa Saltholm saas d. 4. Juni 1939 en Natravn.

ERIK PETERSEN.

Hærfugl, *Upupa epops*, iagttaget paa Amager.

28. 8. 1943 saa jeg en Hærfugl paa Amagers Vestkyst lige Syd for Grundejerforeningen „Nøragersminde“. Fuglen, der havde siddet skjult i højt Græs, lettede knap 2 m fra mig, fra en typisk Hærfuglelokalitet, et lille Overdrev, paa hvilket der græssede en Del Kreaturer, og hvor der af den Grund fandtes ikke saa faa Kokasser.

THORVALD FRØLICH.

Langsomt trækkende Vendehalse, *Jynx torquilla*.

Det er bemærkelsesværdigt, at to Vendehalse hver opholdt sig mindst een Uge i samme Terræn paa Amager paa Efteraarstrækket. Den ene saas første Gang paa Kongelundsfortets Terræn d. 16. Aug. 1942; den saas paa nøjagtigt samme Sted d. 23. Aug. Den anden Vendehals saas første Gang d. 5. Sept. 1942 af I. GERNAA i den sydvestlige Udkant af Kongelunden, hvor den atter saas d. 13. Sept.

C. A. BLUME.

Allike, *Coleus monedula*, og Musvit, *Parus major*, som Mælketve.

I Anledning af Meddelelsen om Stor Flagspætte som Mælketyv (D. O. F. T., 37, p. 184) beretter Hr. Redaktør FRELLESVIG, Holstebro, om en Allike, der ligeledes gaar angrebsvis til Værks overfor Mælkeflaskernes Aluminiumskapsler, idet den dog hugger et Hul midt i Kapslen. Yderligere kan jeg meddele, at Musvitten gaar frem paa ganske samme Maade, hvad jeg gentagne Gange har iagttaget, naar Mælkeflasker bliver sat ud paa Altanen her i Charlottenlund.

P. JESPERSEN.

Drosselrørsanger, *Acrocephalus arundinaceus*, ved Borup.

6. Juni 1943 hørtes Drosselrørsanger i Kimmerslev Sø ved Borup.

FRODE ECKARDT.

Gransanger, *Phylloscopus collybita*, paa Sjælland.


6. Juni 1943 hørtes Gransanger i Hejdeoredrev mellem Særlose og Gyldenløves Høj.

FRODE ECKARDT.

**Forstuesvale, *Hirundo rustica*,
med mærkelig Anbringelse
af Rede.**

I et Baghus i Nakskov havde jeg i August 1943 Lejlighed til nogle Gange at se en Forstuesvalerede, der var anbragt paa et Tøndebaand, der hang frit ned fra en Bjælke, saaledes som Tegningen viser. Tøndebaandet var med Reden til at løfte ned fra Sømmet. Der havde været et Kuld paa 5 Unger og senere var der 3 Æg i Reden.

HERTHA PETERSEN.



**Rødtoppet Fuglekonge, *Regulus ignicapillus*, i Hornebysand
Plantage og (som Ynglefugl?) i Hornbæk Plantage.**

Stud. polit. PALM var den første, der saa den Rødtoppede Fuglekonge i Hornebysand Plantage. PALM, der tilbragte Dagene fra d. $23/4$ — $26/4$ 1943 i Hornbæk, havde dagligt Lejlighed til med Sikkerhed at iagttage i hvert Fald 1 syngende Exemplar i Hornebysand Plantage.

Den $24/4$ om Eftermiddagen var FRØLICH, DRUCKER og TILLISCH sammen med PALM i Plantagen; 1 syngende Fugl blev konstateret Øst for Prinsesse Margarethas Kystsankatorium umiddelbart efter, at PALM havde fulgt et syngende Individ Vest for Sanatoriet, ca. 500 m længere borte. Fuglene blev set paa godt Hold. PALM skriver bl. a.: „Samme Eftermiddag studerede jeg i øvrigt den R. F. under ganske særligt fortræffelige Betingelser. Fuglen smuttede da omkring under livlig Sang i lave Graner i disses nederste Grene (ca. 1 m over Jorden) blot ca. 5 m fra mig“.

Den $9/5$ tog ERIK HANSEN til Hornebysand Plantage, for at se Fuglekongen; den var imidlertid forsvundet derfra. E. H. genfandt den ca. 3 km fra det oprindelige Sted, nemlig i den vestlige Del af Hornbæk Plantage. E. H. skriver bl. a.: „Jeg blev

opmærksom paa den ved at høre Stemmen, som den brugte ret hyppigt. Den opholdt sig næsten hele Tiden i Toppen af de høje Graner og var meget urolig⁴.

Den $15/5$ saa og hørte Sv. LARSEN en Rødtoppet Fuglekonge paa det af E. H. opgivne Sted. Den $16/5$ om Formiddagen saa og hørte Sv. LARSEN 1 Exemplar, og om Eftermiddagen saa og hørte han sammen med TILLISCH, FALKENBERG RASMUSSEN og JÜRGENSEN 2 Exemplarer paa dette Sted; muligvis var der ogsaa et tredie Exemplar, men det blev ikke fastslaaet med Sikkerhed.

Den $22/5$ var DRUCKER, ECKARDT og undertegnede i Terrainet; vi fandt hurtigt Fuglen efter Sangen. Efter kort Tids Forløb saa vi en anden Fugl, sandsynligvis en Hun. De to Fugle holdt meget sammen; den ene sang hyppigt, den anden sang derimod ikke. I al den Tid vi var der, opholdt Fuglene sig i det samme begrænsede Terrain, der var ca. 25×25 m stort; det var bevokset med høje Graner og enkelte Birketræer. Fuglene opholdt sig mest ret højt oppe i Granerne, men kom lejlighedsvis lavt ned, og da de var meget tillidsfulde, havde vi rig Lejlighed til nøje at studere dem. DRUCKER mente at høre en Han, altsaa en tredie Fugl, lidt Øst for dette Terrain, men den blev ikke konstateret med Sikkerhed. Vi var ogsaa i Hornebysand Plantage, hvor PALM først konstaterede den, men der hørtes eller saas ingen; dette Terrain er ogsaa en lidet egnet Ynglelokalitet.

Den $4/6$ hørte og saa Sv. LARSEN en Han paa det sædvanlige Sted. Den $18/6$ hørte og saa GUILDAL en Han ivrigt syngende paa samme Lokalitet. Den $4/7$ var GUILDAL og PALM atter paa Stedet; de saa og hørte en Han, men den sang ikke tilnærmelsesvis saa meget som tidligere, og den syntes at være mindre bundet til den samme begrænsede Lokalitet som før. Da den Rødtoppede Fuglekonge er set gentagne Gange paa nøjagtigt samme lille Plet, første Gang d. $9/5$ og sidste Gang d. $4/7$, og Stedet er et udmærket Yngleterrain, har jeg Grund til at tro, at den Rødtoppede Fuglekonge har ynglet paa Lokaliteten, selv om Reden ikke blev fundet.

PALM, der ved tidligere Lejligheder har iagttaget den Rødtoppede Fuglekonge, mener, at den ikke er saa sjælden, som det almindeligvis antages.

For at konstatere den, skal man først og fremmest have sin Opmærksomhed henvendt paa Sangen, der afviger en Del fra den alm. Fuglekonges, *Regulus regulus*, selv om Klangfarven omtrent er den samme. Medens Tonehøjden i den alm. Fuglekonges Sang bevæger sig ujævnt op og ned, og Sangen tiltager i Hurtighed mod Slutningen, saa holder den Rødtoppede Fuglekonges Sang sig hele Tiden omtrent paa samme Tonehøjde, men tiltager i Kraft mod Slutningen.

Har man først faaet den Rødt. F. i Kikkerten, skelnes den fra den alm. F. paa en tydelig, sort Stribe gennem Øjet og paa en tydelig, hvid Stribe over Øjet (samt en utydelig, hvid Stribe under Øjet), som den alm. F. ganske mangler; endvidere er Undersiden noget lysere og kontrasterer saaledes mere mod Oversiden hos den Rødt. F. end hos den alm. F. Paa Skulderen har den Rødt. F. en gulgrøn Plet, som alm. F. mangler. Forskellen paa den gyldne Krones Farve er derimod ringe og afgiver intet Kendemærke for Feltornitologen.

C. A. BLUME.

Rødtoppet Fuglekonge, *Regulus ignicapillus*, i Store Hareskov.

En enkelt, syngende Rødtoppet Fuglekonge blev d. 16/5 1943 iagttaget af min Hustru og mig i et Afsnit med høje Graner ca. 200 m Nordøst for Hareskov Station.

BØRGE PALM.

Sorttrygget Vipstjert, *Motacilla alba yarrellii*, ved Saltbækvig.

I Dagene 6. og 8. Juli 1943 iagttoges 1 Eksemplar ved Lille Vrøj.

ELLA ADELHOLT.

Solsort, *Turdus merula*, som Rovfugl?

I Nakskov Indrefjords Anlæg saa jeg d. 23. Maj 1943 en Solsort ♀ tage en lille Mus (vist en Unge) og flyve bort med den.

ERIK PETERSEN.

Husrødstjert, *Phoenicurus ochrurus gibraltariensis*.

Husrødstjerten er øjensynlig ved at brede sig i København, hvor den for blot en halv Snes Aar siden var en ret sjælden Fugl. Jeg har i de senere Aar truffet den følgende Steder: 18. Maj 1939 Islands Brygge, 6. Maj 1943 Rentemestervej, Nørrebro, 16. Maj 1943 Kalvebod Brygge, 9. Juli 1943 Enghave Re-

mise, Vesterbro. Disse Steder er alle Ynglepladser. Ydermere har jeg fra anden Side Underretning om Ynglepladser i Københavns Sydhavn, Amager Fælled samt Kastrup paa Amager. Lokalteterne ligner alle hinanden. Det er Tømmerpladser, Kulpladser og Fabrikker med Haller eller halvaabne Skure; under saadanne Steders Tagkonstruktioner er Reden i flere Tilfælde fundet.

I. GERNAA.

5. Juni 1943 iagttog jeg i Skumringen en syngende Hus-
rødstjert ved Havnen i Holbæk.

FRODE ECKARDT.

**Sen Yngletid for Dompap, *Pyrrhula pyrrhula minor*,
i Sydslesvig.**

I mit Kartotek over „Fugle i Sydslesvig“ har jeg blandt meget andet om Lille Dompap (*Pyrrhula pyrrhula minor* Br.) noteret nedenstaaende:

18. September 1941 Klokken 16,50 (Normaltid) hørte jeg fra et Syrenhegn ved den østlige Side af Vejen mellem Mysunde Færgetro og Mysunde By en noget hæs Fuglestemme, som jeg ikke helt kunde klare. Ved Eftersyn i Buskene sad der en Dompapunge, som blev madet af en Han, der paa Grund af den sene Aarstid var noget mat i Farverne. Hannen samlede Frø af forskellige Planter, som stod i og langs Hegnene, medens Ungen uafbrudt lod Stemmen, der mindede om hæse Fløjt, høre. Naar Hannen havde Næbbet fyldt, fløj den hen til Ungen, som modtog den med aabent Næb og baskende Vinger. Ungen, som maatte være nys udfløjet, var nærmest graa med kort Næb og havde lys Overgump og meget kort Hale. Den mindede mest om en Bogfinkeunge. Først efter at jeg længe havde overværet flere Fodringer paa en Afstand af ca. 3 m blev Hannen urolig og gav sig til at fløjte. Ungen reagerede straks og hoppede med baskende Vinger fra Gren til Gren ind i Hegnets modsatte Side. Hunnen eller andre Unger blev ikke set. Idet jeg skulde med Damperen til Slesvig, blev der heller ikke Tid til Efterforskning.

21. September Klokken 17,20 kom jeg samme Vej og saa da, paa omtrent samme Sted i Syrenhegnet, Hannen ved at made Ungen, som nu var helt flyvedygtig og uafbrudt fulgte efter, naar der samledes Føde. Denne Gang saas heller intet

til Hunnen eller andre Unger. I Nærheden ved Færgækroen paa Skraaningen mod Slien findes en lille Granlund, hvor Rugepladsen antagelig har været. Efter Ungens Størrelse og Udvikling at dømme, maa Rugningen være paabegyndt saa sent som omkring Midten af August. JØRGEN JØRGENSEN.

EKSKURSIONER

Zoologisk Have 14. Marts 1943.

I det dejlige Vejr samledes ca. 70 Deltagere Kl. 10 ved Hovedindgangen, hvor man mødtes med Lederen, Direktør A. REVENTLOW. Man gik først til Svømmedammen, hvis smukke Bestand af Svømmefugle blev grundigt gennemgaaet. Af Fuglehusets store Fuglebestand interesserede man sig særligt for den sidste Kolibri, der nu lever i Haven paa syvende Aar, iøvrigt en Rekordtid. Blandt andre interessante Fugle kan nævnes Krøgnæbbene i Voliëren med de nordiske Spurvefugle. Overalt saa man, at det trods de vanskelige Tider var lykkedes Ledelsen at opretholde en smuk, righoldig og velplejet Samling Fugle. Efter et Par Timers Tid sluttede man Rundturen og takkede Dir. REVENTLOW for hans instruktive Ledelse.

HOLGER POULSEN.

Lynby 21. Marts 1943.

De ca. 50 Deltagere mødtes Kl. 9¹⁵ paa Sorgenfri Station. Formaålet var Iagttagelse af vore almindelige Standfugle og Vintergæster. Vejret var godt og Udbyttet tilfredsstillende. Man gik først til Lynby Sø, hvor man saa enkelte Troldænder, Taffelænder, Toppede Lappedykkere og Blishøns, samt nogle Sølvmaager og Stormmaager. Derefter gik man over i Sorgenfri Slotspark, videre langs Mølleaaen til Ørholm, hvor Frokosten indtoges. Efter Frokost gik Turen gennem Geel Skov til Furesøen og derefter til Holte, hvor man sluttede Kl. ca. 15. I Furesøen saas en Del Troldænder, Taffelænder, Blishøns og enkelte Svaner.

Desuden saas følgende Arter: Skade, Allike, Krage, Spætmejse, Stær, Gærdesmutte, Brunelle, Musvit, Blaamejse, Sortmejse, Sumpmejse, Fuglekonge, Solsort, Rødhals, Bogfinke, Grønsisken, Lille Korsnæb, Gulspurv, Stor Flagspætte, Ringdue.

HOLGER POULSEN.

Søborg Mose 4. April 1943.

De ca. 70 Deltagere mødtes paa Brønshøj Torv Kl. 9. Man gik først til Kirkemosen for at se den Rødhalsede Lappedykker; derfra gik man over til den sydligste Del af de tre Dele, Søborg Mose er blevet inddelt i af to store Cementbroer. Deltagerne gik omtrent helt omkring denne Del af Mosen, hvor Fuglelivet var rigt saa vel paa Vandet som i Luften; Antallet af Arter var dog ikke særlig stort. Efter Gennemgangen af denne