


Sjældne fugle på Færøerne i 2003 og 2004

SØREN SØRENSEN OG JENS-KJELD JENSEN

Rapport nr 35 fra Sjældenhedsudvalget



(With a summary in English: *Rare birds in the Faroe Islands in 2003 and 2004*)

Indledning

Rapporten indeholder de sager, som Sjældenhedsudvalget (SU) har færdigbehandlet i perioden 2003 og 2004. I alt er der godkendt 53 sager. De omfatter 5 nye arter, Sortbrun And, Hvidrygget Ryle, Grøn Biæder, Musvit og Pileværling. Amerikansk Pibeand og Halsbåndstroland er truffet for anden gang. Desuden er Sortrygget Vipstjert fundet som ny ynglefugl i par med Hvid Vipstjert. Der er også godkendt to nye arter, som vil være på den færøske liste som henholdsvis kategori C- og E-fund.

De mange nye arter er et klart udtryk for, at fugleinteressen fortsat er stigende, og faldet i antal sager i forhold til forrige rapport skyldes udelukkende, at listen over arter, der skal forelægges SU, er blevet væsentlig indskrænket. Der er nu et stigende antal sager, der bliver dokumenteret ved foto eller video af levende fugle, og det er også glædeligt, at naturinteresserede fortsat henvender sig f.eks. ved fund af døde fugle, som de ikke umiddelbart kender.

Ved hvert fund er nævnt: 1) årstal og dato; 2) lokalitet og ø; 3) antal, hvis der er flere end én; 4) evt. alder/dragt, køn, tilstand ved fundet; 5) observatør/finders navn med finderen angivet med en asterisk (*). Følgende forkortelser er anvendt: ad.

= adult (udfarvet, kønsmoden); imm. = immatur (ungfugl som har fældet sin første fjerdragt); juv. = juvenil (ungfugl i sin første fjerdragt); ringm. = ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet: (1) antal fund og individer (adskilt ved en skråstreg) før 1950; (2) antal fund og individer 1950-2002; (3) antal fund og individer i 2003-2004. Antal fund kan afvige fra antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkelt-individer samme dag regnes som fem fund. Der regnes også med flere fund, når et individ vender tilbage til samme lokalitet over flere år.

Sagsbehandlingen foretages fortsat af DOFs sjældenhedsudvalg efter aftale med Føroya Náttúrgripasavn (Naturhistorisk Museum i Tórshavn) og senere også Føroya Fuglafrøðifelag (FFFF). Kontaktperson for SU angående Færøerne er Jens-Kjeld Jensen. Indberetning af en sjældenhed består af oplysninger om omstændighederne for fundet, grundig beskrivelse af fuglen(e), samt eventuel anden dokumentation, f.eks. i form af foto eller båndoptagelse. Listen, som anføres de arter, der skal forelægges SU, er revideret i 2003 og kan fx findes på www.netfugl.dk, se forsiden under "artikler".

Sidst i rapporten er anført sager, der ikke er godkendt. Indsendelse af rapporter til SU og alle henvendelser og forespørgsler kan ske til Jens-Kjeld Jensen eller Søren Sørensen på nedennævnte adresser.

Der skal rettes en tak til Marita Gulkleit, Kaj Kampp og Knud Pedersen, som har gennemlæst og kommenteret rapporten. Først og fremmest skal der dog være en stor tak til observatører og indsendere, der har skabt det nødvendige grundlag for rapporten.

Kategori A: Spontane forekomster

Category A: *Species recorded in an apparently wild state*

Gråstrubet Lappedykker *Podiceps grisegena*

Øsgrá Gjør (1/1, 1/1, 1/1)

2003: 7.1, Haraldssund, Kunoy, *Silas K. K. Olofson.

Det tredje fund af arten, men den første feltobservation. Også de tidligere er fra vinterhalvåret, ligesom næsten alle 38 islandske fund.

Dværghejre *Ixobrychus minutus* Vætturhegri

(4/4, 1/1, 1/1)

2003: 21.5, Klaksvík, Borðoy, ad. ♂ fundet afkræftet senere aflivet, *Sólbjørn Hansen (foto).

Det eneste andet fund fra nyere tid er fra 29/9 1988, og det var ligeledes en fugl, der blev fanget og døde i fangenskab.

Silkehejre *Egretta garzetta* Silkihegri

(0, 5/5, 1/1)

2003: 17.5, Heimara Hálsavatn, Sandoy, *Hanna Joensen (foto).

Arten er nu truffet 6 gange siden 1988 med 4 i april/maj og 2 i det sene efterår – en fordeling der stort set svarer til de 9 islandske fund.

Gravand *Tadorna tadorna* Kápureyð Ont

(5/6, 8/9, 1/2)

2004: 27-28.8, Sandur, Sandoy, 2 1K, *Hanna Joensen (foto).

To årsunger er hermed set for første gang, og de kan eventuelt stamme fra den fortsat stigende islandske bestand på mindst 13 par i 2002 (Kolbeinsson et al. 2005).

Amerikansk Pibeand *Anas americana* Bolladunna

(0, 1/1, 1/1)

2003: 11.5, Kollafjørður, Streymoy, ad. ♂, *Rodmund á Kelduni (video).

Anden forekomst på Færøerne. Den første var 7/6 1984.

Knarand *Anas strepera* Sutlont (0, 8/14, 0/0)

2002: 26.4, Sandur, Sandoy, ad. ♂ og ♀, *Hanna Joensen (foto).

Arten optræder ofte som par på Færøerne, og som tidligere er det i forår eller forsommer.

Sortbrun And *Anas rubripes* Dimmmorreyð Ont (0, 0/0, 1/1)

2003: 10.1, Viðarlundin Tórshavn, Streymoy, ad. ♂, *Silas K. K. Olofson (foto). – 12.2, samme lokalitet, samme individ, *Bjarni Mikkelsen (foto).

Første fund og dermed endnu en amerikansk gæst på Færøerne. Ud fra foto kan det bekræftes, at det var samme individ, der dukkede op blandt Gråænderne i "byparken" med ca. en måneds mellemrum. Men trods søgning blev den ikke fundet mere, her eller andre steder.

Atlingand *Anas querquedula* Teymont

(-/-, 2/2, 1/1)

2004: 9-20.5, Múlavík ved Eiði, Eysturoy, ad. ♂, *Rodmund á Kelduni (video).

De to seneste forekomster har også været i maj måned.

Halsbåndstroland *Aythya collaris* Helsut Trøllont (0, 1/1, 1/1)

2003: 16-24.5, Vatnsoyrar, Vágur, ad. ♂, *Rodmund á Kelduni (video). – 25.5, Toftavatn, Eysturoy, formodentlig samme ♂, *Silas K. K. Olofson (foto).

Hermed for anden gang på Færøerne. Den første var en ungfugl 20/9-27/9 1984.

Strømand *Histrionicus histrionicus* Brimont

(0, 15/20, -/-)

2003 og 2004: Muligvis samme han og senere én og to hunner har optrådt årligt ved Kirkjubøur siden 1990. Se i øvrigt kommentar i Sørensen & Jensen (2004). I den aktuelle periode er en han og hun også set på lokaliteten, men har ikke været forelagt SU.

Fløjsand *Melanitta fusca* Spegilsont

(3/4, 4/5, 3/5)

2003: 1.4-25.10, Miðvágur, Vágur, 2 ad. ♂♂, og fra 29.10 og ind i 2004 1 ad. ♂, *Rodmund á Kelduni (video).

2004: 1.1-9.5, Miðvágur, Vágur, ad. ♂ og 15.2-18.3 også ♀, *Rodmund á Kelduni (video). – 8.10 og ind i 2005, Miðvágur, Vágur, ad. ♂ og 1.11 også ♀, *Rodmund á Kelduni (video).

Fra 2001 har denne sjældne art gæstet bugten på Vágur. Først var det en enkelt han, men nu altså også flere fugle og tilmed i meget lang tid (Sørensen & Jensen 2004).



Sortbrun And ♂ med Gråand ♂ og ♀, Tórshavn 12/2 2003. Foto: Bjarni Mikkelsen. *American Black Duck*.



Halsbåndstroland ♂, Toftavatn 25/5 2003. Foto: Silas K.K. Olofson. *Ring-necked Duck*.

Hvæpsevåge *Pernis apivorus* Bývákur
(2/2, 5/5, 0/0)

2000: primo september, havet syd for Mykines, 1K ♂ taget på fiskebåd og døde senere, *Åge Davidsen (foto).

Denne fund er næsten identisk med et fra samme efterår: ca 1/10, havet øst for Nólsoy, 1K ♂ senere død, *Jógvan Joensen (foto). Desværre var dette fejlagtigt angivet til 2002 i sidste SU-rapport (Sørensen & Jensen 2004). Dermed er der tre efterårsfund, alle juvenile, og fire fund fra maj/juni. Fire ud af de fem fund på Island er fra efteråret, heriblandt også en fra 2000, som blev fundet afkræftet 24/9 (Kolbeinsson et al. 2003).

Rørhøg *Circus aeruginosus* Blotaheykur
(3/3, 1/1, 1/1)

2003: 13.5, Søltuvík, Sandoy, 2K, *Hanna Joensen (foto).

Denne er det første fund siden 1980, og tilmed den første feltobservation og den første fra foråret.

Spurvehøg *Accipiter nisus* Spurvaheykur
(1/1, 6/6, 1/1)

2003: 21.5, Úti í Grøv, Borðoy, *Silas K. K. Olofson (foto).

De 8 fund fordeler sig fra sent efterår, vinter og til forår, med denne som den seneste på forårstrækket.

Fjeldvåge *Buteo lagopus* Fjallvákur
Med karakterer svarende til Amerikansk Fjeldvåge ssp. *sanctijohannis* (0, 1/1, 0/0):

2003: 13.10, havet syd for Grønland, 1K mørk fase taget på fiskeskib og sejlet til Tórshavn, via Åge Davidsen (foto).

Denne fugl, fanget i internationalt farvand syd for Grønland, indregnes ikke på den færøske liste.

Fiskeørn *Pandion haliaetus* Gjódður
(3/3, 9/10, 1/1)

2003: 15.6, Mykines, ad. ♀ kommet til skade og aflivet, *Esbern i í Eyðansstovu (foto).

Hermed er den truffet 8 gange i maj/juni, de øvrige er fra efteråret.

Plettet Rørvagtel *Porzana porzana* Døggsmetta
(0, 6/6, 1/1)

2003: 14.6-6.7, Sandsvatn, Sandoy, *Malcolm Smith, *Pete Ellis, Hanna Joensen m.fl. (bånd).

Hidtil har der kun været dødfundne fugle, og fem ud af de seks er fra efteråret. Men med denne var det endelig en stationær kaldende fugl på ynglebilotop.

Hvidrygget Ryle *Calidris fuscicollis* Nevstuttur
Grælingur (0, 0, 1/1)

2003: 18-24.10, Sørvágur, Vágar, 1K, *Rodmund á Kelduni (video).

Et længe ventet førstegangsfund på Færøerne! På Island er det den hyppigste nearktiske vadefugl med i alt 61 fugle t.o.m. 2002.

Lille Kobbersneppe *Limosa lapponica* Lónspógvi
(8/8, 5/7, 2/2)

2003: 10.10-21.12, Miðvágur, Vágar, 1K, *Rodmund á Kelduni (video).

2004: 6.1-4.4, Miðvágur, Vágar, 2K givetvis samme som ovenfor, *Rodmund á Kelduni (video). – 16-18.9, Sørvágur, Vágar, *Rodmund á Kelduni (video).

Her er bl.a. den første vinterforekomst på Færøerne, der skal ses i forhold til en overvintrende bestand på bl.a. Ydre Hebrider.

Dværghmåge *Larus minutus* Dvørgmási
(8/8, 0/0, 3/3)

2003: 14.5, Kunoy-dæmning, Borðoy, ad., *Silas K. K. Olofson (foto).

2004: 10.4, Nólsoy bygd, Nólsoy, ad., *Jens-Kjeld Jensen og Marni Johannesen (foto). – 24-



Dvergmåge med Rider, Nólsoy 24/5 2004. Foto: Jens-Kjeld Jensen. *Little Gull*.

25.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ad., *Jens-Kjeld Jensen m.fl. (foto).

Tre fund, og alle fra foråret, er de første siden 1949. De otte gamle fund er fra efterår og vinter. Arten har en stigende forekomst på Island med de fleste i forår/forsommer (se www.hi.is/~yannk/varia.html).

Ismåge *Pagophila eburnea* Ísmási (20/20, 4/4, 1/1)

2004: 16-18.11, Tórshavn havn, Streymoy, 1K, *Hans Eli Sivertsen og Janus Hansen (foto).

Den sidste før denne var i november 2000, men de øvrige er ældre og hovedparten fra 1800-tallet.

Hvidvinget Terne *Chlidonias leucopterus* Vong-hvítt Svartterna (1/1, 1/1, 2/2)

2003: 18.7-ca 1.8, Kaldbaksbotnur, Streymoy, 3K+, *Jochen Schreiber, Petur Mortensen m.fl. (video). – 15-30.9, Sandur, Sandoy, 3K+, *Hanna Joensen (foto).

To fugle, der begge var stationære i længere tid, den første i en havternekoloni! Det kan eventuelt have drejet sig om samme individ.

Gøg *Cuculus canorus* Geykur (9/9, 5/5, 1/1)

2004: 2.9-18.10, Hvannasund, Viðoy, *Hans Jørgen Nysted m.fl. (foto).



Ismåge 1K, Tórshavn 16/11 2004. Foto: Hans Eli Sivertsen. *Ivory Gull*.

Den fjerde fra efteråret og langt den seneste. Før den forsvandt endelig, var den tydeligt afkræftet.

Grøn Biæder *Merops superciliosus* Grønur Bý-flugubítur (0, 1/1, 0)

2002: 18.7, havet øst for nordlige Suðuroy, 2K+ ♂ afkræftet og senere død, *Tony Olsen (skind).

For første gang på Færøerne og en eksotisk og uventet forekomst her langt på den forkerte side af Middelhavet, men dog med nyere fund i bl.a. Danmark og England. Finderen troede, det var en "almindelig" Biæder, og den befandt sig i månedsvis i hans dybfryser.

Bysvale *Delichon urbica* Lonasvala (-, -, -)

2003: juli, Vágur, Suðuroy, ynglefund, *Poul Magnussen m.fl. (foto).

Der er nu fire ynglefund inden for de senere år, og arten skal ikke mere forelægges SU.

Digesvale *Riparia riparia* Áarsvala (5/5, 7/11, 1/1)

2003: 19.5, Hvannasund, Viðoy, *Silas K. K. Olofson (foto).

Arten er langt fra så regelmæssig som Landsvale og Bysvale, men givetvis noget overset. Bl.a. i betragtning af at den er nem at bestemme er den fra 2003 ikke længere på SU-listen.

Gul Vipstjert *Motacilla flava* Gulerla

Med karakterer svarende til Almindelig Gul Vipstjert ssp. *flava* (-, -, 1/1):

2004: 16.6, havet sydvest for Suðuroy, på fiske-skib, *Hans Eli Sivertsen (foto).

Det er kun Gul Vipstjert bestemt til underart, der skal forelægges SU. Inden for den seneste snes år er der godkendt to af underarten *flavissima* og én af *thunbergi*, og nu først det aktuelle fund af *flava*. Det er meget tvivlsomt, om sidstnævnte underart – fra den sydlige del af Skandinavien – er den mindst sjældne af de Gule Vipstjarter på Færøerne, sådan som det tidligere har været antaget.

Bjergvipstjert *Motacilla cinerea* Áarerla
(1/1, 3/3, 1/1)

2003: 22.5, Úti í Grøv, Klaksvík, Borðoy, *Silas K. K. Olofson og *Helgi Christensen.

Fire ud af de fem fund er efter 1990, og de fordeler sig nu over alle fire årstider. På Island derimod er den en udpræget efterårsgæst (www.hi.is/~yannk/varia.html).

Hvid Vipstjert *Motacilla alba* Erla Kongsdóttir
Med karakterer svarende til Sortrygget Vipstjert ssp. *yarrellii* (2/2, 3/3, 1/1)

2004: 21.6-15.7, Gróthusvatn, Sandoy, ad. ♂ ynglende med ssp. *alba*, *Willy Mardal og *Hanna Joensen (foto).

Det er første gang denne britiske underart af Hvid Vipstjert er fundet ynglende på Færøerne, og parret fik fire udføjne hybridunger. Blandede par er bl.a. også fundet i Skotland. Arten er fåtallig som ynglefugl både på Færøerne (med *alba*) og på Shetland (med *yarrellii*) (Thom 1986).

Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata* Svart-stólpa (5/7, 3/3, 3/4)

2003: 7.1, Árnafjørður, Borðoy, ♂ og ♀, *Silas K. K. Olofson. – 8.3, Havnardalur, Streymoy, ♂ fundet død, *Dánial Jespersen Jespersen (foto). – 15.4, Mykines, ♂, *Esbern í Eyðansstovu.

Der var også en fugl på Borðoy 12/10 2002 og dermed altså i alt fem individer på et halvt år, hvilket svarer til den samlede forekomst i de foregående 100 år. Det nærmeste yngleområde er på Ydre Hebrider (se også kommentar i seneste rapport, Sørensen & Jensen 2004).

Skovsanger *Phylloscopus sibilatrix* Grønljómarí (9/9, 8/8, 1/1)

2003: 17.5, Úti í Grøv, Klaksvík, Borðoy, *Silas K. K. Olofson.

Blot fire af de 18 fund har været fra foråret, resten fra efteråret.

Lille Fluesnapper *Ficedula parva* Smánápur (1/1, 5/5, 1/1)

2003: 29.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K ringmærket, *Jens-Kjeld Jensen (foto).

Seks ud af de syv fund er fra september/oktober.

Musvit *Parus major* Stórtíta (0, 0, 1/2)

2003: 2.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, 2 ringmærket (heraf 1 2K mærket i Danmark), siden det ene individ set til 6.5, *Jens-Kjeld Jensen (foto).

Ny art for Færøerne og tilmed med en historie, der vakte opmærksomhed både i færøske og danske medier. De to fugle blev fanget samtidig i helgolandsfælden på Nólsoy. Den ene var allerede mærket i Bjergby på Vestsjælland som 1K 13/8 året før. Navngivne troværdige vidner beretter om to Musvitter på færgen Hanstholm-Lerwick-



Musvitter, Nólsoy 2/5 2003. Foto: Jens-Kjeld Jensen. Great Tit.

Tórshavn 13/4 flere timer før ankomsten til Lerwick (Jesper Johannes Madsen (ZM) in litt.), og Christian Petersen fortæller om to Musvitter i sin have i Fámjín, Suðuroy, fra ca 15/4 til 1/5. Arten er placeret som spontan forekomst på den færøske liste (kategori A) til trods for den yderst sandsynlige transport med skib, fordi fuglene ikke er blevet fodret eller holdt fanget ombord. Musvit er i øvrigt truffet fire gange på Island.

Pirol *Oriolus oriolus* Gyllingur (1/1, 7/7, 1/1)

2003: 10.10, Tórshavn, Streymoy, 1K ♂ fundet nyligt død, *Kasandra Joensen (skind).

De otte tidligere fund er alle fra maj til primo juli.

Rødrygget Tornskade *Lanius collurio* Morbøkukur Tyrningur (1/1, 13/13, 1/1)

2004: 15.7, Trongisvágur, Suðuroy, ad. ♂, *Turið Vestergaard m.fl. (foto).

Det første fund i juli, mens de tidligere alle har været i juni eller september.

Rosenstær *Sturnus roseus* Brandstari (5/5, 10/10, 1/1)

2003: 3.7, Sumba, Suðuroy, ad., *Janus Hansen, *Dorete Bloch m.fl. (foto).

Blot et enkelt sommerfund og dermed tilbage til mere normale forhold efter mindst fem fugle i 2002.

Grønirisk *Carduelis chloris* Grónígða (12/12, 4/4, 1/1)

2004: 23.10, Tórshavn, Streymoy, ad. ♂, *Hans Eli Sivertsen (foto).

Efter næsten et halvt århundrede uden forekomster er der nu fem fund på 11 år.

Kernebider *Coccothraustes coccothraustes* Kjarnbitur (1/1, 8/9, 1/1)

2004: 22.5, Kollafjørður, Streymoy, ad. ♀, *Janus Hansen (foto).

Alle de otte nye fund, fra 1986 og frem, har ligget inden for perioden ultimo april til primo juni.

Pileværbling *Emberiza rustica* Eyghvítríputur Spurvur (0, 0, 1/1)

2003: 19.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ♂, *Hans Eli Sivertsen og Jens-Kjeld Jensen (foto).

En ny art på Færøerne. Den er en sjælden trækæst fra Skandinavien på de skotske øgrupper og på Island forår eller efterår, og med de fleste fund netop i maj.

Kategori C: Fund af arter hvis bestandammer fra udsatte eller undslupne fugle

Category C: Records relating to established feral breeding populations

Mandarinand *Aix galericulata* Seglont (3/4, 8/13, 1/1)

2004: 23-29.4, Hvannasund, Viðoy, ♂, *Hans Jørgen Nysted og Gundur Sørensen (foto).
Alle færøske fund gælder hanner i april/maj.

Amerikansk Skarveand *Oxyura jamaicensis* Skarvsont (0, 0, 1/1)

2003: 16.5, Gróthusvatn, Sandoy, ♂, *Hanna Joensen (foto).

Set for første gang på Færøerne. Det er en oprindelig amerikansk art, der har etableret en vildtlevende bestand på De Britiske Øer og herfra spredt sig med ynglefund til bl.a. Island. På Island er der godkendt 80 individer t.o.m. 2002 (Kolbeinsson et al. 2005).

Kategori D: Mulige undslupne fangenskabsfugle

Category D: Possible escapes

Snegås *Anser caerulescens* Snjógás (1/1, 5/9, 1/1)

2003: 18.10-31.10, samt

2004: 1.1-31.3, Miðvágur, Vágar, ad. mørk fase, *Rodmund á Kelduni, Jens-Kjeld Jensen m.fl. (foto).

Fuglen overvintrede sammen med Grågæs, og det er første gang arten er fundet overvintrende på Færøerne og i det hele stationær i så lang tid.

Kategori E: Sandsynlige eller sikre undslupne fangenskabsfugle

Category E: Likely or certain escapes

Rosendompap *Carpodacus roseus*

Sibirisk Roðáigða (0, 0, 1/1)

2003: 28.4, Nólsoy bygd, Nólsoy, ad. ♂, *Jens-Kjeld Jensen (foto).

Første fund på Færøerne, men vurderet som en tidligere fangenskabsfugl, da den havde meget begrænset rødt i dragten samt slidte vingespider.

Forkastede sager

Records not accepted

Fløjlsand *Melanitta fusca* 2003: 1.5, Sørvágur.

Rosenmåge *Rhodostethia rosea* 2004: 23.-29.4, Miðvágur.

Spottesanger *Hippolais polyglotta* 2004: 10.8 og 11.8, Nólsoy, 2.

Grønlandsk Gråsisken *Carduelis flammea rostrata* 2003: 18.11, Nólsoy.

Hætteværbling *Emberiza melanocephala* 2003: 4.7, Sumba.

Summary

Rare birds in the Faroe Islands in 2003 and 2004

In 2003 and 2004 the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsudvalget/SU) accepted 53 records from the Faroe Islands. Five species were new to the Faroese list: Black Duck *Anas rubripes*, White-rumped Sandpiper *Calidris fuscicollis*, Blue-cheeked Bee-eater *Merops superciliosus*, Great Tit *Parus major* and Rustic Bunting *Emberiza rustica*. Second records were American Wigeon *Anas americana* and Ring-necked Duck *Aythya collaris*. Breeding for the first time was the subspecies Pied Wagtail *Motacilla alba yarrellii*, forming a pair with a White Wagtail (ssp. *alba*).

The details given are 1) year and date, 2) locality and island, 3) number of birds if more than one, 4) sex, 5) other details, e.g. død = dead, ringm. = ringed, 6) observer(s) with finders marked by asterisks. Documentation by photo (foto), video, audiotape (bånd) or specimen (skind, død) is indicated. According to AERC standard the numbers in brackets following the species name refer to the total number of records and individuals (separated by a slash) before 1950, from 1950-2000, and from 2001-2002, respectively.

Referencer

- Kolbeinsson, Y., G. Thráinsson og G. Pétursson 2003: Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 2000. – Bliki 24: 25-52.
Kolbeinsson, Y., G. Thráinsson og G. Pétursson 2005: Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 2002. – Bliki 26: 21-46.
Sørensen, S. & J.-K. Jensen 2004: Sjældne fugle på Færøerne i 2001-2002. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 33-39.
Thom V. M. 1986: Birds in Scotland. – T.& A.D. Poyser, Calton.

Antaget 22. september 2005

Søren Sørensen, Bratskovvej 1 B, DK-2720 Vanløse, Danmark

Jens-Kjeld Jensen, FO-270 Nólsoy, Færøerne