

# Skovsneppe, *Scolopax rusticola* L., som Ynglefugl i Danmark.

Af POUL JESPERSEN.

With a summary in English.

(Dansk zootopografisk Undersøgelse vedrørende Fugle. Beretning Nr. 10.)

Nærværende Undersøgelse skal navnlig søge at give Svar paa følgende to Spørgsmaal angaaende Skovsneppe's Yngleforhold her i Landet:

1. Hvor findes Sneppen ynglende og i hvilket Antal?
2. Paa hvilke Tider træffes Æg og Unger?



HANS MØRK fot.

Fig. 1. Rugende Sneppe, Jægersborg Skovpart under Lindenberg 20. 5. 1939.

Da det er Spørgsmaal, som gennem lange Tider har beskæftiget saavel Ornithologer som Jægere, vil det formodentlig være af Interesse at faa disse Forhold belyst saa vidt, det har været muligt ved en mere systematisk Undersøgelse. Allerede

ved en Gennemgang af den foreliggende Litteratur vil man træffe adskillige Oplysninger om disse Forhold, idet der navnlig i „Dansk Jagttidende“ og i „Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift“ findes en Del spredte Artikler og Notitser om Snejpens Yngleforhold her i Landet. Af disse Tidsskrifter saavel




Fig. 2. Ynglesteder for Skovsneppen. De store Prikker viser konstante Ynglepladser, de smaa mere tilfældige Ynglesteder. Korsene angiver Steder, hvor Sneppen kun er truffet ynglende før 1920.

som af andre Publikationer er der foretaget en Udskrift, der er forsøgt at gøre saa fuldstændig som muligt, for at faa det størst mulige Materiale til Raadighed.

Dels for at supplere dette Materiale og dels for at faa det ført à jour er der yderligere i Aarene 1940—41 rettet Henvendelse til praktisk talt alle større Skovdistrikter her i Landet med en Forespørgsel om, hvorvidt Sneppen ynglende paa

Distriktet, om den var konstant eller mere tilfældigt ynglende samt i hvilket Antal, den omtrentlig skønnedes at yngle. Yderligere ønskedes Oplysninger om der var set oversomrende Fugle paa Distriktet samt eventuelle Data for Redefund eller Unger. De forskellige Spørgsmaal var opført paa et Skema, der udsendtes til alle Statsskovridere og ca. 75 større private Skovdistrikter. Da dette Spørgeskema er blevet tilbagesendt i udfyldt Stand fra samtlige Statsskovridere og fra ca. 70 Skovridere, Skovejere etc. paa private Distrikter, vidner det om en sjælden Interesse for Undersøgelsen. Ikke mindst i Tider som de nuværende, hvor Folk, der er beskæftiget ved Skovbruget, i Forvejen er overbebyrdet med Arbejde, er det særdeles paaskønnelsesværdigt at ofre Tid paa en Besvarelse af denne Art, og jeg benytter derfor Lejligheden til at bringe enhver af de mange Bidragydere min bedste Tak for velvillig Assistance. Det samme gælder andre, der har tilstillet mig Meddelelser<sup>1)</sup>.

#### Ynglesteder.

Det samlede Resultat af Undersøgelsen over Sneppens Ynglepladser her i Landet fremgaar af vedføjede Kort. Paa dette er anvendt tre forskellige Signaturer, nemlig 1. Lokalteter, hvor Sneppen er konstant ynglende, 2. Lokalteter, hvor enkelte Par er truffet ynglende en enkelt eller nogle faa Gange siden 1920 og 3. Lokalteter, hvor Sneppen kun er paavist ynglende før 1920. Det er saaledes kun de to førstnævnte Signaturer, der har Interesse m. H. t. Spørgsmaalet om Sneppens Ynglepladser i de senere Aar.

Det vil af Kortet ses, at der efter de foreliggende Undersøgelser er 4 Omraader her i Landet, hvor Sneppen maa karakteriseres som konstant ynglende, nemlig 1. Roldskovkomplekset, 2. Eggen omkring Silkeborg, 3. Sydfyn og 4. Bornholm. Dette udelukker selvfølgelig ikke, at Sneppen kan være konstant ynglende andre Steder i Landet, men Sandsynligheden taler dog for, at det i saa Fald kun drejer sig om forholdsvis faa Ynglepar. Om

<sup>1)</sup> Foruden nærværende Tidsskrift har Redaktionen af „Naturens Verden“, „Flora og Fåuna“, „Dansk Jagttidende“ og „Jagtvennen“ velvilligst optaget en Opfordring til at tilstille mig Meddelelser om Sneppens Yngleforhold.

de nævnte 4 Omraader foreligger følgende Oplysninger, idet Angivelserne vedrørende Antallet af ynglende Par selvsagt er ganske skønsmæssige og formentlig nærmest maa betragtes som Minimumsangivelser.



HANS MØRK fot.

Fig. 3. Snepperede, Jægersborg Skovpart under Lindenberg 20. 5. 1939.

1. Roldskovkomplekset (Distrikt 11)\*). Der synes at yngle mindst 40 Par Snepper, der fordeler sig saaledes paa de forskellige Distrikter:

Buderupholm Skovdistrikt	ca.	10 Par.
Nørlund-Torstedlund	"	6-8 "
Lindenberg	"	22 "

2. Silkeborg-Egnen (Distrikt 19—20). I Skove og Plantager findes et ret betydeligt Antal Par, formentlig mindst 20-25 Par, nemlig:

Palsgaard Skovdistrikt	ca.	15-20 Par.
Rye-Nørskov	"	3-5 "
Silkeborg	"	1-2 " (?)

\*) Vedrørende Distriktsinddelingen henvises til Oversigten over Materialet Side 123.

3. Sydfyn (Distrikt 32). Paa Brahetrolleborg Skovdistrikt kan Antallet af ynglende Par formentlig sættes til 5-10.
4. Bornholm (Distrikt 47). Yngler i mange Skove, navnlig Almindingen og Rø Plantage. Der foreligger ingen Opgivelser om Antal, men mange Par yngler, og det er utvivlsomt den Del af Landet, hvor Sneppen yngler talrigst. Sneppen har siden 1931 været fredet om Foraaret paa Bornholm, hvad der utvivlsomt har betydet meget for Bestanden af Ynglefugle.



M. V. ANDERSEN fot.

Fig. 4. Snepperede, Brahetrolleborg 1938.

Foruden de nævnte konstante Ynglepladser er Sneppen, som det fremgaar af Kortet, nu og da truffet ynglende spredt over Landet og i praktisk talt alle Landsdele med Undtagelse af det vestligste Jylland, hvorfra der ikke forefindes Meddelelser om Redefund eller iagttagne Unger. Forskellige Forhold tyder imidlertid paa, at Sneppen gerne, hvis den kan faa Ro, slaar sig ned i de jyske Plantager, hvorfor der er en Mulighed for, at den er i Færd med at brede sig som Ynglefugl i Jylland. Som sikre Ynglepladser er kun opført Lokalteter, hvor der enten er gjort

Redefund eller iagttaget Unger, men da det som bekendt er særdeles vanskeligt at finde Sneppens Rede, er det sandsynligt, at den yngler adskilligt flere Steder end angivet paa Kortet. Fra forskellige Sider foreligger saaledes Meddelelser om, at der mere eller mindre hyppigt ses oversomrende Snepper, og i adskillige Tilfælde drejer det sig utvivlsomt om ynglende Fugle.

Af Lokalteter, hvor Sneppen er truffet ynglende før 1920, er der kun Grund til at omtale Kongelunden paa Amager (Distrikt 46). Her ynglede tidligere op til 5—6 Par, men efter at Fasaneriet blev ophævet i 1920 og der blev aabnet Adgang for Offentligheden, er Sneppen forsvundet som Ynglefugl fra denne Lokaltet.

Det er ugørligt blot tilnærmelsesvis at opgive det samlede Antal ynglende Snepper her i Landet, men i Betragtning af, at den utvivlsomt yngler adskillige flere Steder end her anført, gør man dog næppe meget forkert ved at sige, at det maa dreje sig om mindst mellem 100 og 200 Par.

#### Yngletid.

En summarisk Fremstilling af Tidspunktet for Sneppens Æglægning og Rugning her i Landet ses af vedføjede Tabel (Fig. 5), hvor der yderligere er angivet Tider for iagttagne Unger. Data for Fund af Æg og Unger er i Tabellen afsat i 5 Dages Perioder, idet hver Prik angiver en Dato, hvor der er konstateret Æg eller Unger.

Redefund med Æg er truffet i de fleste Tilfælde i April og Maj, men Æglægningen kan strække sig et godt Stykke hen paa Sommeren. Det tidligste Fund af Æg er gjort 30. Marts, det sidste 16. Juli. Der er kun i et enkelt Tilfælde fundet Æg i Marts, men allerede paa dette tidlige Tidspunkt var Kuldet fuldlagt (se Distrikt 42). I første Halvdel af April træffes derimod ikke helt sjældent Redefund med Æg, hvad der ogsaa — idet Rugetiden strækker sig over ca. 3 Uger<sup>1)</sup> — fremgaar af, at der ret hyppigt er konstateret Unger i sidste Halvdel af April og først i Maj. For det senest

<sup>1)</sup> I den foreliggende Litteratur findes noget forskellige Opgivelser om Rugetidens Varighed, idet den angives at strække sig over 20—24 Dage.

konstaterede Redefund med Æg, 16. Juli, angives det, at Ungerne var udruget den 21. s. M. (Distrikt 47).

Som anført er langt de fleste Reder med Æg fundet i April og Maj, men endnu i Juni og første Halvdel af Juli er der




Fig. 5. Data for Redefund med Æg og for iagttagne Unger.

sket Redefund med Æg. Disse fordeler sig saaledes paa de forskellige Maaneder<sup>1)</sup>:

Marts.	Redefund med Æg:	1 ( 2.3 %)
April.	" " "	16 (36.4 " )
Maj.	" " "	17 (38.6 " )
Juni.	" " "	6 (13.6 " )
Juli.	" " "	4 ( 9.1 " ).

Det ses heraf, at 75 % af samtlige Redefund med Æg er gjort i April-Maj. I Juni-Juli udgør Fundene 22.7 %, hvad der viser, at selv om der i disse Maanedes findes relativt færre Reder med Æg, er det dog en ikke helt usædvanlig Tildragelse.

De i Fig. 5 afsatte Tider, hvor der er set Unger, er navnlig af Interesse i Forbindelse med Spørgsmaalet om, hvor tidligt

<sup>1)</sup> Foruden de i Fig. 5 opførte Redefund medtages her enkelte, hvorom der kun forefindes Maanedesangivelser.

Sneppen kan have udrugede Unger. Som det vil ses, er der ikke helt sjældent, nemlig i 16 % af samtlige Iagttagelser, truffet Unger allerede i sidste Halvdel af April, og man maa regne med, at Æggene hos disse er lagt i de sidste Dage af Marts og i første Tredjedel af April. Den tidligste Dato for iagttagne Unger er 18. April, og da det anføres, at der nævnte Dag er set „tre ikke



ARNE LARSEN fot.

Fig. 6. Snepperede, 4 km S.Ø. f. Rønne. 23. 6. 1940.

flyvefærdige Unger“ (se Distrikt 41), har det øjensynlig drejet sig om ret store Unger. Da der er konstateret Reder med Æg saa sent som i første Halvdel af Juli, kan det ikke undre, at der er set Unger langt hen i August, og der foreligger endog en enkelt Meddelelse om, at en halvvoxen Unge skal være truffet saa sent som midt i September (Distrikt 22 b).

Det ofte diskuterede Spørgsmaal, om Sneppen normalt lægger et eller to Kuld om Aaret, kan ikke besvares paa Grundlag af det foreliggende Materiale, der imidlertid godtgør, at



Reder med Æg kan findes lige fra de sidste Dage i Marts til midt i Juli. Hvis det var et almindeligt Fænomen, at Sneppen ynglede 2 Gange her i Landet, vilde der formentlig være gjort omtrent ligesaa mange Redefund med Æg i Juni-Juli som i April-Maj, hvad der, som det ses af ovenstaaende, ingenlunde er Tilfældet. Det er derfor sandsynligst at antage, at de sene Kuld i langt de fleste Tilfælde skyldes omlagte Æg.

Man kan dog næppe helt se bort fra den Mulighed, at Æg, der er lagt saa sent som omkring 1. Juli, kan skyldes et andet Kuld. I den Forbindelse kan der henvises til vore Nabolande Sverige og Tyskland, hvor Meningerne om dette Spørgsmaal ogsaa har været stærkt delte. Af nyere Litteratur kan nævnes, at LÖNNBERG (Svenska Fåglar, 3. Del, 1929, Side 709) mener at have Bevis for „att morkullan, om ej alltid, så dock vanligen lägger en andra kull“, og O. STEINFATT (Journal für Ornithologie 1938, Side 390) kommer til det Resultat „dass unsere Schnepfe in der Regel zwei Bruten hat“. Af ovenstaaende Undersøgelse over Sneppens Yngleforhold synes det imidlertid at fremgaa, at det er ganske undtagelsesvis, hvis Sneppen lægger to Kuld her i Landet, og at det normale Forhold er ét Kuld, idet de senere Redefund skyldes Omlægning (se Efterskrift Side 134).

#### Oversigt over Materiale.

Nedenstaaende gives en Oversigt over de foreliggende Oplysninger om Sneppens Yngleforhold, idet Landet er inddelt i 53 forskellige Distrikter, hvis Grænser er afmærket paa det foranstaaende Kort<sup>1</sup>). I den følgende Liste findes ved hvert Distriktsnummer nogle Lokalitetsbetegnelser, der omtrentlig viser Distriktets Beliggenhed. Vedrørende Ynglesteder er væsentlig kun opført positive Oplysninger, men en Del negative, afmærket ÷, er dog ogsaa medtaget, nemlig fra Skovdistrikter, hvor det udtrykkeligt angives, at Sneppen ikke er truffet ynglende. Naar der ved Meddelelserne ikke er anført Aarstal, gælder disse for de seneste Aar (1940—41). Ved Litteraturhenvisninger er benyttet følgende Forkortelser: D. J. — „Dansk Jagttidende“ og D. O. F. T. — „Dansk Ornithologisk Forenings

<sup>1</sup>) En nærmere Redegørelse for de enkelte Distrikters Beliggenhed og Udstrækning findes i D. O. F. T., 31. Aargang, 1937 (Side 80).

Tidsskrift“, og det vedføjede Tal angiver Aargangen af de respektive Tidsskrifter.

1. (Skagen—Frederikshavn). Skagen. Enkelt Fugl er set sent i Maj 1941 (Overklitfoged A. HEILMANN). — Tolne Skov 1 Stk.  $\frac{4}{7}$  1939, dog sikkert ikke ynglende. „De ret store Foraarstræk, der indfinder sig her, forsvinder uden at efterlade Ynglefugle eller blot Efternølere“ (Skovrider B. STEENSTRUP).
2. (Hjørring—Brønderslev). Børglum Klosterskov. Et enkelt Par ynglende, formentlig kun nu og da. Rede set for en Del Aar siden, ellers ses Fugle paa Træk om Aftenen i Maj-Juni om en Ellemose (Skovrider C. W. LORENTZEN). — Redefund 1934 (Skovrider FOLTING — cand. theol. HALFDAN LANGE).
3. (Læsø). Ikke konstateret som ynglende, men antagelig gør den det i hvert Fald nogle Aar, da der jævnlig ses oversomrende Fugle, og i Juli 1935 er iagttaget 2 flyvedygtige Unger (Klitplantør K. RAVN, Hvidbjerg Plantage). — Hver Sommer, dog ikke 1941, er Sneppen set omtrent paa samme Sted i Statsplantagen, men Rede er aldrig fundet. I 1941 er  $\frac{27}{5}$  observeret en enkelt Fugl, formodentlig forsinket paa Trækket (Klitplantør P. PLESNER).
4. (Sydøstl. Vendsyssel). Redefund med 4 Æg i Strandkærene ved Dronninglund  $\frac{13}{4}$  1861 (I. C. H. FISCHER i Naturh. Tidsskrift 3. Rk., I, 1862). — Formodes tidligere at have ynglet i Hals Sønderskov (Fabrikinspektør K. GALLE, Aalborg). — Dybvad Skov: ÷. Undertiden enkelte oversomrende Fugle. „Jeg er Skovrider for ca. 50 Smaaskove spredt over hele Aalborg og Hjørring Amter og har godt Kendskab til en Mængde andre Skove, men har aldrig modtaget Meddelelser om ynglende Snepper.“ (Skovrider G. A. GRAAB, Flauenskjold). — Storskov, Dronninglund: ÷. I Foraaret, vistnok Juni, 1932 er set 2 Snepper i Skoven (Skovrider FOLSACH).
5. (Sydvestl. Vendsyssel). Paa Øland fandtes den ynglende i Juni 1850 (KJÆRBØLLING: Danmarks Fugle).
6. (Nordl. Thy og V.-Hanherred). I Aarene 1923—29 saas ofte Snepper om Sommeren i Vilsbøl Plantage (Overklitfoged A. HEILMANN). — Aldrig truffet den ynglende eller om Sommeren i nogen Plantage i Thy (Klitassistent P. L. KNUDSEN, Vang).
11. (Ø.-Himmerland). Fra Roldskov-Komplekset foreligger fig. Oplysninger uden nærmere Lokalitetsangivelser: Yngler hvert Aar (D. O. F. T., 1, 1907);  $\frac{6}{5}$  1912 en Snespe med to næsten flyvefærdige Unger, der endnu havde Rester af Dunfjerene (D. O. F. T., 8); som sædvanligt ruger her en Del, antagelig en halv Snes Par, og en enkelt Rede med 4 Æg er fundet (D. J., 38, 1921); yngler aarligt, men sparsomt,  $\frac{21}{8}$  1932 Hun med 4 Unger (Forstaspirant AXEL KYED).  
Buderupholm Distrikt. Konstant ynglende ca. 10 Par; flyvefærdige Unger er set  $\frac{24}{6}$  1939 og  $\frac{12}{8}$  1941 (Statsskovrider JENS HVASS). — En Skovfoged saa omkring  $\frac{5}{8}$  1939 et Kuld Sneppeunger, og i 1938 saa en anden Skovfoged en Snespe flyve med en Unge i Stængerne

(Statsskovdirektør POUL LORENZEN). — Rede med 4 Æg fundet  $16/6$  1939; Reden var anbragt i Udkanten af en gammel, stærkt vindpaa- virket Granbevoksning under en tæt Flora af Ørnebregner (Forst- assistent K. NEDERGAARD-HANSEN, Statsskovvæsenet). — Rede med 4 Æg fundet  $11/5$  1941 ved Foden af en Gran i en aaben Plantning af Rødgran. Egentlig Rede var der ikke Tale om, kun en lille For- dybning i Skovbundens Mos. Fuglen rugede meget fast, kunde iagt- tages paa 3—4 m's Afstand uden at forstyrres. Udrugning foregaaet umiddelbart før  $20/5$  (Førstelærer E. JAKOBSEN, Arden).

Lindenberg Distrikt. Træffes ynglende over hele Distriktet, der yngler formodentlig ca. 22 Par. Oversomrende Fugle ses til Stadighed. Omkring  $1/8$  1941 er set 3 flyvedygtige Unger (Skovrider H. STOU- GAARD). — Rede fundet  $20/5$  1939, en Uge senere var alle 4 Æg ud- rugede. Reden laa i Bunden af Granskov og ganske aaben (Fig. 1 og 3); den plejer ellers at være i Ly af Bregner eller anden tæt Be- voksnings. Kun ca. 100 m fra denne Rede fandtes  $17/5$  1940 en anden, hvor Ungerne var udrugede, men som indeholdt 1 raadent Æg (Bog- handler HANS MØRK, Skørping).

Nørlund-Torstedlund Distrikt. Antagelig 6—8 Par ynglende. Rede med 3 Æg fundet sidst i Maj, flere Gange set Unger. Trækkende Fugle ses hver Sommeraften (Skovforvalter HOPPÉ).

Villestrup Distrikt. Med flere Aars Mellemrum er der truffet 2 og 3 Unger og en eneste Gang er fundet Rede med 2 Æg (Overskov- foged J. BANG, Randbøl).

I Tofte Skov findes nu og da, om end ikke hvert Aar, enkelte Par oversomrende eller ynglende Snepper (K. O. PEDERSEN, Skelund).

Visborggaard, almindelig ynglende 1886 (D. J., 3); ynglende 1903 (D. O. F. T., 1);  $23/5$  1904 en flyvefærdig Unge (D. J., 21);  $6/4$  1923 Rede med 4 frisklagte Æg, nogle faa Par yngler hvert Aar (D. O. F. T., 27, 1933).

Havnø  $11/4$  1918 Rede med 4 Æg (D. J., 47).

- 13 a.** (Syd for Randers Fjord). Clausholm: ÷. Før første Gang er en oversomrende Fugl iagttaget 1941 (Skovrider MARSTRAND JØRGENSEN, Langesø). — Gl. Estrup Skovgods: ÷ (Skovrider P. JENSEN). — Fjeld Distrikt: ÷ (Hofjærgemester N. R. ESTRUP). — Løvenholm:  $28/4$  1917 Rede med 4 Æg (D. J., 34).
- 13 b.** (Randers—Mariager). Ved Gjessinggaard er  $9/5$  1933 iagttaget to ca.  $3/4$  voksne Snejpeunger i Skoven (Hofjærgemester C. v. FOLSACH).
- 14.** (Viborg). Viborg Statsskovdistrikt: ÷ (Statsskovrider J. V. RINGSTED). — Iflg. „Jagtvennen“  $1/10$  1941 skal en halvt udvokset Snejpeunge være fundet ved Viborg  $27/6$  1941. — Tjele: ÷; oversomrende Snepper set 1898 (Skovrider H. F. HORSTMANN). — Foussingø: ÷ (Skovrider S. C. POULSEN).
- 15.** (Holstebro—Skive). Feldborg Skovdistrikt: Kun truffet ynglende to Gange, men da der ret ofte ses Snepper Forsommeren igennem, maa det vist formenes, at den ruger næsten hvert Aar, formodentlig dog næppe mere end 1—2 Par. De to Tilfælde er 1) Forsommeren

1931, 4 Kyllinger i Borbjerg Plantage og 2) Rede med 4 Æg  $\frac{5}{7}$  1933. Ingen oversomrende Snepper er truffet i 1940 (Statsskovrider S. PLOUGHED). — I Borbjerg Plantage har den ynglet et enkelt Aar før 1920 (Statsskovrider J. V. RINGSTED). — I Feldborg Plantage blev  $\frac{6}{7}$  1932 udklækket et Kuld med 4 Unger (C. M. PAY: „Skovsneppen“, Side 40).

16. (Vest for Struer—Holstebro). Klosterhedens Distrikt: ÷ (Statsskovrider P. ALLERUP). — Paa Venø fandtes  $\frac{16}{5}$  1938 en Snejpeunge (D. J., 55).
18. (Herning). Et Par ynglede 1937 i Høgilgaard Plantage,  $\frac{11}{7}$  havde Ungerne forladt Reden (Stud. mag. CHR. OVERGAARD, Kbhvn.).
- 19-20. (Brande—Give og Syd for Silkeborg).

Palsgaard Skovdistrikt. I Aarene 1916—23 ynglede Sneppen hvert Aar i Palsgaard Skov samt i Hampen og Gludsted Plantager. Der fandtes ca. 10 Par, men uagtet de blev totalt fredede om Foraaret i alle disse 8 Aar, syntes der ikke at blive flere ynglende Fugle (Statsskovrider T. S. WIELANDT, Maarum). — I Aarene 1936—39 saas overalt i Forsommeren trækkende Snepper i Egnens Plantager (Forstassistent K. NEDERGAARD-HANSEN, Statsskovvæsenet). — Yngler (1940—41) navnlig i Gludsted Plantage, hvor der antagelig findes ca. 10 Par, og desuden ofte, men dog næppe hvert Aar, i Palsgaard Skov, Snabegaard Skov og Velling Skov samt i St. Hjöllund og Kongsø Plantager i Antal fra et til flere Par. I 1940 er  $\frac{6}{5}$  fundet 2 Reder med henholdsvis 3 og 4 Æg i Palsgaard Skov og endvidere sikkert ynglende i Velling Skov. I 1941 er der set Snepper paa Træk hele Forsommeren baade i Palsgaard, Gludsted og Velling Skovparter samt i Kongsø Plantage, og de har sikkert været der som i tidligere Aar (Statsskovrider K. KIERKGAARD). — Snepperede i Snabegaard Skov 1942:  $\frac{21}{4}$  rugende 4 Æg, ligeledes  $\frac{1}{5}$  og  $\frac{12}{5}$ , men  $\frac{16}{5}$  var Æggene udklækkede og Ungerne havde forladt Reden; Skallerne laa hele midt i Reden.  $\frac{20}{5}$  1942 saas en Snejpe med 5 Unger om sig gaaende over en Vej i Palsgaard Skov; den ene Unge var mindre end de andre og kom sidst (Statsskovrider K. KIERKGAARD).

Yderligere foreligger følgende, tildels ældre, Oplysninger om Sneppens Ynglen paa Distriktet: Gludsted Plantage. Ynglede 1916 (Statsskovrider P. ROSEN, Nødebo);  $\frac{5}{6}$  1917 tre flyvefærdige Unger (D. J., 34); 1935 antagelig 4-5 Par ynglende (Skovfogedaspirant N. H. JENSEN, Varmark); 1938 formodentlig 3-6 Par Ynglefugle (Forstkandidat C. BRANDT, Lehnkov). — Palsgaard Skov.  $\frac{26}{5}$  1917 en halv voksen Unge (D. J., 34);  $\frac{8}{7}$  1921 en Dununge („Danske Fugle“, I); 1933 nogle faa Par yngler hvert Aar (D. O. F. T., 27);  $\frac{27}{7}$  1936 fire Unger (D. J., 54); 1938 1-3 Par Ynglefugle (Forstkandidat C. BRANDT). — Velling Skov. I Sommeren 1922 set 1 gammel og 4 Unger (Statsskovrider P. ROSEN). — St. Hjöllund Plantage.  $\frac{20}{5}$  1903 3-4 lige udklækkede Unger (D. J., 20); 1916 er iagttaget et livligt Træk paa Aftener i Maj og Juni. Undertiden er der set 5-7 Fugle i Luften ad Gangen (D. J., 33).

Nørlund Plantage. Flyvende Snepper set i Sommeren 1938, antagelig ynglende (Forstkandidat C. BRANDT).

Silkeborg Sønderskov.  $\frac{9}{6}$  1886 Rede med 2 Æg,  $\frac{12}{6}$  4 Æg (D. J., 4). — Ved Silkeborg er  $\frac{26}{5}$  1915 truffet 3-4 godt 14 Dage gamle Unger (D. O. F. T., 9). — Silkeborg Østerskov.  $\frac{7}{6}$  1915 „2 langbenede Unger af Størrelse som en Stær“ (D. O. F. T., 9). — Silkeborg Skovdistrikt. Et enkelt Par ynglende nu og da i Vesterskoven. Rede med Æg er set i Slutningen af Maj og Unger Sommeren igennem (Statsskovrider H. S. L. SCHOUBYE). — I Maj og Begyndelsen af Juni 1941 set 2 à 3 Snepper paa Aftentræk i Silkeborg Vesterskov (Konservator CHR. M. POULSEN, Silkeborg).

Rye-Nørskov Distrikt. Ynglende i Rye Nørskov, formentlig 3-5 Par. I de senere Aar ikke fundet Reder, men i 1926—30 fandtes 2 Reder, og her ses hvert Aar om Aftenen Sommeren igennem Snepper i Skumringen, ligesom en Elev i 1940 saa en Snejpe flyve med en Unge. Samme Aar blev ligeledes set Sneppeunger paa Størrelse med en dobbelt Bekkasin. Saavel Reder, som Unger og de trækkende Snepper er kun set paa Terrænet langs Gudenaas i en Afstand af indtil 500 m fra denne (Skovrider L. TØNNING). — Rye-Nørskov. Ynglende i de senere Aar (FENCKER: Horsens—Aarhus Fugle, 1884); ynglende 1920—21 og vistnok 1922 (Redaktør K. W. J. THUREHOLM, Næstved). — Rye Sønderskov.  $\frac{26}{5}$  1918 2 lærkestore Unger (D. J., 35). — I Løndal Skove (Addit)  $\frac{31}{5}$  1923 3 nyfødte Unger (D. J., 40).

- 21.** (Silkeborg—Aarhus). Frijsenborg.  $\frac{20}{6}$  1875 fire store Unger. (Brev fra Lehnsgreve C. E. FRIJS til I. C. H. FISCHER). — Paa Frijsenborg Skovdistrikt er Sneppen med fuld Sikkerhed kun konstateret 2 Gange som ynglende i de sidste ca. 20 Aar. Ret jævnlig er der dog set oversomrende Fugle i enkelte af Skovene (Skovrider H. H. BILMANN). — Frijsenborg.  $\frac{20}{5}$  1915 tre Unger paa Størrelse som Stære (D. J., 32).
- 22 a.** (Ebeltoft). Rønde. Aldrig truffet ynglende Fugle paa Egnen (Jagtkonsulent J. BJERG-THOMSEN).
- 22 b.** (Grenaa). Meilgaard: ÷ (Hofjægermester CHR. JUEL). — Benzon Distrikt: I Plantagerne kunde man fra 1908 til 1919 næsten hvert Aar se unge Fugle (Skovrider H. H. BILMANN); sidst i April 1927 fire Unger (D. J., 47); yngler, om ikke hvert Aar, saa dog meget ofte (Plantør C. OLSEN, Gjerrild); Redefund med Unger kun konstateret en Gang, men oversomrende Fugle ses af og til (Distriktsbestyrer J. A. HANSEN, Benzon).

Ved Hovedgaarden Hessel er midt i September 1938 indfanget en halv voksen, fuldt flyvefærdig Unge med beskadiget Vinge (Murermester CHR. SØRENSEN, Grenaa). — Katholm. Et enkelt Par er truffet ynglende, dog ikke i 1940 og 1941 (Skovrider C. F. COLLET).

- 23.** (Samsø). Brattingsborg. I Aarene fra 1921 til 1941 aldrig truffet ynglende; enkelte oversomrende Fugle er set, formentlig skadet ved Anskydning (Skovrider S. KINDT, Gisselfeld).
- 24.** (Horsens). „I Egnen omkring Horsens er dens næsten flygge Unge bleven fanget“ (FABER: Ornith. Notic. 1824). — Rathlousdal: ÷ (Skov-

- rider J. CHR. SCHRØDER). — Boller: ÷ (Statsskovrider A. S. SABRØE). — En Sneppe er  $\frac{23}{6}$  1941 om Aftenen set trække over Vejle—Viborg Landevej lidt N. for Lindved (Statsskovrider K. KIERKGAARD). — Rosen-vold: ÷ (Skovrider CL. IVERSEN).
- 25.** (Kolding—Vejle). Randbøl Skovdistrikt. Det formodes, at der yngler enkelte Par af og til. Kun én Gang i min Embedstid er der fundet en Rede i Gjødding Skov (Statsskovrider J. F. LARSEN). — Liegaard Plantage. „En tidlig Morgen i Slutningen af August 1941 saas 2 unge Snepper, som fulgtes ad fra Marken og ind i Plantagen, saa her har ruget Snepper i indværende Sommer“ (tidl. Overskovfoged J. BANG, Randbøl). — Stenderup Skovdistrikt: ÷ (Statsskovrider R. F. OTTOSEN). I Svanemosen ved Fovslet saas i Sommeren 1937 gentagne Gange en enkelt Fugl (Skovfoged J. K. HENRIKSEN, Fovsletlund).
- 27.** (Nymindegab—Esbjerg—Ribe). I Juli 1940 er set Snepper i Blaabjerg Plantage (Overklitfoged A. HEILMANN).  
Fanø. Truffet ynglende flere Steder paa Øen (Lærer N. BIRKELUND, Nordby). — Fanø Klitplantage. I Juni 1928 er i Plantagen set 3 Unger, der var saa store, at de kunde flyve nogle faa Meter. Unger af omtrentlig tilsvarende Størrelse er yderligere set 2 Gange, antagelig i Juni Maaned, nemlig i 1930 fire Unger og i 1931 to Unger. I Aarene 1938—41 er der hverken paavist ynglende eller oversomrende Fugle (Klitplantør C. NIELSEN).
- 28.** (Middelfart—Assens). Paa Brandsø i Lille Belt ynglede Sneppen i 1921 og gør det formodentlig af og til (Skovrider VILH. LARSEN, Wedellsborg). — Krengerup. Ikke truffet ynglende, men enkelte oversomrende Fugle ses undertiden (Skovrider ROLSTED).
- 29.** (Odense—Bogense). Æbelø. Sneppens fire Æg fandtes for nogle Aar siden paa Æbelø (Afd. Dyr læge C. GRILL's Optegnelser i Zool. Mus., skrevet ca. 1888); et Par rugede 1932 (Lærer P. J. RØRTH, Bogense);  $\frac{9}{7}$  1928 er Rede med 4 Æg fundet i ung Egeskov (Skovrider V. HOLSTEIN, Jægerspris).  
Egebjerggaard (Einsidelsborg). I Tiden mellem  $\frac{29}{6}$  og  $\frac{11}{7}$  1928 saas to Gange om Aftenen ved 22-Tiden flyvende Sneppe. Muligvis har et Par ynglet i Storskoven dette Aar (Skovrider V. HOLSTEIN).  
Gyldensteen: ÷. Enkelte Gange er set oversomrende Fugle (Skovrider H. V. DREYER). — Langesø: ÷ (Skovrider MARSTRAND JØRGENSEN).
- 31.** (Nyborg). Ravnholt og Lykkesholm Distrikt. Paa Lykkesholm fandtes omkring 1925 en Rede, som blev forladt, ellers ikke truffet ynglende. Ca. 1928 saas 2 Snepper nu og da i Sommerens Løb, ligeledes i Sommeren 1937 en enkelt Fugl (Skovrider F. MØRK-HANSEN). — Glorup: ÷ (Skovrider TH. DE NEERGAARD).
- 32.** (Faaborg—Svendborg). Egeskov og Fjellebro Godser og Kværndrup Sogn: ÷. Oversomrende Fugle er set, omend sjældent (Greve G. AHLEFELDT BILLE, Fjellebro).  
Brahetrolleborg Distrikt. Truffet ynglende 1910—14 (Skovrider O. G. KONRADSEN, Vesterborg). —  $\frac{14}{4}$  1915 Rede med 4 Æg, knap en Uge efter var Ungerne udruget (D. O. F. T., 9). — I 1914 fandtes den første

Snepperede og senere er der ret jævnlige set Snepeunger i et bestemt Terræn (Jagtkonsulent O. CHRISTENSEN). — I 1938 fandtes 3 Reder i Slutningen af April, men saa mange trækkende Par er set paa Distriktet, at der skønsomt har været omkring en halv Snes Par.  $\frac{30}{4}$  1938 var Æggene i en Rede udruget og Ungerne havde forladt Reden flere Dage før; en anden Rede var Kyllingerne gaaet fra Dagen før og Skallerne laa af 4 Æg og i en tredje Rede fandtes 4 lige udklækkede Unger, der var begyndt at kravle rundt (Skrivelse fra Overjagtkonsulent C. A. RØNHOLT til Dr. BØJE BENZON)\*). — I Aarene 1917—34 saas jævnlig Snepper om Sommeren, og der har muligvis til Tider været op imod en halv Snes Par ynglende Fugle.  $\frac{8}{5}$  er for nogle Aar siden set Unger paa Størrelse som Skovskade. I 1940 fandtes ingen Reder, men Sneppen saas hele Sommeren paa tre forskellige Steder. Antagelig har der været mindst 5 Reder i Sommeren 1941, idet der paa 5 forskellige Steder i Skoven er set Snepper hele Sommeren igennem (Skovrider E. BISTRUP). —  $\frac{11}{6}$  1937 en omtrent flyvefærdig Unge;  $\frac{7}{5}$  1941 en rugende Sneppe paa 4 Æg, Ungerne udruget  $\frac{11}{5}$  (Skovfoged E. RASMUSSEN, Frydenborg).

Stensgaard Distrikt. For ca. 40 Aar siden blev i Damsbo Skov truffet en Sneppe med et Kuld Unger (Skovrider S. P. HANSEN, Stensgaard).

Holstenshus: ÷ (Skovrider MARSTRAND JØRGENSEN).

Hvidkilde. Vides i nyere Tid ikke at have ynglet (Skovrider J. ABELL). — Ifølge Oplysninger fra Skovrider E. ST. FLØYTRUP, Tranekær, foreligger følgende Redefund af ældre Dato fra Hvidkilde: I Hestehaven tæt ved Hvidkilde formentlig omkring 1840—45, i Uglebjerg Skov i Maj 1870 og i „Løvehaal“ omkring Aarene 1900—02.

Taasinge. Valdemar Slot: ÷ (Skovrider A. BAVNGAARD).

34. (Langeland). Tranekær: ÷ (Skovrider E. ST. FLØYTRUP).

35. (V.-Lolland). Christianssæde og Pederstrup Distrikt. Kun konstateret ynglende én Gang, nemlig  $\frac{6}{5}$  1920, hvor der saas 4 flyvefærdige Unger, antagelig godt 14 Dage gamle. I 1920 og i en Aarrække derefter saas jævnlig enkelte Fugle om Sommeren (Skovrider O. G. KONRADSEN). — Christianssæde: I Aarene 1922—1931 set hver Sommer Fugle paa deres Aftenudflugter (Jagtkonsulent O. CHRISTENSEN, Brahetrolleborg).

36. (Ø.-Lolland). Knuthenborg: ÷ (Skovrider W. MAGIUS). — Oreby og Berritzgaard Distrikt: ÷ (Skovrider A. SCHMIDT). — Krenkerup; ÷;  $\frac{20}{5}$  1940 er der i Fjelde Skov pr. Saksjøbing set en enkelt Fugl som ikke senere er iagttaget (Skovrider A. LANDBOE-CHRISTENSEN). — Fuglsang: ÷ (Skovrider HOLCK). — Lungholm Distrikt: ÷; i Fauersted Skov er set en Fugl i Juni 1901 eller 1902 og ligeledes i Lungholm Skov i Juni 1922, men ingen af Stederne var der Tegn paa, at den ynglede (Godsinspektør H. MARCHER).

Aalholm Distrikt. I Roden Skov ynglende nu og da, men vist oftere end man tror. I en Bøgekultur i Skoven rejstes i Juli (Juni?) 1937

\*) To af de nævnte Reder fandtes med Æg 18. April og 19. April 1938 (Skovfoged E. RASMUSSEN, Frydenborg pr. Korinth).

- eller 1938 en Sneppe, som fløj med en Unge mellem Fangerne. Sneppen blev rejst tre Gange paa ganske kort Afstand, saa Ungen kunde tydelig ses under Bugen paa den gamle (Skovrider J. HOLM).
- 37.** (Falster). Orenæs: ÷ (Godsejer G. WILHJELM). — Falsters Statsskovdistrikt: ÷ (Statsskovrider HEIBERG-JÜRGENSEN). — Pandebjerg  $\frac{14}{4}$  1936 Rede med 4 Æg (D. J., 53). — Østerskov, Nordfalster: 1 Fugl set de sidste Dage i Juli 1938 (Læge O. MALLING, Stubbekøbing). — Corse-litze Distrikt: Vides ikke at have ynglet, en enkelt Gang er der dog set oversomrende Fugle (Skovrider CHR. SMITH).
- 38.** (Møen). Klintholm  $\frac{23}{6}$  1919 en Rede med 3 størestore Unger samt en gammel Fugl med 2 lidt større Unger (D. J., 36). — Med Aars Mellemrum er Sneppen truffet ynglende paa Klintholm, sidst i Sommeren 1939. Det Aar blev Reden ikke fundet, men Fuglen saas træk-kende over et bestemt Skovomraade hver Aften i Sommertiden. I Fanefjord Skov er senest bemærket en Sneppe med Unger 9. Juli 1931 og Aaret før en Sneppe, der i Slutningen af Maj fjernede sig fra en Kvasbunke med en Unge anbragt mellem de nedhængende Stæn-ger. I Ulfshale Skov er bemærket Sneppe med et Kuld Unger i Juli 1933 (Fiskeeksportør L. P. PEDERSEN, Stege).
- 39 a.** (Vordingborg—Næstved). Det Petersgaardske Distrikt: „Her er aldrig, trods det at Sneppen kun er jaget meget lidt om Foraaret, truffet ynglende eller oversomrende Snepper“ (Hofjægermester JUEL). — Stampenborg: „I de 50 Aar, jeg har færdet i Skovene, har jeg aldrig truffet Snepper om Sommeren“ (Skovrider R. JØRGENSEN). — Beldringe—Lekkende: ÷ (Skovrider J. HOLM). — Gaunø—Lindersvold Distrikt. Vides ikke at være truffet ynglende i Distriktets Skove. Særlig i Gavevænge, Syd for Rønnede, er enkelte Aar set Snepper om Sommeren, men der er ikke konstateret Reder eller Yngel (Skov-rider H. MUUS).
- 39 b.** (Stevns). Bregentved:  $\frac{26}{4}$  1912 en Sneppe med 3 Unger, ca. 2 Dage gamle (D. J., 29); først i Maj 1913 et Kuld (4) Unger (D. O. F. T., 8). — Bregentved Skovdistrikt. Ynglende nu og da. I Grevindeskoven yng-lede enkelt Par i 1923 og i 1930, hvor Reder med Æg blev fundet i Forsommeren. I Sommeren 1932 er iagttaget en enkelt Fugl et Par Gange paa samme Lokalitet. I Ganneskov ved Karise fandtes i Slut-ningen af August 1926 tre flyvefærdige Unger; Redepladsen var i en ca. 35-aarig Egebevoksning (Forstinspektør TH. JAGD; Forstkandidat LARS VIGEN). — Ynglede i Grevindeskov 1918—19 (Red. K. W. J. THUREHOLM, Næstved). — Skovfoged Rasmussen traf i Maj 1935 tre Unger i Ganneskov (Lærer O. CHRISTENSEN, Faxe Ladeplads).
- Lystrup og Jomfruens Egede Distrikt. Truffet ynglende 1928 i Hundemose Skov, ikke senere set som Ynglefugl. I Aarene omkring 1930 er der iagttaget en enkelt Fugl i Begyndelsen af Juli Maaned. „Igennem de sidste 30 Aar mindes jeg iøvrigt kun at have hørt om ynglende Snepper ganske faa Gange, bl. a. i Svennerup Skov“ (Skov-foged K. HANSEN). — Gjorslev: ÷ (Skovrider B. H. PETERSEN). — Vemmetofte: ÷ (Skovrider P. H. LASSEN).



40. (Ringsted—Køge). Skjoldenæsholm: ÷ (Skovrider C. VENDELSØE).  
Svenstrup. En Gang, omkring 1920, er sidst i Maj fundet en død  
Sneppekylling, ca. 14 Dage gammel. Oversomrende Fugle er set 3-  
4 Gange (Skovrider HOLTEN ANDERSEN). — Svenstrup  $\frac{4}{5}$  1912 en ca.  
10 Dage gammel Unge (HEILMANN & MANNICHE: „Danmarks Fugle-  
liv“, II) og først i Maj 1913 en ca. 14 Dage gammel Unge (D.O.F.T., 8).  
Giesegaard. I Aarene 1910 til 1915 var der hvert Aar mindst 1 Par  
ynglende Snepper; i de senere Aar har det været med ret lange Mel-  
lemrum og formodentlig kun et enkelt Par. Der er fundet Sneppe-  
reder i Slutningen af April med 3-4 Æg, Unger er ogsaa set i Giese-  
gaard Storskov (Skovrider IPSEN). — Gjorslev Vænge  $\frac{13}{4}$  1906 fire  
noget rugede Æg (D. J., 54). — Giesegaard Storskov  $\frac{29}{5}$  1909 en Rede  
med 4 Æg og  $\frac{3}{6}$  med Unger (D. J., 26).  
Gammelkøgegaard. Ikke truffet ynglende; ca.  $\frac{10}{7}$  1941 set en Sneppe  
(Skovrider F. OGSTRUP).  
Vallø Stift. I Løbet af ca. 10 Aar er Sneppen konstateret ynglende  
ialt 4 Gange. Ikke sjældent ses oversomrende Fugle, mulig Yngle-  
fugle eller disses Unger (Overførster O. FABRICIUS).  
Næsbyholm: ÷ (Skovrider J. NIELSEN).  
Bregentved se Distrikt 39 b.  
Gisselfeld Kloster og Holmegaard Distrikt. Yngler nu og da i Hesede  
Skov, sikkert kun et enkelt Par. En enkelt Fugl ses undertiden om  
Sommeren. I Løbet af 16 Aar er der kun rapporteret 1 Redefund.  
Har en Sommerdag set en Sneppe, som fløj over en lille Sø med Unge  
eller Æg i Fangerne (Skovrider S. KINDT).
41. (Skelskør—Sorø). Sorø Akademis 1' Skovdistrikt. Ynglende i Tops-  
høj Skov for adskillige Aar siden. Oversomrende Fugle ses ikke  
(Skovrider FRITZ LORENZEN). —  $\frac{18}{4}$  1918 tre ikke flyvefærdige Unger  
(D. J., 35).  
Sorø Akademis 2' Skovdistrikt. Ikke truffet ynglende; i Maj 1941 er  
flere Gange set en Sneppe i Bjernede Skov (Skovrider TH. KASPERSEN).  
Nykobbøl Skov  $\frac{22}{4}$  1914 Rede med 4 udrugede Unger (D. J., 31).  
Gyldenholm. I Lorup Skov har der været rejst Snepper mange  
Gange fra Maj til September 1941. Om de har ynglet vides ikke, men  
meget tyder derpaa, da Fuglene altid trak samme Steder (Skytte CHR.  
HANSEN).  
Gunderslevholm. Ikke truffet ynglende, men et enkelt Aar har en  
Sneppe opholdt sig paa Distriktet om Sommeren (Skovrider V. LIND-  
BERG).  
Holsteinborg: ÷. Af og til er der set en enkelt Fugl om Sommeren  
(Skovrider J. E. RASMUSSEN). — Saltø og Harrested Godser: ÷ (Skov-  
rider A. WIELANDT). — Herlufsholm: ÷ (Skovrider NIS LORENZEN).
42. (Kalundborg). I Vinskoven ved Jyderup er i April 1921 fundet en  
Rede med 1 Æg (D. J., 47). — Torbenfeldt: ÷ (Godsforvalter C. BI-  
STRUP);  $\frac{30}{3}$  1921 meddelte Skytten, at han littede en Sneppe fra Rede  
med 4 Æg (iflg. afdøde Vekselerer E. LEHN SCHIØLERS Dagbog; Dr.  
phil. A. VEDDEL TÅNING). — Lerchenborg: ÷ (Skovrider P. A. LUND).

43. (Odsherred). Odsherred Statsskovdistrikt: ÷ (Statsskovrider N. C. D. VESTERGAARD).
44. (Hornsherred). Jægerspris. Rede med 3 Æg  $\frac{29}{4}$  1926. Enkelte oversomrende Fugle er set  $\frac{9}{7}$  1933 og  $\frac{29}{5}$  1939, og det er muligt, at der har ynglet Snepper i de to paagældende Aar (Skovrider V. HOLSTEIN).  
Selsø—Lindholm Distrikt: ÷ (Skovrider A. KNAACK). — Ledreborg: ÷ (Ledreborg Godskontor). — Bidstrup Distrikt. Ikke ynglende normalt, og der ses heller ikke oversomrende Fugle. I 1916 saa en Skovfoged dog 3 mindre Snekpeunger (Skovrider L. V. KRARUP). — Sophienholm: ÷ (Godsforvalter C. BISTRUP, Torbenfeldt). — Løvenborg: ÷ (Greve AHLEFELDT-LAURVIG).
- 45 a. (Roskilde—Holte). Lystskovdistriktet: „Sneppen vilde antagelig gerne ruge i Jægersborg Dyrehave, saafremt Forholdene var tilstrækkelig fredelige“ (Statsskovrider MARTENSEN-LARSEN). — Brede ved Malleaaen  $\frac{9}{6}$  1924 „næppe flyvefærdige Unger“ (D. O. F. T., 18) og i sidste Halvdel af Maj 1929 fire flyvefærdige Unger (D. J., 47).  
Københavns Distrikt: ÷ (Statsskovrider E. BUCHWALD). — Farum Distrikt. Saa vidt vides ikke ynglende; oversomrende Snepper er set et Par Gange for 8-10 Aar siden, men Yngel blev ikke konstateret (Statsskovrider I. V. U. HOLTEN). — St. Rørbæk, Syd for Frederikssund fandtes  $\frac{19}{6}$  1940 et dødt Eksempel efter at være fløjet mod Telefonledning (Skovrider V. HOLSTEIN). — Paa samme Lokalitet nær Frederiksdal set en Sneppe  $\frac{16}{5}$  og  $\frac{30}{5}$  1942; gentagne Gange iagttaget Sneppe paa Aftenræk i Egnen omkring Lyngby i sidste Tredjedel af Maj 1942 (Konservator HARRY MADSEN).
- 45 b. (Nordsjælland). Hørsholm Distrikt: ÷ (Statsskovrider A. HOLTEN). — Frederiksborg Distrikt: ÷ (Statsskovrider BRÜEL). — Nødebo Distrikt: ÷ (Statsskovrider P. ROSEN). — Maarum Distrikt: ÷ (Statsskovrider T. S. WIELANDT). — Esrom Distrikt: ÷ (Statsskovrider O. ARENDRUP). — Gurre Distrikt: ÷ (Statsskovrider JOH. FR. MUUS). — Kronborg Distrikt: I 1923 ynglende i Horserød Hegn og i 1926 i Teglstруп Hegn, et Par hvert Sted, men yngler normalt ikke paa Distriktet (Statsskovrider H. ENGBERG). — Tisvilde—Frederiksværk Distrikt: I hvert Fald ikke ynglende i de sidste 6 Aar (Statsskovrider K. MORVILLE).
46. (København—Amager—Saltholm). Truffet i Juni i Egnen om Valby ved København (Faber: Ornith. Notic., 1824).  
Kongelunden. Ynglende i Sommeren 1865 (KJÆRBØLLING: Skand. Fugle). — I 1906 anføres det, at der i Reglen kun findes 1-2 Reder, medens der tidligere fandtes 5-6 Reder om Aaret i Kongelunden (D. O. F. T., 1). — Endnu i 1918 er der set en Sneppe paa et saa sent Tidspunkt som  $\frac{19}{5}$ , men Yngel eller Rede blev ikke fundet (Lærer J. JØRGENSEN, Slesvig). — Følgende Redefund foreligger fra Kongelunden:  $\frac{12}{5}$  1903, 4 spraaede Æg;  $\frac{28}{5}$  1903, 2 Reder med Æggeskaller;  $\frac{26}{6}$  1903, 4 frisklagte Æg;  $\frac{8}{5}$  1904, 4 spraaede Æg;  $\frac{11}{5}$  1905, 4 frisklagte Æg;  $\frac{29}{4}$  1906, 4 frisklagte Æg (D. O. F. T., 1). —  $\frac{24}{4}$  1905, 4 Æg;  $\frac{13}{6}$  1907, 4 Æg (Zool. Museum, Kbhvn.). —  $\frac{25}{4}$  1906, 4 Æg; først i Juni

1906, 4 Æg (D. J., 47). — Omkring  $\frac{1}{5}$  1909, 1 Æg;  $\frac{20}{5}$  1909, 4 Æg (D. O. F. T., 11). Efter at Fasaneriet blev nedlagt (1920) og Skoven aabnet for Offentligheden, har Sneppen næppe ynglet i Kongelunden.

47. (Bornholm). I Naturh. Tidsskr., 3. Rk., 2. Bd., 1863 skriver I. C. H. FISCHER: „I Dalene mellem Klipperne yngle ikke sjelden eet eller nogle Par“. — Yngler ikke sjældent paa Bornholm (KJÆRBØLLING: Skand. Fugle, 1875—77). — I 1906 opgives Antallet af ynglende Par i Almindingen til mindst 10, yderligere anføres Ibs Plantage og Rø Plantage som Steder, hvor den aarligt yngler (D. O. F. T., 1). — I Sommerne 1900—1909 truffet ikke saa sjældent og hvert Aar Snepper i Almindingen og et Par Gange Unger (Statsskovrider BRÜEL, Hillerød).

Bornholm Skovdistrikt (1940—41). Yngler i mange bornholmske Skove, mest i Almindingen og Rø Plantage. Mange Par yngler hvert Aar og synes at være tiltagende i Antal. Sneppen har siden 1931 været fredet om Foraaret paa hele Bornholm, og man kan næppe komme udenom, at Fredningen har medført en kendelig Forøgelse i Antallet af ynglende Par. Den 22. Maj er der et Aar truffet omtrent fuldvoksne Unger, og et andet Aar saa sent som den 15. August ret smaa Unger (som Graaspurve). Reder med Æg er fundet fra første Halvdel af April til helt hen i Juli Maaned (Statsskovrider J. A. NIELSEN).

Redefund fra Bornholm:  $\frac{5}{4}$  1903, 4 Æg, Svaneke (D. J., 20);  $\frac{1}{5}$  1905, 4 Æg, Ibs Plantage (D. O. F. T., 1);  $\frac{7}{5}$  1934, 4 Æg (D. J., 51);  $\frac{16}{7}$  1934, 4 Æg, udruget  $\frac{21}{7}$  (D. J., 51);  $\frac{23}{6}$  1940, 4 Æg, Plantage S.Ø. for Rønne (Adjunkt ARNE LARSEN, Rønne);  $\frac{1}{7}$  1941 Rede med Æg,  $\frac{8}{7}$  var Ungerne udruget og havde forladt Reden (Statsskovrider J. A. NIELSEN).

- 48-49. (Haderslev, Rødding—Løgumkloster). Haderslev Skovdistrikt. Ca. 1925 er i Nærheden af Jels fundet en enkelt Sneppeunge, men iøvrigt er ikke truffet ynglende Snepper (Statsskovrider J. M. A. DALGAS). — Lindet Skovdistrikt (med Draved Skov). I Tiden 1920—22 aldrig set Snepper om Sommeren (Statsskovrider BRÜEL, Hillerød). — Lindet Skovdistrikt. Nogle faa Par i Stensbæk Plantage; iagttaget i Yngletiden med Aars Mellemrum (Statsskovrider S. RIX).

52. (Sundeved). Aabenraa Distrikt. I Aarene 1922—39 er ikke set Snepper om Sommeren (Statsskovrider BRÜEL, Hillerød). — Aldrig truffet ynglende Snepper (Skovfogedaspirant N. H. JENSEN). — Det formodes, at den af og til har ynglet i Søgaard Skov og muligvis ogsaa i Aarup Skov, men Formodningen er alene baseret paa oversomrende Fugle, idet der aldrig er fundet Reder eller Yngel (Statsskovrider P. P. JESSEN).

Graasten Distrikt. Ikke ynglende. Der er 2 Gange i Tiden mellem 1922 og 1940 truffet Snepper i Skovene omkring Graasten om Sommeren, det maa derfor antages, at Sneppen yngler her, men der er ikke iagttaget Æg eller Unger (Statsskovrider C. G. LINDSKOV CHRISTIANSEN).

53. (Als). Fra Sønderborg Skovdistrikt meddeles, at Sneppen ikke findes ynglende (Statsskovrider A. WANSCHER). — Ikke fundet Sneppen ynglende paa Als i Aarene 1934—41, men det udelukker dog ikke, at den

undertiden kan have ynglet (Farver O. BEHREND, Sønderborg). — I „Danske Fugle“, II, 1929, anføres det, at den skal yngle aarligt, men faatallig i Hagenbjerg Skov og Nørreskov, og at der  $\frac{1}{8}$  1926 er fundet 4 nylig udrugede Unger i Lambjærg Lund.

---

### The Woodcock, *Scolopax rusticola* L., as breeding bird in Denmark.

The woodcock is only a comparatively rare breeding bird in this country. Breeding places have been found scattered over the whole country with exception of the most westerly part of Jutland, but at the present time the woodcock, however, seems to be constantly breeding only in a few places, viz. in two areas in the central part of Jutland, in the southern part of Fyn, and on Bornholm in the Baltic. Especially on the latter island the species is a rather common breeding bird. The breeding places are shown on the map in figure 2, the large dots indicating present constant breeding places, the small dots more occasional, and the crosses former breeding places.

The breeding season extends from the last days of March to the middle of July, when eggs have been found, but especially in the months of April and May. The earliest record of observed young is the 18th of April. Figure 5 gives dates — in 5-days periods — for observations of eggs and young respectively. It seems most probable that in Denmark the woodcock breeds generally only once a year.

---

#### Efterskrift.

Efter at ovenstaaende var trykt, er der fremkommet følgende Meddelelse om et usædvanlig sent Redefund:

I Tegstrup Hegn ved Helsingør fandtes  $\frac{10}{8}$  1942 en rugende Sneppe. Reden laa ved Foden af en lille Gran i en udhugget og ret aaben Granplantning.  $\frac{15}{8}$  var der 4 Æg i Reden;  $\frac{21}{8}$  havde Fuglen forladt Reden, der indeholdt 2 ubefrugtede Æg samt Skaller fra 2 Æg, hvoraf Unger var udklækket (Overlæge AAGE SENNELS, Helsingør).