

Antal og ikke over 200 Stkr. visse Dage i December. (Se iøvrigt TÅNING 1936, p. 185).

De faa ynglende Par har ikke givet Anledning til Ringmærkning af Betydning; der er kun mærket 5 Stkr., hvoraf ingen er gemeldt.

---

## Karmindompap (*Carpodacus erythrinus erythrinus* (Pall.)), ny for Danmark.

Af FINN SALOMONSEN.

(Meddelelser fra Naturfredningsraadets Reservatudvalg. Nr. 14.)

Igennem de senere Aar, i hvilke jeg regelmæssigt har opholdt mig paa Christiansø i Træktiderne, er ikke saa faa Sjældenheder blevet iagttaget, og en Del nedlagt til Zoologisk Museum, og Antallet af Fuglearter konstaterede paa Christiansø i disse Aar har forlængst passeret de halvandet Hundrede. Jeg har hidtil trods mange Anmodninger fra Interesserede undladt at publicere disse Forekomster af sjældne Fugle, da Reservatrådet har paatænkt senere at udgive en større Oversigt over Christiansø's Fugle. I dette Efteraar lykkedes det mig imidlertid at konstatere Tilstedeværelsen af en for Danmark helt ny Art, et Fund af saa stor Interesse, at jeg mente, det særskilt burde publiceres.

Efter at Fuglelivet i henved 14 Dage havde været meget ringe paa Christiansø, indtraf den 13de September 1941 en tydelig Forandring. Hele Dagen var det et ualmindeligt stærkt Regnvejr med svag Kuling fra Nord, altsaa ubehagelige Betingelser at iattage Fugle under. Der konstateredes stærk Tiltagen i Antal hos en Del Arter (Fuglekonge, Hvid Vipstjert, Grønsisken), Optræden af paa Trækket ualmindelige Fugle som Nattergal og Første-Ankomst af nye, senere trækkende Arter som Rødkælk. I en Kartoffelmark sad 2 — maaske 3 — finkelignende, plumpe Fugle, som ved min Ankomst fløj op i et Træ tilligemed en Del Bogfinker. De lignede nærmest Graaspurve, men da disse aldrig forekommer paa dette Kartoffelstykke, der ligger i en ret isoleret Have, blev jeg opmærksom. Da Fuglene fløj op, udstødte de et sagte, dompagtigt „pit-pit“,

og jeg antag da, at jeg havde Karmindompapper for mig, en Antagelse, der bestyrkedes ved, at Fuglene havde et tykt, opsmulmet Næb, hvis Overnæb dannede en jævn, rundet Bue ligesom hos Dompappen. Efter mange Genvordigheder i det ubehagelige Vejr lykkedes det mig flere Timer efter at faa nedlagt den ene Fugl. Den indsendtes til Zoologisk Museum,



U. MØHL-HANSEN fot.

Karmindompap (*Carpodacus e. erythrinus* (Pall.)) i Ungedragt, nedlagt paa Christiansø 13de September 1941.

hvor den nu er opstillet i den danske Samling. Den er afbildet paa vedføjede Fotografi. Det er en ung Fugl, men Kønnet kunde ikke bestemmes, da Kønsorganerne var sønderskudte.

Den gamle Han hos Karmindompappen er en meget smuk Fugl. Hovedet og Forbrystet er dybt karminrøde, bagtil paa Brystet gradvis lysere, gaaende over i den næsten hvide Bug, Oversiden rødbrun. Hunnen er til Gengæld ikke videre køn, men minder om en Graaspurvehun. Oversiden er olivenbrun med utydelige, mørkere Pletter, Undersiden er hvidlig med

tætte graabrune Længdestriber, Vingerne brune med to hvidlige Vingebaand. Ungedragten, hvori Christiansø-Stykket alt-saa befandt sig, ligner Hunnen, men er noget mørkere paa Oversiden og har noget grovere Stribning paa Undersiden. Vingelængden er 80—86 mm.

Karmindompappen er som Ynglefugl udbredt over Sibirien og Højasiens Bjerge, delt i flere Racer. Nominatformen bebor Vestsibirien og det nordlige og mellemste Rusland og gaar mod Vest til det østlige Finland, hvor den i den senere Tid har bredt sig, til Randstaterne og Polen og det østlige Tyskland (Øst- og Vestprøjsen, mod Vest til Rügen og Mecklenburg). Det paa Christiansø truffne Individ stammer uden Tvivl fra de østtyske eller baltiske Ynglepladser, et yderligere Bevis for, at Trækfugle fra den sydlige Del af Østersøen vandrer over Christiansø (jfr. F. SALOMONSEN 1940, p. 101).

I Sverige er Karmindompappen truffet een, maaske to, Gange, idet en Han blev fundet paa Gottland 1839, og et Individ menes at være iagttaget udfor Halmstad 1884. I Norge var den indtil fornylig blot konstateret een Gang, nemlig 1882 ved Oslo. Efter at de to norske Ornithologer H. TH. L. SCHAANNING og C. MUSTERS i 1934 var begyndt at undersøge Fugletrækket paa den lille Ø Utsira udfor Haugesund, viste det sig, at Karmindompappen regelmæssigt, omend i ringe Tal, trak denne Vej over (H. TH. L. SCHAANNING 1936, p. 1; og 1939, p. 113). Det var i Forvejen kendt, at Arten regelmæssigt trak over den lille Ø Fair Isle mellem Shetland og Orkney Øerne, saaledes at det nu var bevist, at en Trækvej gik tværs over den nordlige Del af Nordsøen. I Virkeligheden drejer det sig hos denne og en Del andre asiatiske Fugle, som regelmæssigt træffes paa disse og andre Nordsølokaliteter, om Fugle, der paa Grund af Afdrift er kommet ud af deres Kurs og under deres Omflakken har størst Chance for at blive opdaget paa smaa, letoverskuelige Øer. Om egentligt „normalt“ Træk kan der ikke vel være Tale. Et Afdrift-Træk af meget større Dimensioner kendes fra andre Øgrupper, som f. Eks. Færøerne.

I Danmark er Karmindompappen ikke tidligere truffet. Naar den ikke desto mindre er opført i Listen over Danmarks Fugle som „Tilfældig Gæst fra Øst“, beror det paa, at der hos KJÆRBØLLING er nævnt, at den i 1819 ynglede paa Sild i Syd-

slesvig, et Omraade, der jo dengang var dansk. Af denne Grund er Karmindoppappen uberettiget slæbt med — selv i nyere danske Fugleværker — som dansk Fugl, indtil den nu med fuld Ret kan indtage sin Plads i Listen over Danmarks Fugle.

### Litteratur.

- SALOMONSEN, F. 1940: Kragefugle paa Christiansø. — Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift, Vol. 34.
- SCHAANNING, H. TH. L. 1936: Vingede Skarer — Trekkresultater fra Utsira. — Stavanger Museums Arshefte 1935—36.
- 1939: Fortsatte Trekkresultater fra Utsira 1939 med Beskrivelse av 6 for Norges Fauna nye Fuglearter. — Stavanger Museums Arshefte for 1937—38; Stavanger 1939.

---

## MINDRE MEDDELELSER

Nedenfor offentliggøres endel ornithologiske Iagttagelser, som er indsendt af Medlemmerne siden sidste Offentliggørelse af „Mindre Meddelelser“ (D. O. F. T. 34te Aarg., 1940, S. 187—214). — De indsendte Meddelelser, der ikke mentes egnede til Offentliggørelse, er indgaaet i Foreningens ornithologiske Kartotek.

Red.

### Graagaas, *Anser anser*, som Ynglefugl i Gundsømagle Sø.

Graagaasen er nu atter Ynglefugl i Gundsømagle Sø. Et enkelt Par med 5 Gæslinger saas paa en Excursion d. 1. Juni 1941.

C. A. BLUME.

### Bramgaas, *Branta leucopsis*, paa Saltholm.

Paa en Excursion til Saltholm d. 10. Maj 1941 blev der set 1 Bramgaas; den gik og græssede ved en af Smaasøerne. Den var i Selskab med en Graagaas. Da vi havde betragtet Gæssene i nogen Tid og efterhaanden var kommet dem for nær, fløj de ud over Øresund.

C. A. BLUME.

### Toppet Lappedykker, *Podiceps cristatus*, ynglende i Koloni.

5. Juni 1940. I den inddæmmede Vejle, „Ulvedyb“, mellem Gøl og Øland, ca. 1,2 km N. for Gøl Bjerg, findes en lille Sivholm, vel ca. 200 m<sup>2</sup> stor. Uden for Holmen saas 34 Toppede