

Spoven ogsaa ynglede andre Steder paa Øen, i hvert Fald hørte jeg Ynglefugle 5 forskellige Steder med en indbyrdes Afstand af flere Kilometer, og paa en Strandeng udfor et Hedeparti iagttog jeg selve Parringscenen.

Endelig har jeg atter aflagt Besøg paa Ynglepladsen 26.—28. Maj 1938. Mine Iagttagelser fra iaar stemmer overens med de foran beskrevne. Den 26de havde sikkert alle Par, paanæret, udruget; et Kuld smaa Unger saas, og desuden fandt jeg denne Gang Reden i Nærheden af den befærdede Vej, hvor jeg ogsaa de foregaaende Aar havde set et Par holde til. Reden indeholdt kun 2 Æg, hvoraf Ungerne udrugedes d. 28. Maj.

Min Formodning om, at Spoven ogsaa ynglede andre Steder paa Øen, fik jeg bekræftet, idet jeg saa et Par sandsynligvis ynglende paa et ikke tidligere undersøgt Hedeterræn 5 km fra de øvrige Pars Tilholdssted.

Der er saaledes Grund til at antage, at Storspoven er i Tiltagende paa Fanø, og dette skyldes sikkert ikke mindst, at Øens Jægere sjældent skyder Spover og i hvert Fald ikke har drevet denne Jagt af Betydning i Juli Maaned.

Med den nugældende Fredningstid til 1. August vil Spoven endnu have Betingelse for at brede sig til andre vestjydske Heder og Moser. Eksemplet fra Fanø viser, at denne Fugl godt kan trives paa mindre afsides Arealer, blot den fornødne Fred er tilstede.

---

## Fortsatte ornithologiske Iagttagelser paa Anholt.

Af R. HØRRING og H. MADSEN.

Om vort første Besøg paa Anholt d. 22.—26. Juni 1934 og vore Iagttagelser dér er der gjort Rede for i dette Tidsskrift Bd. 30, 1936, S. 214.

I 1937 besøgte Prof. B. HANSTRÖM Øen d. 5.—8. August, hvor han sammen med Amanuensis E. DAHL ogsaa undersøgte Anholts Avifauna; I »Fauna och Flora«, 1937, S. 241—248 har han givet en Fortegnelse over de iagttagne Fugle. Han forøger Anholts Avifauna med 5 Arter, som hverken var iagttaget af JOHS. LARSEN eller os. Da hans Besøg faldt

saa sent som i Begyndelsen af August, saa han Tinksmed, *Tringa glareola*, Duehøg, *Astur gentilis*, og Graamejse, *Parus palustris*, alle øjensynlig paa Vandrested, medens han antager, at Taarnfalk, *Falco tinnunculus*, havde ynglet paa Øen; fundne Uglegylp, formoder han, skyldes Natugle, *Strix aluco*, der saaledes sandsynligvis yngler paa Øen. Endelig nævnes Fasanen, *Phasianus colchicus*; men denne var som en indført Fugl, der ikke kan siges at høre til Anholts Fauna, med Fortsæt ikke medtaget paa min Liste.

I Dagene omkring d. 20.7.1938 havde Konservator H. MADSEN og jeg atter Lejlighed til at besøge denne interessante Ø; Midlerne til denne Rejse var stillet til Raadighed af Naturfredningsraadet, som vi herved bringer vor bedste Tak.

Det lykkedes denne Gang, foruden de i 1936 nævnte, at konstatere følgende Arter som ynglende paa Øen:

Stokand, *Anas platyrhyncha*. — Nogle Par fandtes ynglende i Flakket.

Gravand, *Tadorna tadorna*. — 3 Par, ynglende.

Blishøne, *Fulica atra*. — 2—3 Par ynglede i Flakket.

Rørhøne, *Gallinula chloropus*. — 1 Par ynglede i Flakket.

Præstekrave, *Charadrius hiaticula*. — En Del, ynglende.

Havterne, *Sterna macrura*. — 10—15 Par ynglede i Flakket.

Sortmejse, *Parus ater*. — Almindelig som ynglende.

Gærdesanger, *Sylvia curruca*. — 2 Par, ynglende.

Løvsanger, *Phylloscopus trochilus*. — 1 Par Unger saas.

Sivsanger, *Acrocephalus schoenobaenus*. — Flere Par, ynglende.

Engpiber, *Anthus pratensis*. — Mange, ynglende.

Hvid Vipstjert, *Motacilla alba*. — Nogle Par saas, ynglende.

Solsort, *Turdus merula*. — Mange, ynglende.

Bynkefugl, *Saxicola rubetra*. — 1 Par, ynglende.

Bogfinke, *Fringilla coelebs*. — Flere Par, ynglende.

Svenske, *Chloris chloris*. — Mange med Unger.

Tornirisk, *Carduelis cannabina*. — Mange med Unger.

Rørspurv, *Emberiza schoeniclus*. — 2 Par, ynglende.

Da Anholt denne Gang besøgte af os ca. 1 Maaned senere, iagttoges yderligere følgende Arter paa Vandrested: Sort

Klire, *Tringa erythropus*, enkelte. — Tinksmed, *Tringa glareola*, 6—7 Stkr. — Mudderklire, *Tringoides hypoleucos*, enkelte. — Brushane, *Philomachus pugnax*, nogle Stykker. — Ryle, *Calidris alpina*, en Del Smaaflokke. — Temmincksryle, *Calidris temminckii*, 4—5 Stykker. — Krumnæbbet Ryle, *Calidris testacea*, en Del Smaaflokke. — Kærløber, *Limicola falcinellus*, 2 Stkr. — Selning, *Crocethia alba*, 3 Stkr. og Bysvale, *Delichon urbica*, nogle Stkr.

Natugle, *Strix aluco*, og Taarnfalk, *Falco tinnunculus*, saa vi ligesaa lidt nu som i 1936.

Angaaende Iagttagelser over Øens Ynglefugle i 1938 kan iøvrigt bemærkes: Stormmaage, *Larus canus*, der i 1936 var talrig i spredte Kolonier, var aftaget stærkt i Tal; kun faa Par ynglede paa Nordkysten lidt Vest for Fyret. Sølvmaagen, *Larus argentatus*, synes nu kun at være til Stede i Antal af ca. 1000 Par, og Sildemaagens, *Larus fuscus*, Antal kunde næppe anslaaes højere end til 800 Par; mange af disse havde forladt deres Yngleplads i »Ørkenen« og sad med de flyvefærdige Unger paa Skæret udfor Fyret. Af Fjordterne, *Sterna hirundo*, ynglede 50 Par i »Ørkenen«, V. for Fyret.

Endelig iagttoges følgende Arter, trods ivrig Eftersøgen, ikke i 1938: Spidsand, *Anas acuta*, Svartbag, *Larus marinus*, Splitterne, *Sterna sandvicensis*, Musvaage, *Buteo buteo*, Spurvehøg, *Accipiter nisus*, Natravn, *Caprimulgus europaeus*, Digesvale, *Riparia riparia*, Gærdesmutte, *Troglodytes troglodytes*, Brunelle, *Prunella modularis*, Havesanger, *Sylvia borin*, Gulbug, *Hypolais icterina*, Fuglekonge, *Regulus regulus*, og mærkeligt nok heller ikke Gulspurv, *Emberiza citrinella*, af hvilke der iagttoges en Del i 1936.

Dette viser, hvor nødvendigt, det er, gennem en Aarrække at undersøge en Lokalitet, naar Maalet er at give et nøjagtigt Billede af dennes Avifauna.