

MANNICHE); Nøddekrige, *Nucifraga caryocatactes macro-rhynchus*, nedlagt 1911 (Sognefoged MANNICHE); Fuglekonge, *Regulus r. regulus*, <sup>28</sup>/<sub>9</sub> 1934; Hvid Vipstjert, *Motacilla a. alba*, <sup>7</sup>/<sub>6</sub> 1936 og paa Træk; Vindrossel, *Turdus musicus*, <sup>22</sup>/<sub>4</sub> 1934 og <sup>24</sup>/<sub>4</sub> 1938; Sjagger, *Turdus pilaris*, <sup>22</sup>/<sub>4</sub> 1934; Ringdrossel, *Turdus t. torquatus*, <sup>22</sup>/<sub>4</sub> 1934; Kvæker, *Fringilla montifringilla*, <sup>22</sup>/<sub>4</sub> 1934 og <sup>5</sup>/<sub>5</sub> 1935; Kærnebider, *Coccothraustes c. coccothraustes*, <sup>23</sup>/<sub>6</sub> 1935; Sissen, *Carduelis spinus* <sup>28</sup>/<sub>9</sub> 1934.

Som det fremgaar af denne Fremstilling, er der et rigt Fugleliv ved Gundsømagle Sø, og jeg forsømmer aldrig at tage dertil en Nat i Maj eller Juni for at lytte til Fuglesangen i de første Morgentimer, men det er alligevel Forekomsten af Sortterne, Rørdrum, Rørhøg og Drosselrørsanger, der har faaet mig til at opsøge Stedet saa hyppigt. Det hører jo til de sjældne Oplevelser, at iagttage disse Arter i Yngletiden.

---

## MINDRE MEDDELELSER

Ved R. HØRRING.

Nedenfor offentliggøres et Antal ornithologiske Iagttagelser, som er indsendt af Medlemmerne siden forrige Samling af »Mindre Meddelelser« (D. O. F. T., 31te Aarg., 1937, S. 142—168).

### Fugle paa Romsø i Storebælt.

Den 12. Juni 1938 havde jeg Lejlighed til at følge Fyns Naturhistoriske Forening paa en Udflugt til Romsø. Dene ligger i Storebælt ud for Hindsholm, er 197 Td. Land og bestaar mest af Skov, dannet af blandet Bevoksning af Eg, Bøg og Ask, samt en lille Plantning af Sitkagran. Ca. 100 — oprindelig udsatte — Daadyr græsser i Skoven. Øen løber mod Syd ud i ca. 20 m høje stejle Lerskrænter; mod Vest løber et gruset Stenrev over mod Hindsholm, kaldet Kleppen. Den tuede Grønsvær mellem Skovkant og Strand har aldrig været under Plov. Hist og her staar smukke, træagtige Hvidtjørn.

LARSEN har i FRIIS: »De Danskes Øer« noteret 42 Fuglearter. Vi noterede 34, af hvilke LARSEN ikke har de ni; til Gengæld var der nogle af LARSEN nævnte Arter, bl. a. Bruschøns, som vi ikke fik set. Mest Interesse knyttede sig til de rugende Toppede Skallesluger (*Mergus serrator*) og et rugende Par Tejster (*Uria grylle grylle*).

Skalleslugerreden fandtes oppe paa høj Lerskrænt, ca. 1 m fra Overkanten, mellem Rødderne af Tjørnebusk og indeholdt 12 Æg. Fuglene flygtede begge, da de mange Mennesker nærmede sig, men Hunnen blev liggende tæt under Land. Under en tæt Tjørn et Stykke derfra fandtes 1 Æg. Reden dér er formentlig blevet opgivet.

Tejstereden var et Hul i Lerskrænten, meget vanskelig tilgængeligt og indeholdt et Æg. En af Fuglene saas langt ude paa Havet.

Iøvrigt iagttoges følgende Fugle:

Stokand, *Anas p. platyrhyncha*. Enkelte saas.

Gravand, *Tadorna tadorna*. Talrig. En Rede fandtes i Lerskrænt.

Troldand, *Nyroca fuligula*. 2 Hanner svømmede udfor Kleppen.

Knortegaas, *Branta b. bernicla*. Et Expl., svømmende.

Vibe, *Vanellus vanellus*. Lidet talrig; en enkelt Unge blev truffet.

Præstekrave, *Charadrius h. hiaticula*. Enkelte saas.

Strandskade, *Haematopus o. ostralegus*. Et Par Snese paa Kleppen.

Rødben, *Tringa t. totanus*. 3—4 Par saas.

Stormmaage, *Larus c. canus*. Øens talrigste Fugl. Langs Stranden rundt om hele Øen fandtes Rederne, dels mellem Tang og Stene, dels paa Grønsværen. En enkelt Rede laa i Hulningen af en halvraadden Vindfælde. Egentlige Kolonier var der ikke, men ofte var der kun et Par m mellem Rederne. De indeholdt alle 3, delvis rugede, Æg. Antallet af Reder var svært at angive, da Udflugtens Medlemmer ikke færdedes samlede, men der var flere Hundrede.

Sølvmaage, *Larus a. argentatus*. Antal af Reder var ca.  $\frac{1}{10}$  af Stormmaagerederne. Enkelte Æg var udrugede, og Ungerne

svømmede nær Land. En Rede indeholdt 3 Maageæg samt et grønligt Andeæg.

Fjordterne, *Sterna h. hirundo*. Kun et Par saas.

Ringdue, *Columba p. palumbus*. Hørtes; vi fandt Rester af to unge Fugle, slaaede af Rovfugl. Jeg har truffet Duehøgen ovre paa Hindsholm.

Gøg, *Cuculus c. canorus*. En kukkende Han hørtes.

Krage, *Corvus corone cornix*. Enkelte saas.

Bysvale, *Delichon u. urbica*. Nogle Stkr. ved Fyrbygningerne.

Forstuesvale, *Hirundo r. rustica*. Flere saas.

Lærke, *Alauda a. arvensis*. Ikke mange.

Stær, *Sturnus v. vulgaris*. Almindelig.

Træløber, *Certhia f. familiaris*. En iagttoges i Skoven.

Brunelle, *Prunella m. modularis*. Hørtes gentagne Gange.

Musvit, *Parus m. major*. En Rede med Unger i Stendige.

Tornsanger, *Sylvia c. communis*. Hørtes synge.

Gulbug, *Hypolais icterina*. Ligeledes.

Havesanger, *Sylvia borin*. Ligeledes.

Skovsanger, *Phylloscopus s. sibilatrix*. Ligeledes.

Hvid Vipstjert, *Motacilla a. alba*. En set ved Stranden.

Sangdrossel, *Turdus e. ericetorum*. Hørtes et Par Gange.

Solsort, *Turdus merula*. Enkelte saas.

Graaspurv, *Passer d. domesticus*. Ret faatallig.

Bogfinke, *Fringilla c. coelebs*. Ligeledes.

Svenske, *Chloris c. chloris*. Enkelte saas.

Gulspurv, *Emberiza c. citrinella*. Ligeledes.

AXEL HOLM.

### Interessant Fugleliv i Utterslev Mose ved København.

Den tørre Eftersommer 1937 fik Vandet i Mosens vestlige Del til at fordampe; derved fremkom de Dyndbanker, der er en Betingelse for det rige Vadefugleliv i Mosen, og mange interessante Iagttagelser kunde gøres, bl. a. følgende lille Oplevelse fra d. 30. September 1937. Paa en mindre Dyndbanke saa jeg en lille, men artsrig Vadefugleflok, der bestod af følgende Arter: 1 Rødben, *Tringa t. totanus*, 1 Sortklire, *Tringa erythropus*, 3 Præstekraver, *Charadrius h. hiaticula*, 1 Dværgryle, *Calidris minuta*, 1 Alm. Ryle, *Calidris a. alpina*, 2 Krumnæbbede Ryler, *Calidris testacea* og 2 Bred-

næbbede Ryler (Kærløbere), *Limicola falcinellus*. De to sidste Arter har jeg ikke tidligere med Sikkerhed truffet i Mosen, hvorfor de da heller ikke findes paa Fuglelisten over Upperslev Moses Fugleliv (D.O.F.T., 30, 1936). For Rødben og Kærløber var det en ret sen Forekomst. I. GERNA

### Fuglelivet paa Knudshoved, Nyborg Fjord.

Langfredag d. 15. April foretog jeg sammen med mine Søner en Udflugt til Fynshoved, Hindsholm. Da min ældste Søn her mente at have set en Klyde, *Recurvirosta a. avocetta*, besluttede vi at søge denne paa dens ret nye Yngleplads i den lille Strandsø, som ligger helt ude ved Slipshavn ved Nyborg Fjord. Her havde jeg i Eftersommeren 1936 set 2 Par med Unger, og andre Iagttagere har skrevet om denne nye Yngleplads i D.O.F.T.

Vi kom da herud 1. Paaskedag (17. 4. 1938) i en Brandstorm fra NV. med Haglbyger; paa de til Søen grænsende Arealer holdt Harer, Agerhøns og Fasaner saa haardt, at man var lige ved at træde paa dem, og Søen var myldrende fuld af Vandfugle, der tillod Iagttagerne at komme meget nær, før de lettede.

Klyderne var der rigtigt nok; hele 16 Stkr. stod urørlige paa en Græsholm ude i Søen i Selskab med andre Vadere og flyttede sig ikke i de 1½ Time, vi gik rundt om Søen. Iøvrigt iagttoges følgende Fugle:

Krikand, *Anas c. crecca*. Nogle faa.

Stokand, *Anas p. platyrhyncha*. Talrig.

Skeand, *Spatula clypeata*. 1 Par.

Gravand, *Tadorna tadorna*. Ca. 10 Par.

Knopsvane, *Cygnus olor*. 12 Stkr.

Troldand, *Nyroca fuligula*. En lille Flok saas.

Taffeland, *Nyroca ferina*. En Hun saas.

Vibe, *Vanellus vanellus*. Talrig.

Præstekrave, *Charadrius h. hiaticula*. Ca. 10 Stkr. saas.

Stenvender, *Arenaria i. interpretis*. 1 Par mellem Stenene ved Foden af Fyrklinten.

Rødben, *Tringa t. totanus*. Talrig.

Horsegøg, *Capella g. gallinago*. 3 Par.

Hættemaage, *Larus r. ridibundus*. Saas i Hundredvis.  
 Sølvmaage, *Larus a. argentatus*. Nogle Snese saas.  
 Krage, *Corvus corone cornix*. Nogle faa saas.  
 Rørhøne, *Gallinula c. chloropus*. 1 Stk. saas.  
 Blishøne, *Fulica a. atra*. Mange saas.  
 Stær, *Sturnus v. vulgaris*. Stor Flok saas.  
 Toplærke, *Galerida c. cristata*. 1 Par saas.  
 Sivsanger, *Acrocephalus schoenobaenus*. 1 Stk. saas.  
 Engpiber, *Anthus pratensis*. Mange saas.  
 Hvid Vipstjert, *Motacilla a. alba*. 2 Par saas.  
 Solsort, *Turdus m. merula*. 1 i Lunden ved Stationsbygningerne.  
 Digesmutte, *Oenanthe o. oenanthe*. 1 Par ved Fyret.  
 Bogfinke, *Fringilla c. coelebs*. Saas i Lunden.  
 Rørspurv, *Emberiza s. schoeniclus*. 1 Par saas.

Foruden de iagttagne Fugle var der sikkert mange, som skjulte sig i Siv og Græstotter. Nogle kunde som Følge af Afstand og Bygevejr ikke med Sikkerhed artsbestemmes, Kliner, Ryler og Strandhjejler? Kun en ringe Part af dem maa formodes at være ynglende paa Stedet. Ved tidligere Besøg har jeg saaledes ikke truffet ynglende Svaner. Af Ynglefugle fandt vi blot en Vibe, rugende paa 4 Æg, og en Graaand, der littede fra en Rede med 6 Æg. Nogle søndrede Skaller af Hættemaageæg tydede paa Kragernes Misgerninger.

AXEL HOLM

#### **Kongeederfugl, *Somateria spectabilis*, fra Storebælt.**

En Kongeederfugl, en ung Han i den første voksne Dragt, blev skudt omkring Midten af Januar 1938 i Farvandet mellem Romsø og Sprogø, hvor den var alene. JOHS. LARSEN

#### **Kongeederfugl, *Somateria spectabilis*, fra Sejro.**

En Kongeederfugl, en voksen Han, fandtes beskadiget af Olie ved Sejro i Vinteren 1932; er nu i Lærer CARL HANSENS Samling paa Sejro. B. SEIERSEN

#### **Graagaas, *Anser anser*, ynglende i Haderslev Amt.**

Den 28. August 1938 saa jeg under et Besøg i Flovt, Haderslev Amt, flere Hundrede Graagæs. Tidspunktet er lidt tidligt.

En tilfældig Jæger, jeg traf ved Flovt Strand, oplyste, at han i 1934 havde truffet en rugende Graagaas ved Benkeldam; Reden var blevet forstyrret.

AXEL HOLM

### Vagtel, *Coturnix coturnix*, i Danmark.

Den 7. Oktober 1937 blev en Vagtel ♀ ad. skudt ved Jægerspris. Den smukt opstillede Fugl findes i min Samling. Det hører til Sjældenhederne, at denne lille Hønsfugl ses her i Landet og det er som kendt den eneste Hønsfugl, der trækker her over. Enkelte Par yngler her i Landet; dens Rede med 8 Æg blev bl. a. fundet ved Demstrup pr. Dalbyover sidst i Maj 1936, men desværre blev Æggene ødelagt af en Slaa-maskine. (Godsinspektør FR. THYE, Demstrup).

Paa Bidstrup Gods blev den 21. September 1937 skudt en Vagtel og set 5—6 andre. Den 22. blev der yderligere set en Vagtel ca. 1 km fra det Sted, hvor de første var truffet. Af Godsets Jagtjournal, der gaar tilbage til 1892, fremgaar det, at der i alt Fald ikke siden nævnte Aar er nedlagt Vagtler der paa Stedet. Jeg skal yderligere henlede Opmærksomheden paa, at Dansk Jagttidende i Nr. 15 (1. Nov. 1937), Side 315 meddeler, at der ogsaa i 1937 er skudt Vagtler paa Ravnholtgaard pr. Verst og i Salling. (Hofjægermester HONNENS DE LICHTENBERG, Bidstrup pr. Laurberg).

Paa »Birket« i Odsherred blev den 2. Oktober 1937 set flere Vagtler; de laa enkeltvis og fløj op med et underligt Pift. Dagen før havde der været adskillige. (Godsinspektør FR. THYE, Demstrup pr. Dalbyover).

AXEL KOEFOED

### Trane, *Megalornis grus grus*, paa Efteraarstræk.

Den 13. August 1938 saas 2 Traner staaende paa Fladvandet langs Østsiden af Saltbækvig.

H. DRUCKER, TH. FRÖLICH, CHR. KRÜGER

### Triel, *Oediconemus crepitans*, fanget ved Hillerød.

I Følge Meddelelse fra Prof., Dr. phil. C. WESENBERG-LUND blev en Triel fanget i en Roemark ved Hillerød d. 12. Juni 1938; han foranledigede den indsendt levende til Zoologisk Have, hvor den levede til d. 10. Oktober 1938. Den blev da

indsendt til Zoologisk Museum, idet Inspektør REVENTLOW yderligere oplyste, at den var fanget af en Hund i Aamosegaardens Mose, idet den havde en beskadiget Vinge. Ved Sektionen viste den sig at være en ung Hun. R. HØRRING

**Lille Præstekrave, *Charadrius dubius curonicus*,  
ynglende i Utterslev Mose.**

Den Lille Præstekrave nævnes ikke i N. CHRISTIANSENS Liste over Mosens Fugle (D.O.F.T., 2, 1908, S. 152), og i GERNAAS Liste (D.O.F.T., 30, 1936, S. 23) omtales den kun som set 2 Gange. Selv har jeg set den regelmæssigt paa Efteraarstrækket, og i Sommer 1938 saa jeg, at den ynglede dér. Grunden til, at den har ynglet dér i Aar, er sikkert, at den har fundet en passende Ynglelokalitet, nu da Vandvæsenet har sænket Vandstanden i Mosen betydeligt. HOLGER POULSEN

**Stenvender, *Arenaria interpres interpres*, paa  
Efteraarstræk.**

Den 15. August 1938 saa vi 8 Stenvendere, paa Enø, deraf 2 ad. H. DRUCKER, TH. FRØLICH

**Sorthalet Kobbersnepe, *Limosa limosa*,  
ynglende i Agnø Enge.**

26. Maj 1938 fangede og ringmærkede jeg 2 Dununger af Sorthalet Kobbersnepe i Agnø Enge, S.V. for Køng; medens jeg stod med Ungerne, fløj de gamle Fugle bestandigt skrigende over mit Hoved, dog i tilbørlig Afstand. Ifølge Gdr. ANDERS PEDERSEN LOU (D.O.F.T., 11, 1916—17, S. 150) har denne Art tidligere ynglet i Moserne ved Køng og Lundby; ved disses Udtørring er den da flyttet til Agnø Enge, hvor der i 1938, efter mine Iagttagelser, dog kun rugede et Par.

V. NIELSEN

**Odinshane, *Phalaropus lobatus*, fra Københavns Omegn.**

Conservator H. MADSEN iagttog d. 10. September 1936 en Odinshane, ung Fugl, i Kongens Enghave ved Kalvebodstrand. R. HG.

**Sildemaage, *Larus fuscus*, ynglende paa Bornholm.**

Under et Ophold i Nexø i Sommer gik jeg d. 4. Juni 1938 en Tur ud ad Balka Strand syd for Nexø. Vejen ud til Stranden gaar igennem en lille Hedestrækning, hvor der rugede en Del Stormmaager, hvoraf flere havde Reder i Toppen af nogle Skovfyr. Jeg gik henimod en lille Høj, hvor der opholdt sig 4 Sildemaager; da jeg kom nærmere, fløj de 3, medens den fjerde blev liggende og først fløj op, da jeg var helt henne ved den. Den laa og rugede paa 2 Æg. Reden var anbragt midt i Lyngen og var bygget af Rensdyrlav. Naar Fuglen laa og rugede, var den meget udsat for at blive opdaget, idet den var meget iøjnefaldende paa Baggrund af den mørke Lyng, og den laa kun ca. 50 m fra en Vej, hvor mange Mennesker færdedes. Da jeg kom til Reden næste Dag, var Æggene væk, og den lagde ikke senere andre Æg. Jeg saa efter, om der skulde være flere Reder, men der var ikke andre, selvom der opholdt sig flere Sildemaager paa Stedet. Det er interessant at se, at Sildemaagen, der her i Landet hidtil kun har ynglet paa Græsholmen ved Christiansø og paa Anholt, har vist Tendens til at brede sig.

HOLGER POULSEN

**Sortterne, *Clidonias nigra*, iagttaget usædvanligt sent.**

Under Vaaddragning i Roskildefjord d. 26. September 1938 saa jeg N. for Frederikssund en ung Sortterne, der længe fulgte Baaden; da denne Art oftest har forladt Danmark i Begyndelsen af August, er denne Forekomst usædvanlig sen.

A. DITLEVSEN

**Rødfodfalk, *Falco vespertinus*, ved Fiil Sø.**

23. Maj 1938 saa jeg Syd for Hennegaard, ved Kanalen, der afvander Fiil Sø, en Rødfodfalk, jagende over de tørlagte Arealer.

JOHS. LARSEN

**Glenter, *Milvus milvus*, set i Vanløse.**

Den 16. Marts 1937 saas 4 Glenter flyvende over Vanløse i nordøstlig Retning.

H. POULSEN



**Kongeørn, *Aquila crysaëtus*, paa Amager.**

21. Oktober 1938 stod jeg paa Engen foran Kongelunden og iagttog de store Mængder Kragefugle (ialt saas ca. 2800) og Musvaager (ialt ca. 630 Stk.), som trak over Øen. Kl. 13.05, endnu inden Musvaagetrækket havde naaet sit Højdepunkt, viste en Kongeørn (ad.) sig over Kongelunden; den trak ud sammen med Musvaagerne og fulgte disses Trækretning, idet den først fløj mod Nord og senere drejede mod Vest.

H. REEH

**Havørn, *Haliaëtus albicilla albicilla*, paa Amager.**

Den 22. Marts 1938 saa jeg en ung Havørn ved Amagers Sydkyst. Fuglen, der kom flyvende vestfra langs Stranden, kredsede et Øjeblik over Aflandshage, inden den forsvandt i sydlig Retning ud i Køge Bugt.

THORVALD FRØLICH

**Stort Antal Skovhornugler, *Asio otus otus*,  
paa lille Terrain.**

Paa et Terrain paa ca. 25 × 50 Meter, hvoraf den ene Halvdel var beplantet med Fyrretræer og den anden med Grantræer, saa Undertegnede d. 4. Februar 1938 15—20 Skovhornugler. Langt de fleste sad i Fyrretræerne; visse Træer syntes at være foretrukne; indtil 5 Ugler saas klumpet sammen i eet Træ, ligesom der under bestemte Træer fandtes særlig meget Gylp. Den 2. April saas ingen Ugler; den 10. April var der 3. Ca. 60 Gylp blev undersøgt; de indeholdt hovedsageligt Rester af forskellige Musearter (særligt af Markmus og Skovmus); nogle Rester af Fugle (vistnok Gulspurve) fandtes dog ogsaa.

H. WONSILD, C. A. BLUME

**Ynglende Slørugle, *Tyto alba guttata*, paa Lolland.**

Den 18. Juni 1938 havde Undertegnede Lejlighed til at se et Sløruglebo i Grænge. Boet fandtes i et Dueslag, hvorfra Duerne var forjaget. Som Redemateriale fandtes udelukkende Gylp. Reden skal have været benyttet den sidste halve Snes Aar. I Reden fandtes 3 halvvoxne Unger. I Skumringen havde vi Lejlighed til at se de to gamle Fugle jage paa de

omkringliggende Marker. Med et Mellemrum af kun 5—10 Minutter kom en af Fuglene tilbage med en Mus.

H. WONSILD, C. A. BLUME

**Skarv, *Phalacrocorax carbo subcormoranus*,  
i Smaalandsøhavet.**

Den 14. August 1938 iagttoges ca. 40 Skarve ud for Glæno Vesterfed, hvor de holdt til paa Bundgarnspælene. Hovedparten af dem var, saavidt det kunde ses, Ungfugle.

Et lignende Antal saas den 21. August s. A. ved Knudshoved Rev nær Vordingborg af Vekselerer C. J. TILLISCH.

H. DRUCKER, TH. FRØLICH, CHR. KRÜGER

**Skarv, *Phalacrocorax carbo subcormoranus*,  
i Nakskov Fjord.**

I Tilslutning til POUL MADSENS Meddelelse om Skarven omkring Lolland-Falster (D.O.F.T., 31, 1937, S. 157) har det maaske Interesse at supplere denne Beretning. I 1937 synes der rigtignok at have været ualmindelig mange, men i Nakskov Fjord er Flokkene større, end »op til 20 Stkr.«

Skarven plejer at komme i Slutningen af Juli Maaned og bliver her indtil ind i Oktober; det drejer sig hovedsagelig om unge Fugle, som maa antages at komme fra Kolonien paa Rügen, idet flere ringmærkede Individuer stammende herfra er blevet skudt i Nakskov Fjord.


Den 6. August 1938 iagttog jeg paa Bundgarnspælene Vest for Enehøje i Nakskov Fjord ca. 3—400 Skarve, og d. 5. September et noget lignende Antal; d. 19. September iagttog jeg paa Bundgarnspælene ved Albuen ca. 20—30 Stkr.

ERIK PETERSEN

**Flagspætte, *Dryobates major*, ødelægger Blaamejskasse  
og bortfører Ungerne.**

I en Have i Vejle var ophængt en Mejskasse af Birketræ, beboet af et Par Blaamejsere, *Parus coeruleus*, der havde næsten flyvefærdige Unger. Den 31. Maj Kl. 18 iagttoges en større Fugl, der fløj fra Redekassen med en af Blaamejse-

ungerne i Næbbet; jeg saa da, at der ca. 3 cm fra Flyvehullet var udmejslet et nyt Hul i Redekassen. Kassens Vægge var 1 cm tykke og Træet ganske friskt. Senere paa Aftenen hørte jeg Banken paa Kassen og saa en Fugl med sort og hvid Farve paa Ryggen og noget rustrodt paa Bagkroppen flyve bort fra Redekassen. Fuglen saa jeg ikke senere, men Dagen efter



var Flyvehullet udmejslet helt op til Laaget af Kassen (se Billedet), ja, en Del af den ca. 1½ cm tykke Træplade, der tjente til at holde Laaget paa Plads, var ogsaa bortmejslet. Alle Blaamejseungerne var nu borte.

Beskrivelsen af Fuglen og det paa Kassen udførte Tømrerarbejde lader ingen Tvivl om, at Gerningsmanden var en Flagspætte.

MICH. MIKKELSEN

### Sortspætter, *Dryocopus martius*, i Rungsted.

Ca. 15. September 1937 saas Sortspætten 2 Gange paa samme Dag, baade om Formiddagen og om Eftermiddagen,

i Rungstedgaards Have; den opholdt sig i et stort Elmetræ med udgaaede Grene; ca. 1. Oktober saas en Sortspætte atter samme Sted.

E. PREBENSEN

### Husskadens, *Pica pica*, Udbredelse paa Jonstrupegnen.

Medens jeg har været paa Jonstrupegnen, har jeg ikke kunnet undgaa at lægge Mærke til, hvor overordentlig talrig Husskaden var paa denne Egn, der maatte yde gode Betingelser for denne Fugl, rig som den er paa Bakker, bevoksede med Krat og Hegn, og med en ret tæt Bebyggelse af Smaagaarde.

Ved Vintertid og i det tidlige Foraar saa man mest til Husskaden. Paa Frostvejrdsdage hændte det saaledes, at jeg iagttog 11—13 Husskader i Luften blot i det Minut, jeg paa Cykel kørte ned ad Jonstrup Bakke, og naar jeg en Foraarsdag lukkede mit Vindue op, var det et almindeligt Syn at se 4—6 Husskader hoppende henover den brune Mark opsøgende Larver. Kort før Paaske holdt de særlig til i Kæret, og det ene Par gav sig i Lag med at udbedre Reden i Toppen af et Popeltræ tæt ved. Saa indtraadte en Tid, hvor man saa og hørte forbavsende lidt til Husskaden. Yngletiden maatte altsaa være inde.

For at faa Klarhed over Skadens Talrighed begyndte jeg da en systematisk Optælling og Undersøgelse af Egnens Skadereder, som varede fra d. 25. April 1938 og godt en Maaned frem i Tiden.

Der optaltes 63 Skadereder, hvoraf kun 25 eller 39,68 % var beboede. Af disse var det kun muligt at undersøge de 16, da de øvrige var for utilgængelige, enten for højt til Vejrs eller i tæt Tjørn, og jeg konstaterede blot ved Iagttagelse, at der ynglede Skader, som altsaa enten havde Æg eller Unger. Af de 16 undersøgte Reder var der Æg i de 9, medens de resterende 7 indeholdt Unger. Af Reder med Æg indeholdt de 4 seks Æg, 2 syv Æg, 1 fire Æg og 2 et Æg, ialt 44 Æg. Af Reder med Unger indeholdt 1 seks Unger, 3 fem Unger, 2 fire Unger og 1 tre Unger, ialt 32 Unger. Forudsatte vi det ret usandsynlige, at der vilde komme Unger af alle 44 Æg, og der af dem saavel som af de 32 Unger ingen vilde dø, maatte der fra de 16 Reder komme en Forøgelse af Skadebestanden paa

76 Individuer. Af de 38 ubeboede Skadereder var 18 gamle og affældige, idet Overdelen var sunket sammen eller blæst væk, medens de resterende 20 eller 52,63% var mere eller mindre godt i Stand. Af Rederne var 32 eller 50,79% anbragt i Træer (hyppigst Popler), medens de resterende 31 eller 49,21% var anbragt i Krat, Buske eller buskagtige Træer. I et enkelt Tilfælde var der anbragt 3 Reder i samme Poppel i forskellig Højde, kun den øverste var imidlertid beboet. I nogle Tilfælde blev der i Hegn truffet Reder tæt ved Siden af hinanden.

GR. SCHMIT

### Albinisme hos Forstuesvale, *Hirundo r. rustica*.

I Hellinge ved Nakskov fandt jeg d. 7. August 1937 en Rede af Forstuesvale med 4 Unger; de to var normale, men de to andre var fuldkommen hvide; Ungerne var paa dette Tidspunkt næsten flyvefærdige. — Efter at de var fløjet af Reden, holdt de hvide sig for sig selv; efter en Uges Forløb



A. SVENDSEN fot.

forsvandt den ene, og den anden holdt sig stadig væk for sig selv og længe efter, at de andre Svaler var forsvundet fra Landet, kunde den ses omkring Stedet, hvor den var født. I Slutningen af Oktober forsvandt den. ERIK PETERSEN

**Bjerglærke, *Eremophila alpestris flava*, paa  
Foraarstræk.**

Paa en Tur til Saltbækvig den 13. Marts 1938, sammen med 4 andre Ornithologer, iagttoges en stor Flok Bjerglærker paa ca. 130 Fugle, der holdt til paa den tørre, stenede Kyststrækning langs Østsiden af Vigen, nær den udgaaede Skov.

TH. FRØLICH

**Vandstær, *Cinclus cinclus cinclus*, ved Pedersker  
paa Bornholm.**

Den 16. Oktober 1938 saa jeg en Vandstær, *Cinclus cinclus cinclus*, i Strandkanten noget Vest for Vestre Sømarkshuse i Pedersker paa Bornholm. Den lod min Ledsager og mig komme ganske nær, indtil en Afstand af 6—7 m, idet vi forsigtigt nærmede os den. Vi stod længe og betragtede den. Den lod sig ligefrem overskylle af Brændingen og syntes at søge Føde i den opskyllede Tang.

E. WAAGE

**Syngende Vandstære, *Cinclus cinclus cinclus*, ved Susaa.**

Paa en Excursion d. 13. Februar 1938 til Susaaen ved Herlufsholm saas 3 Vandstære, der alle villigt gav deres vellydende Sang til bedste; den mindede om Lærkens Sang. I øvrigt saas Vandstærene baade svømmende og dykkende.

C. A. BLUME

**En Unge af Havesanger, *Sylvia borin*, hos  
Tornirisk, *Carduelis cannabina*.**


Da jeg den 9. Juni 1937 i Ringmærkningsøjemed fandt en Torniriskrede, blev jeg noget forbavset, da jeg blandt de fire Torniriskunger opdagede en Havesangerunge. I den Tid, jeg var ved Reden for at forsyne Fuglene med Ringe, saa jeg intet til de gamle Fugle — kun kunde jeg noget borte høre en Havesangers Varsellyd.

Reden var anlagt i en Tjørnehæk, som nogle m borte husede endnu en Torniriskrede med 4 Unger. Ungerne var alle flyvestore, og Dagen efter var de væk fra Rederne, saa der blev ikke nogen Lejlighed til at studere de gamle Fugle ved Reden.

Der maa jo kunne fremsættes den Formodning, at et Par Havesangere har bygget Rede i Hækken og begyndt Æglæg-

ningen, men er blevet forstyrret af et Par Tornirisker, som ogsaa har villet anlægge Rede paa dette Sted; der er opstaaet en Stridighed, som er resulteret i, at Torniriskerne har jaget Havesangerne bort, begyndt at bygge deres Rede oven paa Havesangerreden, lagt deres Æg og udruget dem og Havesangerens ene.

ERIK PETERSEN



JOHS. LARSEN del.

**Sortrygget Vipstjert, *Motacilla alba yarellii*,  
fra Danmark.**

Atter iaar, i Marts Maaned 1938, saa jeg en Sortrygget Vipstjært i min Have i Kerteminde (sml. »Mindre Meddelelser« 1937, Pag. 166).

Den 27. April 1938 saa jeg én udenfor Kirkeby Kro (Henne St., Vestjylland); den viste sig atter den 9. Maj og var der stadig siden; den var meget lidt sky. I Begyndelsen var den alene, men den 27. Maj opdagedes det, at det var en Hun, der var parret med en Hvid Vipstjært af den almindelige Race, og at de havde Unger i en Rede under Mønningen paa Rørtaget paa Kroen; her var afdækket med Hjelme, der blev holdt fast af vidmasket Traadvæv, mellem hvis Masker Fuglene søgte til og fra Reden.

Hunnen (den sortryggede) var noget mindre end Hannen. Paa min her gengivne Pennetegning ses tydeligt det, som er

karakteristisk for den sorttryggede Form, at det sorte paa Bryst og paa Nakke gaar over i hinanden. Den mørke Rygfarve ses ogsaa tydelig, men den er aldrig saa fremtrædende hos Hunnen som hos Hannen, der kan have fuldstændig sort Ryg.

JOHS. LARSEN

**Sorthovedet Gul Vipstjert, *Motacilla flava borealis*,  
set ved Graasten.**

9. Maj 1938 saa jeg paa Græsplænen i Slotsparken bag Graasten Slot en Flok paa 10 Individuer af Sorthovedet Gul Vipstjert, alle med mørkt Hoved. De søgte Insekter i den tætte Græsbund.

JØRGEN JØRGENSEN

**Bjergvipstjert, *Motacilla cinerea*, paa Amager.**

Da vi d. 22. Oktober 1938 sad paa Amagers sydligste Spids (Aflandshage), fløj en Vipstjert med gullig Bug forbi. Den gik ned paa Stranden tæt ved os, og ved nærmere Eftersyn godtgjorde den meget lange Hale, den graa Overside, den kraftigt gule Undergump og de lyse brunlige Ben, at vi havde en Bjergvipstjert for os.

Fuglen, der vel stammer fra en af Artens faa Ynglepladser paa den skandinaviske Halvø, maa være trukket hurtigt igennem, idet den ikke var blevet iagttaget den foregaaende Dag, skønt Terrænet var blevet omhyggeligt undersøgt, og den den følgende Dag, trods adskillige Ornithologers ihærdige Anstrebninger, ikke blev set igen. Saa vidt vi ved, er det første Gang, Bjergvipstjerten med Sikkerhed er set paa Amager.

J. A. GUILDAL, H. REEH

**Bjergvipstjert, *Motacilla cinerea*, ynglende ved Aabenraa.**

Bjergvipstjerten ruger i Aar (1938) ved Aabenraa. Efter at min Datter allerede i 1937 havde fundet en Rede i Randen af en Stenkiste under Vejen Aabenraa—Tønder og givet en Beskrivelse af Fuglen, der ret sikkert tillod Bestemmelse af Arten, fik jeg i Aar Lejlighed til at eftersøge den interessante Fugl, og nogle Hundrede m fra den gamle Rugeplads fandt jeg Hunnen paa Reden i en 2 m høj, lodret, mosgroet Skrænt



ved en Skovbæk. Reden indeholdt 5 Æg. Jeg havde flere Gange Lejlighed til at iagttage Fugleparret.

HANS SCHMIDT

**Solsort, *Turdus m. merula*, ynglende 2 Gange i Træk  
i samme Rede.**

Til Notitsen med denne Overskrift af K. SCHÄFFER (D. O. F.T., 31, 1937, p. 164) kan jeg meddele følgende Iagttagelse:

Den 20. Maj 1936 fandt jeg i Anlægget, der hører til Kysthospitalet paa Refsnæs, en Solsort-Rede i et Grantræ; den var ca. 2 m over Jorden og indeholdt 4 Unger, der næsten var flyvefærdige, og nogle Dage senere var Ungerne ogsaa fløjet ud. Da jeg d. 9. Juni kom forbi Redestedet, saa jeg tilfældigvis Halen af en rugende Solsort, antagelig samme Fugl; det kan bemærkes, at Reden ingen Skade havde taget efter første Kuld. Den 30. Juni indeholdt Reden 2 flyvedygtige Unger og 1 ubefrugtet Æg.

ERIK PETERSEN

**Solsort, *Turdus m. merula*, rugende i en gammel  
Sangdrossel-Rede.**

Den 12. Juni 1937 fandt jeg en Solsort-Rede med 6 Unger; ved nærmere Undersøgelse viste Reden sig at være en gammel Sangdrossel-Rede. Den sad kun  $\frac{1}{2}$  m over Jorden.

ERIK PETERSEN

**Blaahals, *Luscinia suecica suecica*, paa Amager.**

Den 18. September 1938 saa jeg, sammen med flere andre Ornithologer, en Blaahals paa Amagers Sydkyst ved Sydvestpynten, hvor Fuglen holdt til i den ret høje Bevoksning nær Strandkanten. At dømme efter Brystets og Halsens Farver drejede det sig vistnok nærmest om en ♂ ad. i Efteraarsdragt. Paa den hvide Strube, der forneden var omgivet af et blaat, dernæst et mørkt og nederst et rødbrunt, buet Tværbaand, saas svage Antydninger af rødt.

THORVALD FRÖLICH

**Dompap, *Pyrhula pyrrhula*, ynglende ved Aarhus.**

I den saakaldte »Forsthave« i Marselisborg Skov, lige udenfor Aarhus, fandtes Dompappen ynglende i Foraaret 1938.

Jeg sad d. 11. Maj 1938 paa en Bænk, da jeg pludselig ser en Dompap Hun flyve ind i en Tuja og ikke komme ud igen i Løbet af 10 Minutter, hvorfor jeg underkastede Tujaen et nærmere Eftersyn. Da jeg bøjede Grenene til Side, fløj Hunnen ud fra Reden, der indeholdt 5 Æg. Nogle Dage senere fotograferede jeg Fuglen paa Reden. Fuglen var ret tillidsfuld, idet



T. KJÆR fot.

Rede med c. 5 Dage gl. Unger af Dompap, 1938.

den tillod, at Grenene blev bøjet lidt til Siden, saa jeg kunde fotograferere Fuglen paa ca. 1½ m Afstand. Den 20. Maj var Æggene udrugede, hvorefter Ungerne var i Reden til 3. Juni, da de som tilstrækkelig fuldfjedrede forlod Reden. I den Tid, Rugningen stod paa, besøgte jeg hver Dag Reden og har kun set Hunnen ruge. Da Ungerne var udklækkede, hjalp Hannen og Hunnen hinanden med at fodre Ungerne. Selv om jeg flere Gange var Fuglene meget nær, ca. 2 m, er det mig umuligt at sige, om det var den sydlige eller nordlige Race.

TH. KJÆR

**Bemærkninger om de bornholmske Gulspurves, *Emberiza citrinella*, og Bogfinkers, *Fringilla coelebs*, Sang.**

I Sommeren 1938 var jeg paa Bornholm i Juni Maaned, da Fuglesangen var paa sit højeste, bl. a. fordi jeg interesse-

rede mig for at faa de bornholmske Fugles Sang at høre. Jeg havde i tidligere Aar lagt Mærke til de bornholmske Gulspurves Sang, som SALOMONSEN har beskrevet i D. O. F. T., 27, 1933, S. 13, og nu vilde jeg gerne høre lidt nøjere paa dem. I denne Forbindelse er det jo Slutstrofen i Gulspurvens Sang der interesserer. Indledningsstrofen er den samme som i det øvrige Land; den bestaar af nogle korte, ensartede Toner, snart er de fine og spinkle og kommer i en hurtig Rytme, snart er de grovere og kraftigere og kommer i en langsommere Rytme. Slutstrofen derimod er jo afvigende, og naar man rejser rundt paa Øen, faar man Indtryk af, at de fleste synger zity, medens Resten synger ty. Men lytter man til de enkelte Individuer og hører dem synge i nogen Tid, opdager man, at et og samme Individ synger begge Strofer, idet den i nogen Tid synger zity og dernæst nogle Gange ty stadig skiftende. Der er saaledes ikke to Slags Gulspurve paa Bornholm, der synger hver sin Dialekt, men de synger alle baade den nordlige ty Strofe og den sydlige zity Strofe. Denne sidste høres nu og da i det øvrige Danmark, hvor den maa betragtes som en individuel Variation. Jeg hørte ingen af de bornholmske Gulspurve synge den anden nordlige Strofe ty-sri. Den, der har et trænet Øre for Fuglesang, vil straks opdage, at ogsaa de bornholmske Bogfinker synger paa en afvigende Maade, hvilket Konservator H. MADSEN allerede har omtalt i et Foredrag.

Straks, da jeg kom til Bornholm, lagde jeg Mærke til, at Bogfinkerne afkortede deres Sang, idet de udelod den sidste af de 2 Strofer i Slaget, hvorved den mistede den smukke Slutning, man er vant til at høre. Vil man prøve paa at gengive Bogfinkens Sang med Bogstaver, kommer Sangen i Almindelighed til at lyde omtrent saaledes: ti-ti-ti-ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty-uit-tiu. De første Toner er højere og svagere end de efterfølgende, der kommer med aftagende Tonehøjde og med tiltagende Styrke. Til Slut kommer Slaget, bestaaende af to Strofer, først en stigende dernæst en faldende. Paa Bornholm lyder Sangen derimod ti-ti-ti-ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty-uit.

De Fugle, jeg hørte, sang alle paa denne Maade, og jeg havde god Lejlighed til at høre dem, idet de i Juni Maaned næsten synger uafbrudt. Iøvrigt meddeler Konservator H. MADSEN mig, at de faa Bogfinker paa den nærliggende Christi-

ansø ikke synger paa denne Maade, men som Bogfinkerne i det øvrige Danmark.

Foruden de bornholmske Gulspurve har saaledes ogsaa de bornholmske Bogfinker en Dialekt, der afviger, omend ikke meget saa dog noget, fra Bogfinkesangen i det øvrige Land. Noget andet er, at en eller flere Bogfinker visse Steder kan synge paa en lidt afvigende Maade, f. Eks. hørte jeg i en Egn i Smaaland, at en stor Del af Bogfinkerne havde Dobbeltslag.

HOLGER POULSEN

## ANMELDELSER

F. GROEBBELS, H. KIRCHNER og F. MOEBERT: Ornithologische Hilfstabellen. Verlag Hans Broermann, Berlin 1938. Pris 1.50 RM. — — I tabellarisk Form gives en Række Oplysninger om Yngleforholdene hos samtlige i Tyskland ynglende Fugle samt om Arter, der forekommer regelmæssigt paa Gennemtræk eller som Vintergæster. For hver Art faar man Oplysning om den findes ynglende, paa Gennemrejse eller som Vintergæst samt om Legemsvægten. Endvidere anføres Antal Æg i Kullet, Vægten af frisklagt Æg samt Længde og Brede af Ægget. Om Yngleforholdene oplyses, hvor vidt Han eller Hun (eller begge Køn) ruger, Antal Dage mellem hvert Ægs Lægning, Tidspunktet, hvor Rugningen paabegyndes, Rugetidens Varighed samt Tiden indtil Ungerne er flyvedygtige. Det lille Hefte giver en særdeles brugbar Oversigt over de nævnte Forhold.

P. JESPERSEN.

FRIEDRICH STEINBACHER: Die Vögel der paläarktischen Fauna. Systematische Übersicht der in Europa, Nord-Asien und der Mittelmeerregion vorkommenden Vögel von Dr. ERNST HARTERT. Ergänzungsband, in Gemeinschaft mit Dr. FRIEDRICH STEINBACHER bearbeitet, nebst Geleitwort von Prof. Dr. E. STRESEMANN und 2 Bildnissen; Heft 6—7. R. Friedländer & Sohn, Berlin 1938. Pris: RM 10,00. — — Dette for Studiet af den palæarktiske Fuglefauna glimrende og saa værdifulde Værk (sml. Anmeldelse i D. O. F. T., 1937, p. 51) afsluttes med denne Levering, der omhandler nogle af Vadefuglene og endvidere: Maagefugle, Alkefugle, Tranefugle, Vandhøns, Hønsfugle, Struds. Fremdeles findes et særdeles nyttigt Index paa 55 Sider, udarbejdet af Dr. JOACHIM STEINBACHER.

Heftet ledsages yderligere af Billeder af HARTERT og FR. STEINBACHER, og i Forordet, dateret April 1938, skitserer STRESEMANN kort Træk af Bogens Tilblivelse og dens 2 Forfattere, hvoraf ingen skulde opleve Udgivelsens Afslutning. HARTERT døde 74 Aar gammel 1933 (sml. D. O. F. T., 1934, p. 34—37), og herefter fortsatte STEINBACHER Arbejdet paa egen Haand; han afsluttede det i November 1937. Paa