

Skindenes Maal var følgende:

	Næblængde mm	Vingelængde mm	Mellemfod mm
1 <i>Larus f. graellsii</i> ♂ ad. .	58,4	413	66,1
1 <i>Larus f. graellsii</i> ♀ ad. .	51,0	400	60,5
6 <i>Larus f. intermedius</i> ♂♂	54,3—57,8	403—430	64,8—67,2
2 <i>Larus f. intermedius</i> ♀♀	54,2—54,3	402—404	60,5—66,5
2 <i>Larus f. fuscus</i> ♀♀	50,0—53,4	393—405	56,5—63,7

Hos alle Skindene var Mellemfoden fra 6 til 10 mm længere end Mellemtaaen med Klo, saaledes som ejendommeligt for Sildemaagen.

Angaaende Sildemaagens biologiske Forhold paa Øen skal blot anføres, at den rugede spredt mellem Sølvmaagerne, og Størstedelen af »Ørkenen«, men den syntes flere Steder ligesom at samle sig i spredte Kolonier og valgte da særlig at lægge Reden midt i de lave, forkrøblede Pilekrat. Reden var gerne kantet med en Del afrevne Græstotter o. l. Da vi besøgte Anholt, var Ungerne baade hos Sølv- og Sildemaagerne ved at komme ud af Æggene; dette sene Tidspunkt skyldes sikkert, at Ægindsamlingen, som tilladt efter Jagtloven, var drevet til den 25. Maj.

Det vilde være ønskeligt, om denne smukke Sildemaagekoloni kunde blive fredet sammen med den efter vore Forhold saa højst ejendommelige »Ørken«.

ANMELDELSE

WILHELM H. J. GÖTZ und ALOIS KOSCH: Was fliegt denn da? Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart, 1936. Pris: 3 RM (indb. 4 RM). — — Denne Bog med 291 Farvebilleder og 36 Tegninger af Fugle, til Dels Flugtbilleder, har det særlige Formaal at hjælpe Iagttageren med hurtigt at bestemme Fuglene ude i Naturen. Opgaven er lidt svær at løse, og man kan da heller ikke forvente, at saa billig en Bog som den foreliggende skal være fuldt tilfredsstillende. Imidlertid vil den særlig for Begynderen være en Hjælp. Bogen findes i D. O. F.'s Bibliotek.

HARRY MADSEN.