

IAGTTAGELSER ANGAAENDE FUGLELIVET VED HASLEV I AARENE 1930—1934

AF

EGIL HORNEMAN

Siden HELMS¹ for over 25 Aar siden studerede Fuglelivet i Hasleveggen, er der ikke kommet meget nyt til, men Forandringer er der jo sket, og selvom visse Fuglearter viser glædelig Fremgang, er dog en hel Række Fugle nu forsvundet, eller de viser sig blot en Gang imellem som tilfældige Gæster.

Optegnelserne er i Hovedsagen egne Iagttagelser, eller de stammer fra den unge Ornitholog VILLY NIELSEN, Nielstrup, som jeg skylder Tak for gode og paalidelige Oplysninger. — Ved Sammenligning af HELMS's Iagttagelser i 14 Aar fra 1894 til 1908 og VILLY NIELSEN's og mine Iagttagelser i 5 Aar fra 1930 til 1934 kan følgende af de vigtigste Forandringer nævnes:

Vinterfugle.

Troldand: Før indtil 300 Stkr., nu ca. 2000 Stkr.

Taffeland: Før indtil 400 Stkr., nu ca. 2500 Stkr.

Blaa Kærhøg: Før ikke bemærket, nu aarlig paa Træk.

Konge- og Havørn: Før næsten hvert Aar, nu med flere Aars Mellemrum.

Korsnæb: Før ikke bemærket, nu ret almindelige Vinter og Foraar.

Tilfældige Gæster.²

Lille Skallesluger: Før bemærket en enkelt Gang, ikke 1930—34.

¹ O. HELMS: Iagttagelser af Fugle i Hasleveggen 1894—1908. D. O. F. T., X, 1915, p. 1—72. [Overlæge HELMS var praktiserende Læge i Haslev fra 1894 til 1908.]

² Paa dette lille Omraade kan man dog ikke tillægge Forholdene nogen afgørende Betydning.

- Ederfugl: Før ikke bemærket, nu bemærket 2 Gange.
 Rørdrum: Før ikke bemærket, nu 1 Gang (1933).
 Fiskeørn: Før flere Gange, nu kun med Aars Mellemrum.
 Almindelig Præstekrave, Strandhjejle, Smaaspove,
 Sortklire og Hvidklire: Alle forhen set faa Gange, men
 ikke bemærket 1930—34.
 Ryle: Hørtes før almindeligt paa Træk, nu ikke bemærket(?).
 Svaleklire og Smaabekkasin: Nævnes af HELMS kun som
 tilfældige, men ses nu aarlig ret talrigt.
 Hedelærke, Bjerglærke, Toplærke, Snespurv, Nødde-
 krige og Ravn: Omtales fra Aarene lige før 1900, alle
 med Enkeltforekomster eller faa Stykker; ikke bemærkede
 1930—34.

Ynglefugle.

- Skeand: Før ikke bemærket, nu faatallig Ynglefugl.
 Taffeland: Før væsentligst Vinterfugl, nu ret almindelig som
 ynglende.
 Engsnarre: Før ikke bemærket, nu sparsom Ynglefugl(?) og
 bemærket paa Træk.
 Rødben: Før sjælden paa Træk, nu undertiden Ynglefugl og
 ret almindelig paa Træk.
 Hættemaage: Før almindelig, men ikke som ynglende, nu
 ret almindelig Ynglefugl (2 Kolonier).
 Stormmaage: Før almindelig om Sommeren, dog ikke i Maj,
 nu almindelig hele Sommeren og et enkelt Par med Rede
 i 1934.
 Sortterne: Før bemærket 1 Gang (26. Maj 1905), nu var den
 blevet Ynglefugl flere Steder før og indtil 1932.
 Stork: Før 4 Par i Haslevomraadet, nu kun 1 Par.
 Glente: Før Ynglefugl et enkelt Sted og sjælden paa Træk,
 nu forsvundet.
 Slørugle: Før ikke bemærket, nu Ynglefugl enkelte Steder.
 Vendehals: Ynglefugl omkring 1894 og ikke sjælden paa
 Træk, nu ikke bemærket.
 Rødrygget Tornskade: Før almindelig Ynglefugl, nu spar-
 som Ynglefugl.
 Broget Fluesnapper: Indtil 1900 ret almindelig Ynglefugl
 og derefter sparsom, nu ret almindelig Ynglefugl og til-
 tagende.

Digesmutte: Før almindelig Ynglefugl, nu ikke saa talrig mere.

Rødstjert: Før sjælden Ynglefugl, nu tiltagende som saadan.

Husrødstjert: En syngende ♂ bemærket af HELMS¹ i Juni 1904, hvilket dog ikke er nævnt i Beretningen fra 1915. Ikke bemærket nu.

Rørsanger og Sivsanger: Før var Rørsangeren almindeligere end Sivsangeren, nu er Forholdene omvendte.

Fuglekonge: Før ikke bemærket som Ynglefugl, men almindelig paa Træk, nu sparsom som Ynglefugl og meget almindelig paa Træk.

Kærnebid'er: Før bemærket i Yngletiden, nu tiltagende som Ynglefugl og vist ikke sjælden.

Dompap: Før almindelig Vintergæst; stadig almindelig Vintergæst, men nu tillige Ynglefugl, 1934 2 Par.

Krikand, *Anas c. crecca* L. — Yngler sikkert af og til ved Haslev, idet jeg 26. Juni 1932 saa 6 Stkr. i Sofiendals Mose. Skudt ved Aversi 17. September 1933. 6 Stkr. saas i Søtorup Sø 24. September 1933.

Atling, *Anas querquedula* L. — Sikker Underretning om dens Yngleforhold mangler. Den skydes af og til paa Træk ved Bregentved.

Pibeand, *Anas penelops* L. — Høres almindeligt paa Træk For- og Efteraar. Yngler sikkert ikke. 12. Maj 1934 saas et Par i Nielstrup Sø.

Spidsand, *Anas a. acuta* L. — Optræder sikkert i Haslev-egnen paa Træk af og til. Jeg har aldrig selv bemærket den, men Gdr. HANS NIELSEN, Ulse-Olstrup, har et udstoppet Eksemplar, som han har skudt for Aar tilbage.

Stokand, *Anas p. platyrhyncha* L. — Almindelig Ynglefugl i alle Søerne; de er sikkert Efterkommere af halvvilde Stokænder, som i sin Tid fandtes paa Bregentved og Gisselfeld. Om Vinteren forøges Mængden, og Stokænderne ses i store

¹ HERLUF WINGE: Fuglene ved danske Fyr i 1904. 22de Aarsberetning om danske Fugle. Usædvanlige Tildragelser i 1904. Vidensk. Medd. naturh. Foren., 1905, p. 222. — WEIBÜLL (Om Sort Rødstjert (*Ruticilla titys*) i Danmark. D. O. F. T., II, 1907—1908, p. 106) angiver ganske vist 1906 som Jagttagelsesaaret, men han anfører dog samtidig Kilden (WINGE, »1904«).

Flokke sammen med Troldænder og Taffelænder, saaledes saas f. Eks. 25. December 1931 ca. 2500 Ænder i Ulse Sø og kun ca. 200 Ænder i Søtorup Sø (700 Stokand, 800 Taffeland og 1200 Troldand). 3. December 1932 saas ca. 3500 Ænder i Søtorup Sø (800 Stokand, 1200 Troldand og 1500 Taffeland) og ca. 4000 Ænder i Ulse Sø, hvoraf de fleste var Troldand og Taffeland. Samme Dato iagttoges ca. 200 Ænder i Ejlemade Sø (150 Stokand og 50 Taffeland).

Skeand, *Spatula clypeata* (L.) — Sparsom Ynglefugl. Dens Rede er fundet ved Nielstrup Sø 15. Maj 1932. Ligeledes bemærket i 1933, og 5. Maj 1934 saas ♂ og ♀ i Nielstrup Sø.

Sangsvane, *Cygnus c. cygnus* (L.) — Ses som Trækfugl af og til over Eggen, f. Eks. 28. Oktober 1932 ca. 30 Stkr. over Nielstrup, og 31. Januar 1933 12 Stkr. over Bregentved.

Knopsvane, *Cygnus olor* (Gm.) — Jeg tror ikke, Knopsvanen forekommer som vild, men foruden de tamme yngler nogle halvvilde Par i nogle af Smaasøerne i Skovene, hvorfor man af og til ser dem flyve til Ulse og Søtorup Sø. En ung Knopsvane mærket ved Gisselfeld er skudt i Frankrig ca. 1933.

Troldand, *Nyroca fuligula* (L.) — Yngler i flere af Søerne, f. Eks. enkelt Par i Ejlemade Sø, samt i Søen ved Frerslev Kirke. Flere Par i andre af Søerne (1934). I 1933 ynglede vistnok 3 eller 4 Par i Sofiendals Mose. Som Trækfugl og Vintergæst findes den i mægtige Flokke [se under Stokand].

Taffeland, *Nyroca ferina* (L.) — Yngler ligesom Troldanden i flere af Søerne, men blot i større Antal. Saaledes saas Arten 15. Maj 1933 i Nielstrup Sø. Ællingerne kom frem 28. Maj 1933. I Ejlemade Sø var 1933 kun enkelte Par, i 1934 flere. Ællingeantallet var 1934 hos flere Par meget lavt (1, 1, 2, 3). 14. Juli 1934 kom 3 store Ællinger uden ♀ gaaende ind paa en Gaard ved Ulse-Olstrup. [Som Trækfugl og Vintergæst se under Stokand.]

Havlit, *Clangula hyemalis* (L.), og Sortand, *Oidemia n. nigra* (L.) — Jeg har aldrig set disse Arter ved Haslev, men ofte hørt dem paa Træk specielt om Foraaret, samtidig med at man kunde høre Storspøver og Pibeænder. Særlig trak Sortanden visse Aftener i stor Mængde over den oplyste By.

Ederfugl, *Somateria m. mollissima* (L.) — At Ederfuglen undertiden kan komme ind over Haslev, har jeg faaet

2 Eksempler paa, idet en gammel ♀ 4. April 1934 faldt ned i Haslev om Natten, muligvis ved at flyve imod elektriske Ledninger. Den blev bragt mig i levende Tilstand. Endvidere ved at finde forraadnede Rester af en ung ♂ ved Taarnhusene (Gisselfeld) 13. Juli 1934.

Hvinand, *Bucephala c. clangula* (L.) — Temmelig almindelig Vintergæst i Søtorup og Brede Sø (Gisselfeld Have); saaledes iagttoges 22. Oktober til 3. December 1933 2 til 4 Stkr. i Brede Sø. Fra 1. Januar (Brede Sø islagt) til 25. Marts 1934 saas en lille Flok i Søtorup Sø (11. Februar 15 Stkr.).

Stor Skallesluger, *Mergus m. merganser* L. — Som Ynglefugl findes den Store Skallesluger ikke ved Haslev (det nærmeste Sted er ved Faxe Bugt). Optræder som Vintergæst, men sparsomt; f. Eks. saas 2 Par i Søtorup Sø 11. Februar 1934, samt ♂ og ♀ i Ulse Sø 18. Februar 1934.

Toppet Skallesluger, *Mergus serrator* L. — Sjælden Gæst i Søerne. Jeg har set enkelte i Søtorup Sø, og 25. April 1934 fik jeg en gammel ♂, som laa død i en Grøft ved Bregentved.

Graagaas, *Anser a. anser* (L.), og Sædgaas, *Anser f. fabalis* (LATH.) — Baade For- og Efteraar trækker større eller mindre Flokke af Gæs over Haslevvegnen, og undertiden overnatter de i Søerne. Saaledes saas 18 Sædgæs i Oktober 1932, 10. Oktober 1932 25 Gæs (S), 20. September 1933 ca. 300 (SV), 5. Oktober 1933 15 (S), 18. November 1933 75 Stkr. (N).

Knortegaas, *Branta bernicla* (L.) — Undertiden ses Flokke paa Træk, f. Eks. 19. Maj 1933 en mindre Flok trækkende over Nielstrup (VILLY NIELSEN).

Vagtel, *Coturnix c. coturnix* (L.) — Ca. 16. Maj 1918 hørtes den uden for Haslev (H. LANGE).

Agerhøne, *Perdix p. perdix* (L.) — Almindelig Ynglefugl ved Haslev, men spredt. Jeg antager, at Antallet er gaet tilbage i de forløbne 40 Aar.

Dværglappedykker, *Podiceps r. ruficollis* (PALL.) — Yngler i Søerne, men ikke regelmæssigt. Ved Nielstrup Sø ynglede 1931 2 Par; 6. Maj fandtes 1 Rede med 6 Æg. 1932 fandtes 1 Rede. 1933 bemærkedes Arten ikke. 4 Unger samt ♂ og ♀ saas i Hesede Skovsø 28. Juli 1934.

Rødhalset Lappedykker, *Podiceps g. griseigena* (BODD.),

og Toppet Lappedykker, *Podiceps c. cristatus* (L.) — Begge Arterne er almindelige Ynglefugle, den Rødhalsede Lappedykker almindeligst, idet den findes i praktisk talt alle større og mindre Søer, Toppet Lappedykker særlig i Ulse og Søtorup Sø, f. Eks. 6 Par Rødhalsede Lappedykkere i Nielstrup Sø 1934, og ca. 7 Par Toppede Lappedykkere i Søtorup Sø 1933. Aarsagen til at man ser saa faa Unger af denne Art, er vanskelig at forstaa, men skyldes vistnok ikke systematisk Indsamling af Æggene, forøvrigt ses som Regel kun enkelte Unger hos den Toppede Lappedykker (Damhus Sø, Lyngby Sø, Viborg Søer og flere Steder meddeler H. LANGE).

Engsnarre, *Crex crex* (L.) — Maaske ikke saa sjælden paa Træk. ♂ blev skudt ved Haslev 24. Oktober 1933. I Yngletiden har jeg hørt den i en Hundegræsmark ved Søtorup 1932. Ligeledes er den bemærket i Yngletiden 1934 (29. Juni i en Kornmark ved Edelsminde).

Plettet Rørvagtel, *Porzana porzana* (L.) — Yngler muligvis ved Haslev; den er vist temmelig sjælden paa Træk. Arten saas ved Ulse Sø 23. April 1933 og ved Søtorup Fiskebro 19. Oktober 1933 (VILLY NIELSEN).

Vandrikse, *Rallus a. aquaticus* L. — Yngler muligvis; den er vist temmelig sjælden paa Træk. Arten saas i Efteraaret 1930 ved Søtorup Sø. Et enkelt Eksempel er skudt ved Haslev (A. VALENTINER).

Rørhøne, *Gallinula c. chloropus* (L.) — Almindelig Ynglefugl i mange af Søerne og i de fleste Mosehuller, men Antallet naar langt fra Blishønens, selvom man tager Hensyn til Rørhønens mere ubemærkede Tilværelse. Træffes undertiden hele Aaret, f. Eks. løb en ung ♀ i Jernbanegade 5. December 1933. I en Grøft ved Sofiendal saas et Eksempel 9. Februar 1933.

Blishøne, *Fulica a. atra* L. — Meget almindelig Ynglefugl i alle Søerne, ogsaa Ulse og Søtorup Sø, hvor der aarlig yngler adskillige Par. Antallet af Blishøns i Hasleveggen er vel paa Grund af Efterstræbelserne næppe saa stort som for 25 Aar siden.

Trane, *Megalornis g. grus* (L.) — Tilfældig Gæst. Fra 20. Juni 1933 og i ca. 2 Maaneder opholdt 3 gamle Traner sig paa Henriettelunds Enge og lavtliggende Marker, hvor de bestandig var i Færd med at pille. I Begyndelsen var de sky, men

blev senere ret tillidsfulde og viste bl. a. Tranedans: De hoppede omkring med slæbende Vinger og svajende Halse, idet de udstødte Skrig. Da den ene blev skudt, forsvandt de andre (FR. KLESTRUP HANSEN).

Nordlig Hjejle, *Charadrius a. apricarius* (L.) — Jeg har ikke selv set Hjejlen, men i Efteraaret 1932 blev 2 Stkr. skudt af en Flok paa 10 2 km Nord for Haslev (Bestyrer DANIELSEN).

Vibe, *Vanellus vanellus* (L.) — Meget almindelig Ynglefugl overalt. Ankomster: 1932 6. Marts, 1933 9. Marts, 1934 23. Februar. 3. September 1932 har jeg set store Flokke (300 Stkr. Øst for Haslev). 1932 iagttages en mindre Flok uden for Haslev saa sent som 7. November.

Storspove, *Numenius a. arquata* (L.) — Meget almindelig paa Træk saavel Foraar som Eftersommer. Nogle Aftener kunde man høre den ene Flok efter den anden, samtidig med at andre Trækfugle trak over Byen.

Mudderklire, *Actitis hypoleuca* (L.) — Iagttages hver Sommer paa Træk flere Steder ved Søerne, som Regel enkeltvis, men ogsaa 2—3 Stkr. sammen f. Eks. i første Halvdel af Maj (11. Maj 1934 i Ulse Sø) og om Eftersommeren i Juli—August (11. Juli og 1. August 1932 sammen med Svaleklirer ved Bregentved Slotsgrav).

Svaleklire, *Tringa ochropus* L. — Ligesom HELMS for 26 Aar siden, har jeg set den ved Bækken i Haslev Orned (21. April 1932), men desuden ved Sotorup Sø og ved Sofiendals Mosesø flere Gange, det sidste Sted 4. Juli 1932, og jeg har hørt den paa Træk over Haslev 29. Juli 1932. 6 Stkr. saas ved Nielstrup Sø 5. Juli 1934.

Tinksmid, *Tringa glareola* L. — Jeg har med Sikkerhed kun set den en Gang ved Sofiendals Mose (28. Juni 1932), men antager dog ikke den er nogen tilfældig Gæst paa Træk, idet jeg af og til har set den andre Steder paa Sjælland (Nord for Præstø og ved Skelskør).

Rødben, *Tringa t. totanus* (L.) — Et enkelt Par yngler sikkert en Gang imellem ved Søerne (Sofiendals Mose og Nielstrup Sø). 28. April 1932 iagttoges et ængsteligt Par ved Mosen. Ligeledes er Arten iagttaget ved Nielstrup Sø hvert Aar, men sikkert ikke ynglende.

Smaabekkasin, *Limnocyptes minimus* (BRÜNN.) — Ret

talrig paa Efteraarstræk f. Eks. ved Nielstrup Sø 14. til 30. Oktober indtil 5 Eksemplarer. 16. November 1932 iagttoges 3, og 4. December samme Aar 4 ved Nielstrup. 22. December 1932 kom en Kat med en, fanget ved Nielstrup Sø.

Horsegøg, *Capella g. gallinago* (L.) — Ikke sjælden som Ynglefugl, f. Eks. fandtes 2 Reder ved Nielstrup Sø 13. Maj 1933. Ved Sofiendals Mose saas 16 Stkr. 28. Juni 1932 (Reder fandtes ikke). Paa Træk var Arten talrig ved disse Søer i Oktober 1931 og 1932 (10—30 Stkr.). 19. Juli 1933 iagttoges 2 ved Søtorup.

Skovsneppe, *Scolopax r. rusticola* L. — Yngler sikkert ikke, men er i Reglen almindelig paa Træk.

Hættemaage, *Larus r. ridibundus* L. — Er i de senere Aar blevet Ynglefugl i Nielstrup Sø. 1932 var der 4 Par, 1933 20 Par og 1934 ca. 30 Par. Ligeledes ynglede nogle Par i Sofiendals Mosesø 1932 og muligvis 1 eller 2 Par i de sidste 2 Aar. Iøvrigt ses Hættemaagen fra Marts til hen paa Efteraaret i større eller mindre Mængde, undertiden sammen med Stormmaagerne.

Stormmaage, *Larus c. canus* L. — Stormmaagen ser man ret ofte paa Markerne den største Del af Aaret. Ofte ser man den enkeltvis eller i Flokke paa 5—6 Stkr. overalt og undertiden sammen med Hættemaagerne. Om Foraaret og især om Efteraaret ses ofte store Flokke. Et enestaaende Tilfælde indtraf i Aar, idet den byggede Rede paa en tør Roemark ved Nielstrup, hvor VILLY NIELSEN og jeg saa dens Rede med 3 Æg 1. Juni 1934.

Dværgterne, *Sterna a. albifrons* PALL. — Et Par saas ved Søtorup Sø i Juli 1932.

Fjordterne, *Sterna h. hirundo* L. — Yngler ikke, men enkelte Par eller Smaaflokke op til 7—8 Stkr. ses ret jævnlig ved Søerne om Sommeren.

Sortterne, *Chlidonias n. nigra* (L.) — I de senere Aar var Sortternen blevet Ynglefugl ved Søerne, men efter 1932 synes den at være forsvundet igen. I Nielstrup Sø fandtes 2 Reder med Æg 10. Juli 1932. Ligeledes iagttoges 1 eller 2 Par i Sofiendals Mose, Søtorup og Ulse Sø. 5. Juni 1932 fordrev en Sortterne en Fjordterne fra Søtorup Sø.

Ringdue, *Columba p. palumbus* L. — Almindelig Yngle-

fugl overalt i Skovene. Foruden i Gran, hvor Reden findes almindeligst, er Reden fundet i Skovfyr, Birk (i en Heksekost), Eg, Ask, El, Tjørn, Bøg. Paa Træk er den meget almindelig, ofte Flokke paa indtil 100 Stkr.

Huldue, *Columba o. oenas* L. — Enkelte Par yngler i Skovene f. Eks. i Aastrup Skov, hvor Hulduer iagttages 15. Maj 1932 (Rede med 2 Æg). Paa Træk er Arten undertiden talrig f. Eks. ved Louisenlund 12. Oktober 1932.

Stork, *Ciconia c. ciconia* (L.) — Yngler kun paa Hesede Avlsgaard. 1932 var der 4 Unger, 1933 1 Unge. Beboede Reder udenfor Haslevomraadet findes paa Broksø (12 km borte) og paa Lystrup (14 km borte). Ny Rede kom 1934 paa en Gaard mellem Rønnede og Faxe. 7 flyvende Storke saas over Nielstrup 16. Juli 1934.

Fiskehejre, *Ardea c. cinerea* L. — Yngler ikke ved Haslev, men kommer ofte enkeltvis, sjældnere 3—4 Stkr. sammen, ind til Søerne, særlig hen paa Sommeren, f. Eks. ved Ejlemade Sø 28. April og 1. Juli 1933. 4 Stkr. saas ved Frerslev 29. Oktober 1933. — Fiskeren paa Bregentved efterstræber Hejren stærkt, f. Eks. blev 15 skudt ved Søerne 1931, heraf kun 1 gammel Fugl.

Rørdrum, *Botaurus s. stellaris* (L.) — Tilfældig Gæst. I 8 Dage af Maj 1933 opholdt en Rørdrum sig ved Susaaen, hvor denne løber gennem ved Henriettelund (FR. KLESTRUP HANSEN).

Taarnfalk, *Falco t. tinnunculus* L. — Enkelte Par forsøger at yngle hist og her i Skovene, men som Regel bliver de skudt, fordi Jagtvæsenet ikke taaler Rovfugle paa Distrikterne, f. Eks. blev en gammel Fugl skudt paa Reden ved Bregentved 1932; ligeledes er en skudt paa Reden i Grevindeskoven. 29. April og 12. Maj 1934 saas Arten over Haslev Orned og Ulse. Paa Træk ses den ret hyppigt, undertiden ogsaa overvintrende, saaledes iagttoges den 10. December 1933 og 21. Januar 1934.

Dværgfalk, *Falco columbarius aesalon* TUNST. — Ikke sjælden som Efteraars- og Vintergæst, f. Eks. 26. December 1931 (Troelstrup), 3. November 1932 (Louisenlund), 23. September 1932 (Hesede), 26. November 1933 (Gisselfeld).

Lærkefalk, *Falco s. subbuteo* L. — Det er ikke usand-

synligt, at et enkelt Par yngler her paa Egnen, idet Arten undertiden træffes i Yngletiden, saaledes 9. Maj 1934 (Aastrup Skov), 16. April 1934 (Nielstrup), 23. Juli 1934 (Hesede Skov). Paa Træk er den ikke saa hyppig som Dværgfalk. 9. Oktober 1932 (over Haslev efter Stære), 12. Oktober 1932 (Louisenlund) og 2 Stkr. 12 km Vest for Haslev 26. Oktober 1931.

Vandrefalk, *Falco p. peregrinus* TUNST. — Ses af og til paa Træk, saaledes 5. November 1931 over Haslev (NV); ca. 7. November 1932 blev en gammel ♀ skudt ved Henriette-lund; en gammel ♂ blev skudt 2 km Nord for Haslev i Februar 1932.

Musevaage, *Buteo b. buteo* (L.) — Ligesom for 30 Aar siden findes Musevaagen kun sjældent som Ynglefugl, nemlig naar Reden tilfældigvis undgaar Jægerens Opdagelse; dog yngler den hvert Aar i Aastrup Skov, ogsaa 1934. — — Gik man en Tur i Begyndelsen af Maj 1934 ind i f. Eks. Bregnemade Skov, kunde man i Løbet af 7 Min. se eller bemærke ca. 60 Mus. Mærkeligt at Jagtvæsenet og Forstvæsenet ikke kan komme til en Forstaaelse med hinanden, saaledes at denne systematiske Udryddelse af alt Rovvildt (tildels Ugler indbefattet) kan undgaas. Ved Maveundersøgelser af indleverede Musevaager, Vintermusevaager, Natugler og Skovhornugler i 1933—34 har jeg kun fundet Mus og hos en enkelt Natugle 2 Spurve. [Alm. Musevaage, død af Gift, Tureby 3. April 1934, Maveindhold Mus. Vintermusevaage, 14. November 1933, Vægt 1333 g, Maveindhold Markmus. Natugle, 3. Januar 1934, Vægt 453 g, Maveindhold 3 Mus.] Paa Træk ses Musevaagen hyppigere, men ogsaa da maa mange bøde med Livet. 22. Oktober 1933 iagttoges 14 Stkr. over Ulse (SV), 15. April 1934 21 Stkr. i Løbet af $\frac{1}{2}$ Time over Rønnede (N).

Vintermusevaage, *Buteo l. lagopus* (BRÜNN.) — Ses hvert Aar paa Træk, som Regel enkeltvis og sjældnere end den Almindelige Musevaage, saaledes f. Eks. i 1933: 22. Oktober 1 ved Ulse Sø, 29. Oktober 5 ved Grænge Sø, 3. November 1 ved Ulse, 26. November 1 ved Gisselfeld og 3. December 2 ved Sotorup.

Kongeørn, *Aquila c. chrysaetos* (L.), og Havørn, *Haliaeetus a. albicilla* (L.) — Jeg har intet hørt eller set til disse Ørnearter her paa Egnen. Distriktsjægeren har 2 Kongeørne udstoppede,

hvoraf den ene er skudt ved Bregentved 1923. Baade Havørn og Kongeørn er dræbt paa Lystrup ca. 1929 (A. VALENTINER).

Hvepsevaage, *Pernis a. apivorus* (L.) — Yngler vist nok af og til hist og her i Skovene. I Hesede Skov blev fundet en gammel Rede helt beklædt med vissent Bøgeløv. I Grevindeskoven, hvor de gamle blev skudt for nogle Aar siden, fredes den nu i Yngletiden. Arten ses hvert Aar paa Træk, f. Eks.: 15. September 1932 30 Stkr. over Rode, 16. September 1933 7 Stkr. over Ulse og 18. September 1933 39 Stkr. over Ulse (i Løbet af $\frac{1}{2}$ Time).

Rørhøg, *Circus a. aeruginosus* (L.) — Ses sparsomt paa Træk, f. Eks. 28. August 1933 og 26. Juli 1934 over Nielstrup Sø.

Blaa Kærhøg, *Circus c. cyaneus* (L.) — Ses hvert Aar paa Træk ved Nielstrup Sø og ud over Markerne, i Reglen er det unge Fugle, og de opholder sig 1 eller 3 samtidig paa Eggen, f. Eks. saas næsten daglig fra 11. Oktober til 4. November 1932 en ved Nielstrup Sø. Fra 18. September til 11. November 1933 saas 1 eller 2 Stkr. ved Nielstrup Sø eller Ejlemade Sø, og 21. Januar 1934 saas 3 Stkr. ved Nielstrup Sø.

Spurvehøg, *Accipiter n. nisus* (L.) — Sparsom Ynglefugl p. Gr. af Efterstræbelserne. I Aastrup Skov fandtes 1931 Rede med Æg. Paa Træk er den hyppig og ses ofte hele Vinteren.

Duehøg, *Astur gentilis dubius* SPARRMAN. — Yngler ikke, men kommer af og til paa Træk. ♂ er dræbt Juli 1932 i Haslev. 18. December 1932 saas 1 ved Nielstrup og 27. Februar 1934 1 ved Ulse. Vintergæsterne tilhører maaske den svenske Race, *Astur g. gentilis* L. (?).

Fiskeørn, *Pandion h. haliaetus* (L.) — Kommer en sjælden Gang til Eggen. Jeg har kun set den en Gang over Troelstrup Efteraaret 1930.

Perleugle, *Aegolius f. funereus* (L.) — Perleuglen har vist sig som en tilfældig Gæst paa Eggen i Oktober 1929.

Skovhornugle, *Asio o. otus* (L.) — Faatallig som Ynglefugl, 31. Maj 1934 fandtes 2 Unger paa Lystrup. Hvert Aar yngler 1 Par i Haslev Orned. Sparsom paa Træk.

Natugle, *Strix a. aluco* L. — Almindelig Ynglefugl i alle Skovene, dog er der stadig Jægere og Landmænd, som tror den gør Skade og dræber den trods Totalfredning. Ligeledes

omkommer nogle ved at flyve imod Telefon- og Højspændingsledninger.

Slørugle, *Tyto alba guttata* (Brehm) — Sparsom Ynglefugl. Enkelte Par forekommer i Lader, bl. a. hvert Aar paa en Gaard ved Ulse-Olstrup. 1933 fandtes 4 Æg 12. April. 1934 var der 6 Unger; hvert Aar yngler Arten i Laden paa Sofiendal Avlsgaard (1934 var der 3 Unger).

Natravn, *Caprimulgus e. europaeus* L. — 21. August 1933 fløj en ung ♂ mod Vindspejlet paa en Bil Nord for Haslev. Totalvægt 78 g, Maveindhold 13,6 g, bestaaende af 63 Nat-sommerfugle (5 store som Smutugle, 40 mellemstore som Møl-kællinger (Ugler) og Resten store Møl).

Mursejler, *Apus a. apus* (L.) — Nogle faa Par yngler i Haslev By 3 Steder, nemlig i den gamle 2 Etages Bygning ved Kirken og under Taget paa et Hus overfor Kommuneskolen. 1934 fandtes endvidere 1 eller 2 Par under Taget paa Missionshotellet. I Ulse og Testrup Kirker findes eet eller to Par; maaske forekommer Arten ogsaa i andre Kirker.

Ellekrage, *Coracias g. garrulus* L. — Tilfældig Gæst paa Træk. En saas ved Haslev Orned 19. Maj 1933.

Isfugl, *Alcedo atthis ispida* L. — Hvert Efteraar ses Isfuglen ved Sotorup Sø, som Regel kun enkeltvis, men undertiden dog 2 Stkr. Ligeledes saas den ved Gisselfeld Fiskedamme 12. November 1933 og ved Bregentved, men ikke regelmæssigt. ♂ skudt ved Aversi 20. Marts 1933. I Sommeren 1933 er Isfuglen set ved Susaaen (Testrup), men om den yngler, mangler der foreløbig Bevis for.

Gøg, *Cuculus c. canorus* L. — Ret almindelig i Skovene og ved de fleste af Søerne, hvor den lægger Æg i Rørsangerens Reder.

Stor Flagspætte, *Dryobates major pinetorum* (Brehm) — Temmelig almindelig Ynglefugl flere Steder i Skovene; den optræder hyppigt som Strejffugl og ses da ofte inde i Haslevs Haver om Vinteren.

Skovskade, *Garrulus g. glandarius* (L.) — Ret almindelig Ynglefugl flere Steder i Skovene, men spredt paa Grund af Efterstræbelserne. Om Efteraaret og Vinteren er den talrig, ofte i Flokke paa 10—20 Stkr. De ynder at opholde sig under Egetræerne, hvor de æder Agern.

Skade, *Pica p. pica* (L.) — Ret almindelig Ynglefugl ved Nielstrup, Olstrup og Skoverup, og enkelte Par yngler eller forsøger paa at yngle af og til i Troelstrup, ved Hesede o. fl. Steder, men i hele Skovarealet Bregentved—Gisselfeld yngler den ikke og ses meget sjældent paa Grund af Efterstræbelserne. Hele Efteraaret og Vinteren ses den enkeltvis eller i Smaaflokke. Sjældent i større Flokke: 29. Januar 1932 saas 35 Stkr. ved Olstrup og 13. Oktober 1933 11 Stkr. ved Ulsegaard.

Allike, *Coloeus m. monedula* (L.) — Almindelig Ynglefugl i hule Træer (Gisselfeld Park, Kilderisskoven, Bregnemade o. fl. Steder) og meget talrig om Efteraaret og Vinteren, ofte sammen med Raager. Ca. 500 Stkr. saas ved Lysholm December 1932 til Januar 1933.

Raage, *Corvus f. frugilegus* L. — Der findes flere smaa og enkelte mellemstore Kolonier i Hasleveggen, men der skydes mange Unger, og enkelte af de smaa Kolonier flytter fra det ene Aar til det andet. Slettehavekolonien (ca. 25 Par) er flyttet 1934, antagelig til »Ellegaardsstübberne«, hvor der i Forvejen findes en betydelig Koloni, og nu fordelt i 3 Smaaskove (ca. 150 Par).

Krage, *Corvus corone cornix* L. — Adskillige Par yngler i Gavevænge, Grunderup, Tingerup og Svenderup Skove; men i Aastrup, Gl. Dyrehave, Hesede, Gisselfeld, Bregentved, Kilderis- og Ejlemadeskovene findes den aldrig. Først i Oktober til omkring 1. Februar ses Kragerne næsten daglig og nogle Dage talrigt trækkende over. 11. Oktober 1932 saas Træk over Haslev hele Dagen (SSV); 23. Oktober 1932 iagttoges 6 Stkr. paa Marken ved Nielstrup; 6. Februar 1932 var mange Krager paa Træk over Søtorup; 9. April 1933 fandtes Kragereder, bl. a. 1 lavt i Ahorn. 1933 saas de første Krager paa Træk 13. Oktober, og derefter nogle, undertiden mange, Aaret ud. 3. December 1933 saas Kragetræk over Søtorup (ca. 250 Stkr.).

Stær, *Sturnus v. vulgaris* L. — Meget almindelig Ynglefugl saavel i Byen som paa Landet, samt i hule Træer i Skoven. I Rørene i Grænge Sø har jeg anslaaet Antallet til ca. 10,000 Stkr. 21. Juni 1931.

Pirol, *Oriolus o. oriolus* (L.) — Tilfældig Gæst paa Træk. August 1931 saas en ved Gisselfeld.

Rødrygget Tørnskade, *Lanius c. collurio* L. — Ret

almindelig Ynglefugl, men spredt og ustadig. I Sammenligning med HÆLMS's Beretning for 30—40 Aar siden er den gaaet meget tilbage. Jeg har i 1932 fundet 3—4 Par ved Haslev (Sanatoriet, Frerslev, Nordskov) og 2 Par ved Hovedlande-vejen til Tureby. 1934 fandtes 3 Par ved Bregentved.

Stor Tornskade, *Lanius e. excubitor* L. — Paa Træk ses den Store Tornskade næsten hvert Aar i Hasleveggen, og undertiden overvintrer den. Set ved Gl. Apotek, Troelstrup og Vester Egede. Sidste Sted 17. December 1933. Endvidere blev en gammel ♂ skudt ved Terslev 17. Oktober 1932. Den ynder at sidde paa Højspændingsledningerne, der ofte gaar langs med tjørnebevoksede Grøftevolde, og undertiden er den set med en Mus i Klørerne.

Silkehale, *Bombycilla garrulus* (L.) — Næsten hver Vinter ses Silkehalerne, undertiden talrigt. 15. November 1931 saas 2 Stkr. bag Højskolerne, og 15. Januar 1933 saas 16 Stkr. i Haslev.

Broget Fluesnapper, *Ficedula h. hypoleuca* (Pall.) — Adskillige Steder i Højskoven i hule Træer og i Kasser yngler den; særlig talrig var den i 1934 (Hesede, Denderup Vænge, Ejlemade, Bregnemade og Nordskov), hvert Sted 2 eller 3 Par. Paa Træk er den almindelig og ses da undertiden i Haverne.

Graa Fluesnapper, *Muscicapa s. striata* (Pall.) — Ret almindelig Ynglefugl flere Steder i Skoven og i Parkerne, men dog noget spredt. Den opholder sig som Regel ikke paa de samme Steder som den ynglende Brogede Fluesnapper, men foretrækker Skovkanter og fritstaaende Træer.

Digesmutte, *Oenanthe o. oenanthe* (L.) — Træffes meget sparsomt, men yngler dog Nord for Haslev i Simmendrup-egnen, hvor jeg har set flere Par i Yngletiden 1931. Paa Træk er den hyppigere.

Bynkefugl, *Saxicola r. rubetra* (L.) — Yngler de fleste Steder, hvor der er passende Lokalteter, men særlig talrig forekommer denne smukke lille Fugl ikke.

Rødstjert, *Phoenicurus p. phoenicurus* (L.) — Nogle faa Par yngler hvert Aar i Hasleveggen, men spredt og ustadigt. 1931 iagttoges Arten i Aastrup Skov, 1932 ved Temstruphus, og 1934 ved Bregentved (2 Par), Kilderisskoven og i Aastrup Skov. Paa Træk er den almindelig. Efteraarstrækket begynder

i Slutningen af August (30. August 1933 fik jeg en ♂, Vægt 13,6 g [Sammenlign Vægt af Maveindhold af Natravn]).

Rødkjælk, *Erithacus r. rubecula* (L.) — Almindelig Ynglefugl overalt i Skovene og Parkerne, særlig hvor der er fugtig og mørk Underskov. I strenge Vintre har jeg haft Besøg af den og Gærdesmutteren i min Garage.

Nattergal, *Luscinia luscinia* (L.) — Almindelig Ynglefugl ligesom Rødkjælken og paa nogenlunde de samme Lokaliteter. Flere Par yngler ved Søtorup og Ejlemade Sø. Jeg har i Haslev hørt den synge i Sygehusets Have, og paa Sofiendalsvej findes den hvert Aar. I Troelstrup findes enkelte Par, og udenfor Haslevomraadet findes den i Mængde ved Broksø.

Misteldrossel, *Turdus v. viscivorus* L. — Maaske tilfældig Ynglefugl en Gang imellem, da jeg har set den 12. Juli 1932 ved Bregentved. Paa Træk er den bemærket en enkelt Gang, nemlig 12. November 1933 i Hesede Skov.

Vindrossel, *Turdus musicus* L. — Ret almindelig paa Træk, f. Eks. har jeg set ca. 20 Stkr. 15. November 1931, og i Slutningen af Oktober 1932 iagttoges mange større eller mindre Flokke ved Olstrup og Nielstrup. 29. Oktober 1933 saas ca. 150 Stkr. i Bregnemade Skov.

Sangdrossel, *Turdus p. philomelos* BREHM — Meget almindelig Ynglefugl i Skoven og i større Haver. Dens herlige Sang hører man overalt i Skovene.

Sjagger, *Turdus pilaris* L. — Almindelig paa Træk For- og Efteraar. Undertiden overvintrer den, saaledes saas 26. November 1933 ca. 200 ved Gisselfeld og ca. 25 ved Søtorup, og 3. December samme Aar saas ca. 70 ved Gisselfeld.

Solsort, *Turdus m. merula* L. — Meget almindelig Ynglefugl overalt i Egnen. I Haslev By synger den ofte paa Toppen af en Flagstang eller paa en Skorsten.

Gærdesanger, *Sylvia c. curruca* (L.) — Almindelig Ynglefugl i Haslevs Haver. Ligeledes findes den ret almindelig i Skovene. Den ankommer til Byen tidligt, nemlig i de sidste Dage af April samtidig med Løvsangeren (1 Uge eller 2 før de andre Sangfugle) og paa et Tidspunkt, hvor det i nogle Dage undertiden er vanskeligt for den at skjule sig, men selvfølgelig lægger man særlig Mærke til dens Klip-klap Sang.

Tornsanger, *Sylvia c. communis* LATH. — Tornsangeren

er almindeligere end Gærdesangeren, idet man træffer den overalt, ogsaa nogle faa Par i Byen. Er der Telefonledninger over dens Opholdssted, ynder den at sætte sig paa disse, hvorfra den, naar man nærmer sig, kan flyve næsten lodret ned i en Busk og lade sit skarpe »tjæk-tjæk« lyde.

Havesanger, *Sylvia borin* (BODD.) — Enkelte Par findes i Haslevs Haver, ligeledes i Levetoftte og Førsløv, men især er den almindelig i Skovene, hvor den yngler talrigt overalt.

Munk, *Sylvia a. atricapilla* (L.) — Almindelig Ynglefugl mange Steder i Skov og Krat, ligeledes i Parkerne, men ikke saa almindelig som Havesangeren.

Gulbug, *Hypolais icterina* (VIEILL.) — Ankommer til Haslev omkring den 12. Maj og yngler i nogle af Haverne i Byen, samt i Haver Nord og Vest for Byen, men især dog i Skovene og Parkerne. 1934 vist nok talrigere end 1933.

Kærsanger, *Acrocephalus palustris* (BECHST.) — Jeg træffer hvert Aar denne dygtige lille Sangfugl ynglende ved Frerslev Møllensø, Ulse Sø og ved Søen i Bregnemade Skov, men ogsaa undertiden i en Hæk ved Frerslev; alle Steder er der Brændenælder.

Rørsanger, *Acrocephalus s. scirpaceus* (HERM.) — Meget almindelig Ynglefugl overalt i Rørene ved Søerne (ogsaa Troelstrup Sø). Den ankommer til Hasleveggen noget senere end Sivsangeren og er nu langt fra saa talrig som denne. I Rørene ud for Kilderisskoven fandt jeg 15. Juni 1934 5 Reder med Æg (1, 2, 3, 4, 4). ♀ Gøgen var i Nærheden og vilde sikkert lægge Æg i Rørsangerens Rede, da den har gjort det tidligere Aar paa dette Sted. I Søtorup Sø, hvor Rørsangeren ligeledes er talrig, fandtes 1933 2 Reder med Gøgeunger.

Sivsanger, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.) — Meget almindelig Ynglefugl overalt ved Søkanterne, og ofte findes et eller to Par Sivsangere ved Vandhullerne (Levetoftte, Lysholm, Troelstrup o. fl. Steder), samt undertiden i Kornmarkerne (Louisenlund, Aversi), Gl. Apotheks Have 1934. Langs Ulse Sø paa et lille Stykke ved Kilderisskoven saa jeg 10. Juni 1934 4 Reder, 3 med 6 Æg i hver og 1 med 6 flyvefærdige Unger.

Græshoppesanger, *Locustella n. naevia* (BODD.) — »Den 25. Maj traf jeg Græshoppesangeren ved Lystrup. Terrænet, hvor den holdt til, var en tæt Bevoksning af unge Graner paa

den ene Side af en Bæk, medens der paa den modsatte Side var Ellebuske og rigeligt af Nælder og andre Planter. Sangen er meget mærkelig og ligner Græshoppens Lyd, men minder paa Afstand om en Mejemaskines Tikken. 13. og 24. Juni samme Aar saa og hørte jeg den det samme Sted og lagde især Mærke til dens slanke Bygning. Har antagelig ynglet, men er ikke bemærket senere«. (VILLY NIELSEN).

Skandinavisk Gransanger, *Phylloscopus collybita abietina* (NILSS.) — Bemærket faa Gange paa Foraarsstrækket f. Eks. 2. April 1933 i Denderup Vænge (4 Stkr.).

Løvsanger, *Phylloscopus trochilus fitis* (BECHST.) — Meget almindelig Ynglefugl overalt. Arten ankommer i de sidste Dage af April i stor Mængde. 22. April 1934 var den meget talrig i Hesede Skov, disse tilhører dog sikkert hovedsagelig Racen *P. t. acredula* (L.).

Skovsanger, *Phylloscopus s. sibilatrix* (BECHST.) — Flere Steder i Højskoven traf jeg den i Aarene før 1934, og dens Rede blev fundet i Svenderup Skov 23. Juli 1933 med 5 Unger, men i 1934 lykkedes det, trods ivrige Efterforskninger, kun at finde et enkelt Par i Aastrup Skov. 16. Juli saas 1 gammel Fugl madende 2 Unger. Jeg antager, og vist ikke med Urette, at Skovsangeren er flyttet bort p. Gr. af Musemængden i Skovbunden (se under Musevaage).

Fuglekonge, *Regulus r. regulus* L. — Sparsom Ynglefugl i Hasleveggen. Paa Træk Foraar, Efteraar og Vinter er den meget almindelig og træffes overalt, ogsaa i stor Mængde i Haverne.

Engpiber, *Anthus pratensis* (L.) — Ret almindelig Ynglefugl i Engene og ved Søerne, dog ikke talrig.

Skovpiber, *Anthus t. trivialis* (L.) — Almindelig Ynglefugl flere Steder i Skovene. Den træffes Aar efter Aar paa de samme Lokalteter.

Gul Vipstjert, *Motacilla f. flava* L. — Temmelig almindelig Ynglefugl, men spredt, f. Eks. ved Nielstrup Sø, Sofiendals Mose, Aversi, Tjæreby og flere Steder, men kun eet Par er iagttaget hvert Sted.

Hvid Vipstjert, *Motacilla a. alba* L. — Almindelig Ynglefugl, men spredt. I Haslev By yngler den hvert Aar ved Gadekæret, og mange Gaarde og Huse i Omegnen har et Par Vipstjerter.

Vandstær, *Cinclus c. cinclus* (L.) — Tilfældig Gæst og ikke bemærket de sidste Aar. I Oktober 1929 opholdt en Vandstær sig nogen Tid ved Klostersøen (Gissselfeld).

Brunelle, *Prunella m. modularis* (L.) — Ligesom Havesangeren er den almindelig Ynglefugl overalt i Skov, Krat og Parker, og særlig almindelig i smaa Granplantninger og Hække. Ligeledes findes enkelte Par i Haverne i Haslev. Paa Træk er den ofte meget almindelig f. Eks. i nogle Dage i Begyndelsen af Oktober 1931, da den fandtes i Haslev By i stor Mængde. Undertiden overvintrer den. Den 5. Oktober 1931 fandt jeg en død af Hønsetuberculose (*Typus avium* bestemt af Prof. M. CHRISTIANSEN).

Træløber, *Certhia familiaris macrodactyla* BREHM — Ret almindelig Ynglefugl i Skovene. Gode Ynglesteder findes især i Træspalter, som bl. a. er opstaaet efter Orkanen 8. Februar 1934. Om Vinteren ses Træløberen hyppigt i Skovene og Parkerne, om nogle af disse tilhører den nordlige Race, *Certhia f. familiaris* L., ved jeg ikke.

Gærdesmutte, *Troglodytes t. troglodytes* (L.) — Almindelig Ynglefugl i Skovene og Parkerne, og paa særlige Lokaliteter findes undertiden flere Par ret samlet. Julemorgen 1931 i Solskin sang Gærdesmutton i min Have.

Spætmejse, *Sitta europaea szolcmani* DOM. — Ret almindelig Ynglefugl flere Steder i Skovene, om Vinteren tilsyneladende noget talrigere. 24. Juni 1932 saa jeg 3 Par Spætmejsler med Unger i Haslev Orned.

Sumpmejse, *Parus p. palustris* L. — Almindelig Ynglefugl i hule Træer og Kasser. Om Vinteren træffes den ligesaa hyppigt som Musvitten.

Sortmejse, *Parus ater* L. — Findes som Ynglefugl hvert Aar ved Haslev, men ikke almindelig. Følgende Redefund er noteret: 20. Juni 1932 ved Gissselfeld, 10. Maj 1934 i Hesede Skov og 5. Juni 1934 i Aastrup Skov.

Musvit, *Parus m. major* L. — Meget almindelig Ynglefugl overalt. — Optegnelser af VILLY NIELSEN, Nielstrup 1932: 1. Januar: Hver Nat sidder der en Musvit i en af mine Kasser. Jeg kan tage Laaget af og lyse paa den med min Lommelygte, uden at det synes at genere den. 29. April havde en Musvit begyndt at bygge Rede i en Kasse, og 2. Maj var der 1 Æg i

Kassen. (1. Kuld var paa 8 Unger, 2. Kuld ligeledes paa 8 Unger.)

Blaamejse, *Parus c. caeruleus* L. — Almindelig Ynglefugl i hule Træer og nogle Gange i Mejssekasser, men ikke saa talrig som Musvit. 5. Maj 1933 fandtes en Rede med 3 Æg i Mejssekasse. 3. December 1933 saas 2 Stkr. i Rørene ved Søtorup, klatrende ligesom Rørsangeren (VILLY NIELSEN).

Halemejse, *Aegithalos caudatus europaeus* (HERM.) — Jeg har aldrig fundet dens Rede, men set den nogle faa Gange i Yngletiden. Om Vinteren ses den ofte i Smaaaflokke i Skovene. 26. December 1931 saas 8 Stkr. i Nordskoven, 13. Marts 1932 6 Stkr. ved Gisselfeld og 20. Marts 1932 2 Stkr. ved Gisselfeld (vestlig Race med Striber paa Hovedet). 19. Februar 1933 iagttoges 9 Stkr. ved Nielstrup, 14. Januar 1934 20 Stkr. i Hesede Skov, 28. Januar 1934 8 Stkr. i Denderup Vænge og 25. Februar 1934 3 Stkr. i Haslev Orned.

Lærke, *Alauda a. arvensis* (L.) — Meget almindelig Ynglefugl overalt paa Markerne.

Gulspurv, *Emberiza c. citrinella* (L.) — Meget almindelig Ynglefugl overalt i Skoven og særlig i de levende Hegn.

Rørspurv, *Emberiza s. schoeniclus* (L.) — Ret almindelig Ynglefugl i Rørene ved de fleste af Søerne (Nielstrup Sø, Troelstrup Sø, Søtorup, Ulse, Ejlemade, Sofiendal Mose), dog ikke mange Par hvert Sted.

Kornverling (Bomlærke), *Emberiza c. calandra* L. — Meget almindelig Ynglefugl overalt paa Markerne, men saa talrig som i Vendsyssel er den ikke. 30. Oktober 1932 saas 41 Stkr. ved Ulse og 14. November 1933 48 Stkr. sammesteds.

Graaspurv, *Passer d. domesticus* (L.) — Meget almindelig Ynglefugl overalt.

Skovspurv, *Passer m. montanus* (L.) — Meget almindelig Ynglefugl, men dog ikke saa talrig som Graaspurven.

Bogfinke, *Fringilla c. coelebs* L. — Meget almindelig Ynglefugl overalt og i Skovene absolut den talrigste Fugl.

Kvækerfinke, *Fringilla m. montifringilla* L. — Hvert Efteraar og Vinter indtil ca. 15. April har jeg set større eller mindre Flokke paa Markerne eller i Skovene, som Regel 16 til 20 Stkr., og enkelte Gange 50 til 100 Stkr. sammen med

Bogfinker. 10. December 1933 iagttoges ca 500 Stkr. i Bregnemade Skov.

Kærnebider, *Coccothraustes c. coccothraustes* (L.) — Nogle faa Par yngler hvert Aar ved Haslev og Tureby. ♂ og ♀ saas ved Temstruphus 24. Maj 1931. I Aastrup Skov iagttoges Arten 9. Juni 1934. 1933 og 1934 har jeg modtaget Unger til Udstopning fra Haslev By. Iøvrigt ses den ret jævnlig hele Aaret, som Regel enkeltvis, saavel i Byen som i Omegnen.

Svenske, *Chloris c. chloris* (L.) — Almindelig Ynglefugl i Haslev By, Parker og Skoven, og om Vinteren træffes den ofte i Smaaflokke. 31. Januar 1932 saas 12 Stkr., 18. Oktober 1933 15 Stkr. (aad Solsikkefrø i Haven), 16. November 1933 8 Stkr. og 4. November 1934 10 Stkr. Hele Efteraaret 1932 opholdt en Flok paa ca. 100 Stkr. sig paa Ulsegaardens Marker, hvor der fandtes en Del Affaldsfrø og Roefrø.

Stillits, *Carduelis c. carduelis* (L.) — Ret almindelig Ynglefugl, men spredt i Skove og Parker, samt enkelte Par Nord og Vest for Byen. Om Vinteren træffes den enkeltvis, parvis eller i Smaaflokke. 17. November 1933 saas 3 Stkr. ved Gisselfeld, 10. December 1933 4 Stkr. ved Bregentved og 22. April 1934 4 Stkr. i Hesede Skov (syngende i Elletræer).

Grønsisken, *Carduelis spinus* (L.) — Træffes om Vinteren i større eller mindre Flokke. 12. November 1933 saas en mindre Flok i Hesede Skov, 3. December 1933 4 Stkr. ved Gisselfeld og 30 Stkr. ved Søtorup, 10. December 1933 iagttoges ca. 30 Stkr. i Bregnemade (Elletræer), 14. Januar 1934 ca. 50 Stkr. i Hesede Skov, 25. November 1934 ca. 20 Stkr. i Haslev Orned (Elletræer) og 29. April 1934 6 Stkr. i Hesede Skov.

Graasisken, *Carduelis f. flammea* (L.) — Jeg har truffet en Flok paa 9 Stkr. 17. Januar 1933 i Haslev By.

Tornirisk, *Carduelis c. cannabina* (L.) — Meget almindelig Ynglefugl overalt i Eggen. 18. Oktober 1933 iagttoges en Flok paa ca. 50 Stkr.

Dompap, *Pyrrhula p. pyrrhula* (L.) — Hver Vinter og tidligt Foraar ses enkelte og Smaaflokke almindeligt i Byen og Omegn. 12. November 1933 saas ♂ og 2 ♀♀ i Gisselfeld Have, 29. Marts 1934 ♀ i Hesede Skov. — — 23. Juli 1934 meddelte VILLY NIELSEN mig, at han 13. Maj og 8. Juni paa et bestemt Sted i Hesede Skov havde hørt en Lokketone, som mindede

om Dompappens. 22. Juli saa han 2 Dompapper, hvoraf en ♂. 23. Juli undersøgte vi Forholdene nærmere, og i en Birkeskov med Ørnebregner og lave Hindbær i Skovbunden og omgivet af gammel Rødgranbevoksning, fandt vi 4 Dompapper ♂♀ og ♂♀ ivrigt beskæftiget med at æde Birkens Rakler. Fuglene var ikke sky, men var ret vanskelige at faa Øje paa, idet de (som Regel ♂ og ♀ tæt sammen) skjulte sig i Birkens Løv, hvor de var tavse og kun forraadte deres Tilstedeværelse ved den svage Lyd af Næbet, der pillede Birkefrugten. Som Regel hørte vi kun deres Lokketone, Sang og underlige forsigtige kvækkende Lyde, naar de sad i Rødgranerne, hvor de var umulige at faa Øje paa. Den 28. Juli saa vi ♂ i Færd med at fodre en Unge. Ungen lignede ♀, men synes at have kortere Hale og mangler i hvert Fald dennes sorte Hætte. Jeg mener med Bestemthed at kunne sige, at de tilhørte den nordlige Race: *Pyrrhula p. pyrrhula*, idet ♂ var lys rød paa Bryst og lys graa paa Ryg.

Lille Korsnæb, *Loxia c. curvirostra* L. — Ligesom foregaaende Art ses den hver Vinter og tidligt Foraar, knap saa hyppigt, men Flokkene er ofte større. 24. December 1933 saas flere Flokke paa 7—9 Stkr. i Denderup Vænge, 31. December 1933 2 Flokke (22 og 15 Stkr.) i Hesede Skov, 14. Januar 1934 iagttoges mange Korsnæb i Hesede Skov, ♂ sang i Toppen af Lærk; 4. Februar 1934 var der mange ved Frerslev Møllesø, 4. Marts 1934 saas 3 Korsnæb i Hesede og 18. Marts 1934 2 Flokke paa 5—6 Stkr. i Hesede Skov.

Digesvale, *Riparia r. riparia* (L.) — I Frerslev ved Sognefogedgaarden og i Vester Egede Grusgrav (20 Reder 1934) findes Kolonier, og enkelte andre Smaakolonier findes i Haslev-egnen, men særlig talrig er den ikke. Udenfor Kolonierne har jeg set ca. 20 Digesvaler over Sofiendals Mose 21. Maj 1934, og iøvrigt ses den jævnlig ved Søerne om Sommeren paa Insektjagt.

Bysvale, *Delichon u. urbica* (L.) — I Haslev By yngler Bysvalen 4—5 Steder, men hvert Sted findes kun enkelte eller 5—6 Reder. Paa de større Avlsgaarde (Bregentved, Gisselfeld, Hesede, Edelsminde m. fl.) findes den meget almindelig. Paa Bregentved var der 1934 ca. 100 beboede Reder, men kun faa Par Forstuesvaler. I Nielstrupegnen yngler den 8 eller 9 Steder (Smaakolonier paa forskellige Gaarde og Huse).

Forstuesvale; *Hirundo r. rustica* L. — Meget almindelig Ynglefugl paa de fleste Ejendomme, dog veksler Antallet fra det ene Aar til det andet. 1933 var den meget talrig. Undertiden kniber det med at faa sidste Hold Unger paa Vingerne om Efteraaret. Saaledes saas døde flyvefærdige Unger Bregentved 21. Oktober 1931. En enlig Forstuesvale iagttoges ved Bregentved 2. November 1932.

IAGTTAGELSER AF VANDSTÆREN, *CINCLUS* *CINCLUS*, VED SLAARUPAA VED TØRRING

AF

AKSEL JACOBSEN

I Vinteren 1933—34 opholdt der sig to Vandstære, *Cinclus cinclus*, i Vinterkvarter ved Slaarupaa, tæt op ad Tørring Stationsby, hvor jeg med stor Interesse i Vinterens Løb iagttog dem, hvad der dog ikke voldte mig større Besvær, da det Sted i Aaen, hvor de mest holdt til, kun var ca. et halvt Hundrede Meter fjernet fra min Bolig og saaledes kunde iagttages fra mine Vinduer.

Jeg opdagede først den ene Vandstærs Nærværelse ved Slaarupaa 2. December, da jeg gennem mit Stuevindue stod og betragtede en Dreng, der var i Færd med at nedlægge sine Fiskeredskaber i Aaen; idet han nærmede sig Stemmeværket til et Engvandingssystem, skræmte han en sort Fugl op, som fløj hen og satte sig paa Broen til Stemmeværket. Jeg troede først, det var en Solsort, der havde været nede ved Aaen for at bade sig eller slukke sin Tørst, da den pludselig vendte sin store hvide Plet, der dækker Hals og Bryst, imod mig, og jeg erfarede derved, at det var en Vandstær. Da jeg senere kom til at tale med Drengen, fortalte han mig, at den allerede havde opholdt sig der i flere Dage. Dagen efter saa jeg den igen, og siden saa jeg den ofte, den var altid at finde et Sted langs med Aaen inden for en Aastrækning af 500 à 800 Meter. Den sad sædvanligvis paa Aakanten ved den stærke Strøm, oftest paa en Sten, undertiden ogsaa paa en ud over Vandet hængende Gren, sjældnere paa den bare Jord, sandsynligvis paa Jagt efter Føde. Jeg kunde i Reglen komme den ganske nær og iagttage,