

paa Kryds og tværs over Aaen. Da jeg gik over denne Bro, fløj nemlig den ene Vandstær ud fra de underste Planker. Broen var meget lav, kun ca.  $\frac{1}{2}$  Meter over Vandet, jeg vadede derfor i mine Gummistøvler ud i Strømmen og kigede op under Broplankerne, hvorfra den anden Vandstær, samt en Gærdesmutte, nu forskrækket fløj ud. For at være sikker i Sagen, gik jeg samme Aften ved 21.30 Tiden igen over til Broen, vadede forsigtig ud og lyste med en Lommelygte op under denne; der sad ganske rigtig den ene Vandstær, men den anden var der ikke.

Kun en Gang, nemlig 31. December, saa jeg en af Fuglene ved Gudenaagens mere langsomtrindende Vand paa det Sted, hvor Slaarupaaen løber ud i denne; da den syntes noget forskræmt, kunde det tyde paa, at den ved et Tilfælde er jaget derned. Selvom Fuglene ikke var at se, forraadte de dog altid deres Nærværelse ved deres Ekskrementer, som i rigelig Mængde blev udgydt som store hvide Pletter paa Siddepladserne.

## FRA FALSTERBO 8. OKTOBER 1933

AF

EDM. EICHNER

Efter Læsningen af Å. VEDEL TÅNING's »Rovfugletræk ved Falsterbo« i D.O.F.T., 27. Aargang, Hefte 2, havde jeg ønsket at komme en Tur til Falsterbo, og sammen med HALFDAN LANGE og 3 andre Herrer foretog jeg en Tur derover Søndag 8. Oktober 1933. Vi afrejste fra Frihavnen 5.50 Morgen, og saa snart Dagen begyndte at gry, havde vi de første Flokke af Hættemaager, *Larus r. ridibundus*, og Stormmaager, *L. c. canus*, omkring Skibet. Midt ude i Sundet saa vi Ederfugle, *Somateria m. mollissima*, i Flokke (20 ♂♂, 40 mest ♂♂, 15, 40 og 3 Stkr.). 1 og 2 Engpibere, *Anthus pratensis*, med Kurs mod Øst, Sildemaager, *L. fuscus*, ung og gammel, 2 Sølvmaager, *L. a. argentatus*, blev konstateret.

Efter Ankomsten til Malmö var vi en Tur i Parken, hvor Fuglekonger, *Regulus r. regulus*, Kvæker, *Fringilla montifringilla*, Solsort, *Turdus merula*, sang sagte, Stokand,

*Anas p. platyrhyncha*, Hættemaage, Graaspurv, *Passer d. domesticus*, og Skovspury, *Passer m. montanus*, iagttoges.

Ankommen til Falsterbo ved 9 Tiden gik vi straks mod Stranden og Sveriges sydvestligste Punkt; og i Tiden til Kl. ca. 15 havde vi Lejlighed til at se saa mange forskellige Arter af Fugle, enkeltvis og i Flokke, som vi aldrig har set det paa den anden Side Øresund paa et saa begrænset Areal.

Vejret var stadig overtrukket. Fra Klokken 14 til 15, da vi efter en Vandring langs Sydstranden og over Heden nærmede os til Skanör, regnede det. Der var først Vind fra Sydøst (4 scm.) hele Formiddagen, fra Klokken 15 stærkere Vind (5 scm.).

Sangdrossel, *Turdus p. philomelos*, Engpiber, Gulspurv, *Emberiza c. citrinella*, Fuglekonge, Gærdesmutte, *Troglodytes t. troglodytes*, Sortmejse, *Parus a. ater*, 4—5 Korsnæb, *Loxia c. curvirostra*, Musvit, *Parus m. major*, en Skade, *Pica p. pica*, opholdt sig i og ved Plantagen nær Fyret.

I Byen blev Gransanger, *Phylloscopus collybita abietina*, iagttaget (2 Gange paa meget nært Hold) og Rødstjert, *Phoenicurus p. phoenicurus*, 1 Gang. Spurvehøge, *Accipiter n. nisus*, fløj enkeltvis over os, og Taarnfalke, *Falco t. tinnunculus*, musede 2 Steder ude paa Heden mellem Falsterbo og Skanör.

I Plantagen ved Fyret fandt vi Fjerrester efter Spurvehøgenes Maaltider. Vi genkendte 2 Stære, *Sturnus vulgaris*, 2 Sangdrosler, 1 Solsort, 1 Svenske, *Chloris c. chloris*, 2 Bogfinker, *Fringilla c. coelebs*, 1 Digesmutte, *Oenanthe o. oenanthe*, 3 Fuglekonger, 5 Rødhalse, *Erithacus r. rubecula*, 1 Rødstjert, 3 Gule Vipstjerter, *Motacilla f. flava* (ialt 21 Stkr.). — — I Plantagen ved Skanör laa Resterne spredt over meget større Omraader, og kun følgende 11 Fugles Fjer blev fundet: 1 Sangdrossel, 3 Rødhalse, 1 Forstuesvale, *Hirundo r. rustica*, 4 Fuglekonger, 2 Tornirisker, *Carduelis c. cannabina*. Under Telefon og Traadhegn laa en Stær og 2 Sangdrosler, ret friske.

Saavidt muligt blev alle de trækkende Fugle skrevet ned; i Begyndelsen (fra Kl. 9—11) var der dog ofte saa mange Flokke og saa talrige Enkeltfugle, at det kun blev meget ufuldstændige Notater. Senere ebbede Trækket noget af, som altid paa

den Tid af Døgnet. Efter Kl. 13 holdt kun Rovfuglene ud og ganske faa Flokke af Bogfinker. Usædvanligt tydeligt saa man 2 modgaaende Strømme af Fugle. Hovedmængden selvfølgelig mod S. (langs Kysten) og S.V.; men ogsaa mange fløj lige modsat, mod N. og N.Ø. En af os gjorde opmærksom paa, at denne sidste Fuglestrøm sikkert bestod af 2 Slags Fugle: 1) Mest Landfugle, der ved at se Havet under sig, blev ængstelige og vendte om, maaske for kort efter at prøve paany. 2) Men ogsaa Fugle, som udførte et virkeligt Tilbagestræk, forkert Efteraarstræk, idet de følte Varme strømme mod sig fra Øst<sup>1</sup>. De tænkte sig, den Vej maatte de rejse for at naa de varme Lande; de rejste altsaa foreløbig den gale Vej, og de kom langvejs fra, ovre fra Sjælland. Saaledes saas sikrest Engpiberne over Sundet, men ret sikkert ogsaa Stære og Krager Kl. 9.40 og 10.20, da disse robuste Fugle næppe er skræmmede tilbage fra Vandet, saaledes som vi adskillige Gange saa Svaler, Hulduer og Spurvehøge vende om, naar de var naaet et lille Stykke udover det temmelig oprørte Hav.

De tilbageflyvende og »forkert« rejsende Fugle er mærkede ved halvfede Typer for deres Flyveretning; spatierede Navne i det med mindre Typer trykte Afsnit angiver Fugle, som ikke var paa Træk, men fløj ubestemt i forskellige Retninger eller var paa Vej til andre Fødepladser.

Kl. 9.20—30. Vintermusevaage, *Buteo l. lagopus*, fløj lavt mod Øst, Spurvehøg mod Ø., Lærke, *Alauda a. arvensis*, Kvækerfinker + Bogfinker (flest af disse), Engpibere, 70 + 10 Alliker, *Coloeus m. monedula*, mod N.Ø., 40 + 16 Krager, *Corvus corone cornix*, og 50 Alliker fløj omkring.

Kl. 9.30. Spurvehøg S.S.V., Musevaage, *Buteo b. buteo*, mod S., 2 Forstuesvaler, 1 Svenske, 30 Grønsiskener, *Carduelis spinus*, N.N.V., 100 Stære S., 2 Gæs S.S.V., 2 Vintermusevaager S.Ø., 10 Krager + 1 Spurvehøg N.Ø., 1 Sildemaage, 1 Vintermusevaage N.Ø., 2 Spurvehøge S.V., 1 Hedelærke, *Lullula a. arborea*, Ø., 3 Tornirisker N.Ø.

<sup>1</sup> Om denne Art af Træk henviser HALFDAN LANGE til følgende: DROST: Über Vogelwanderungen in den Wintermonaten (Verhandl. VI intern. Orn. Kongress, Kopenhagen 1926. Side 62—79). — DROST und BOCK: Vogelzug im Nordseegebiet (Der Vogelzug 1931, 80—81). — BOUMA, KOCH og MALSOEN: Jaarverslag (Ardea, 18, S. 38, 1929 og Ardea, 19, S. 28, 1930 samt DOBBEN: Ardea, 20, S. 22, 1932).

Kl. 9.40. ca. 30 Tornirisker + 1 Kvækerfinke S.V., 1 Lærke, 1 Spurvehøg S.V., 20 Krager mod N., 1 Bogfinke mod Ø., 3 Spurvehøge i Række mod S., 20 Stære mod S.V., 21 + 4 Engpibere fløj op, Spurvehøg S.V., 1 Gulspurv.

Kl. 9.50. 1 Kvækerfinke, 1 Bogfinke, 1 Sangdrossel, 3 Tornirisker mod N., 1 Vintermusevaage eller Musevaage mod S., 1 Forstuesvale S., 15 Tornirisker S., 7 Tornirisker S., 7 Krager S.

Kl. 10. 2 Spurvehøge højt mod S., Blaamejse, *Parus caeruleus*, i Busk, 1 Spurvehøg jaget af 6 Svaler og 1 Engpiber. 1 Flok (6 Tornirisker + 1 Kvækerfinke + 1 Forstuesvale) fløj mod N. 10 Krager S., 1 Spurvehøg S.V., 8 Spurvehøge og 60 Alliker og 6 Krager fløj sammen S.V., 1 Spurvehøg S., 1 Vintermusevaage fløj S., vendte derefter om, 3 Lærker fløj S., 15 Krager og nogle Alliker fløj med 2 Lærker mod S.

Kl. 10.10. 2 Musevaager mod N., den ene først mod S., Hvid Vipstjert, *Motacilla a. alba*, 3 Forstuesvaler mod S., 11 Alliker mod S.S.V., 1 Spurvehøg mod S, Krage + 30 Alliker mod S.V., 20 Krager mod N.Ø. 1 Spurvehøg mod S., 1 Vintermusevaage mod S.V., 1 Grønsikken tilbage mod N.Ø. Engpibere stadig i Luften (delvis paa Træk, nogle S.V., nogle tilbage).

Kl. 10.20. Hedelærke hørt, Bogfinke og Kvækerfinker hørt, 9 Engpibere lavt ud mod S.V., 20 Krager mod S.V., 1 Musevaage mod Ø., Tornirisk hørt, 2 Stære mod N., 2 Krager Ø.N.Ø., 3 Hedelærker Ø., 3 Spurvehøge kredsende S.V. vendte om, 10 Toppede Skalleslugere, *Mergus serrator*, laa nær Land, 6 af dem fløj N., 10 saas længere ude, 15 Store Skalleslugere, *Mergus m. merganser*, (kun 2 ♂♂) tæt ved Odden.

Kl. 10.30. 2 Svaler mod N., 60 Viber, *Vanellus v. vanellus*, mod S. og derpaa N., 13 Svaler S., 12 Svaler N., 17 Gæs S., 1 Svale N., 4 Sortænder, *Oidemia n. nigra*, fløj S. over Vandet.

Kl. 10.50. 13, 22 og 27 Gæs fløj mod V., 1 Ederfugl ♀ S., Rørspurv, *Emberiza s. schoenichus*, mod N., Mudderklire, *Actitis hypoleuca*, paa lille Ø af Tang, 3 Krager mod S.

Kl. 11.06. En Spurvehøg mod S., 1 Tornirisk mod N., 3 Svartbage, *Larus marinus*, + 1 Sølvmaage paa Pæle, 3 Spurvehøge mod N., 25 Hulduer, *Columba o. oenas*, mod S.V.

Kl. 11.10. 3, 16, 6 og 2 unge Forstuesvaler mod S. med 15 Tornirisker, 8 Krager mod S., 12 Krager S., 3 Engpibere, 12 Tornirisker eller Grønsiskener mod S.

25 Hulduer mod S., 2 Spurvehøge mod S., 2 Musevaager(?) + 1 Spurvehøg mod N., 2 Spurvehøge S.V., 37 Viber mod S.Ø. og derpaa S., 8 Krager mod N., Tornirisk, 3 Musevaager S., 3 Vintermusevaager + 3 Musevaager mod S., den ene Vintermusevaage vendte tilbage. 1 Tornirisk mod N.

Kl. 11.30. 1 + 1 Vintermusevaage mod S., 1 Spurvehøg mod S., 30 Stære mod S., 3 Viber mod Ø., 6 Forstuesvaler mod S. alle vendte tilbage. 25 Forstuesvaler mod N. 1 + 1 Vintermusevaage S.V.

Kl. 12. 1 Spurvehøg mod S., **tilbage**, 1 Vintermusevaage + 1 Spurvehøg mod S., 3 Hulduer mod S., vendte tilbage lavt mod **N.Ø.** Engpibere vender stadig **tilbage**.

Kl. 12.20. 6 Musevaager mod **Ø.**, 2 Spurvehøge S., den ene kredsende **tilbage**.

Kl. 12.30. 20 Ryler, *Calidris a. alpina*, mod S. 20 Bogfinker til Fyrets Plantage. 5 Korsnæb kom til Plantagen, kort efter fløj 4 af dem omkring.

Kl. 13. 35 Hulduer med 4 Stære mod S., ca. 25 Hulduer vender tilbage mod **N.Ø.** 2 Spurvehøge, 1 Grønsisken mod S.V. 35 Hulduer + 1 Ringdue, *Columba p. palumbus*, fløj op fra Marken, 12 Bogfinker mod **N.**, 9 Gæs mod **Ø.**, 1 Spurvehøg, 2 Ryler (ubestemmelige), *Calidris sp.*, fløj lavt S. langs Sandstranden.

Kl. 13.30. 3 Vintermusevaager ud mod S. og derefter **tilbage**, 1 Spurvehøg S., 1 Vintermusevaage mod V., 20 Krager mod **N.**, 1 Musevaage mod V., 2 Musevaager drev mod V. med Vinden.

Vi gik derefter østpaa langs Badestranden og derpaa nordpaa op gennem Heden, Markerne og Plantagen til Skanör. I Skanör Plantage fandt vi ligeledes en Del Fuglefjer efter Spurvehøgenes Maaltider (se foran). Men kun faa Fugle opholdt sig der. Noget Gylp af Skovhornugle(?) laa spredt under Fyrretræerne.

Kl. 14. 1 Spurvehøg, vistnok paa Træk.

Kl. 14.32. 2 Musevaager eller Vintermusevaager i vestlig Retning, 1 Spurvehøg paa Jagt.

Kl. 15. 1 Vintermusevaage, 3 Spurvehøge, 2 fløj mod S. 1 Vintermusevaage, 20 Bogfinker lavt mod S., Sortmejse, Fuglekonge overalt.

Kl. 16 rejste vi fra Skanör til Malmö, og fra Toget kunde vi tælle 37 Knopsvaner, *Cygnus olor*, i Smaagrupper paa Vandet, og vi saa enkelte Vintermusevaager hvile paa Høstakke og flyve lavt, enkelte Raager, *Corvus f. frugilegus*, 3 og 8 og flere.

Kl. 19 var vi atter i København i øsende Regnvejrr.

Turen var meget indholdsrig paa Fugle, der blev iagttaget 51 Arter, deraf 23 Arter flyvende paa Træk. Navnlig var det imponerende at se de mange Rovfugle, som ustandseligt svævede over os. Tallet af Spurvehøge mod S. og S.V. var 38 Stkr., 9 saa vi flyve **N.** eller **N.Ø.**, delvis de samme som de 38, men paa Flugt ind over Land.

Det skal netop være Efteraarstræk, der ses ved Falsterbo. Fuglene samles før Rejsen over Øresund ligesom i en Ruse fra hele Skåne, medens det smalle Landomraade om Foraaret ikke kan opsamle ret mange rejsende Fugle, naar de kommer spredt over Vandet imod Skånes Jord.

## Tilføjelse. 9. September 1934.

Ved HALFDAN LANGE.

Paa en lignende Tur en Maaned tidligere i Aar blev der set et ret stort Træk af Rovfugle og Svaler. Der kom enkelte store Flokke af Musevaager (20—35 Stkr.) og af Hvepsevaager (34 Stkr.) samt mange spredte Smaaflokke, af og til var Arterne blandet, og enkelte Gange var der en Fiskeørn imellem, een Gang en Spurvehøg. Denne Art trak i ret stort Antal trods det tidlige Tidspunkt. Der blev optalt 55 Spurvehøge (rejsende S.S.V. eller S. eller S.V.), fremdeles 118 Musevaager og 101 Hvepsevaager. Af dette Tal var nogle talt dobbelt, da man saa dem vende tilbage, naar de kom ud over Vandet. Andre Rovfuglearter var Taarnfalk (omtrent 12 paa Træk), Dværgfalk, Blaa Kærhøg (? set 3 brune Eksemplarer af en anden Udflugtsdeltager).

49 plukkede Smaafugle optaltes, væsentlig i den lille Plantage om Fyret. Det var mest Rødstjert og Rødhals.

Ialt blev 61 Arter set, hvoraf nævnes følgende, der var paa Trækrejse i de graalige Formiddagstimer, delvis drivende med Østenvinden mod S. og S.V.: Lom (1, ret sikkert Sortstrubet Lom, *Colymbus arcticus*). Splitterne, *Sterna s. sandvicensis* (2 mod S. med 1 Sølvmaage, *Larus a. argentatus*; 1 gammel Fugl med Unge opholdt sig ved Strandsøen). Stormmaage, *Larus c. canus* (faa Flokke mod V.). Ryle, *Calidris alpina*. Islandsk Ryle, *Calidris c. canutus* (4 unge mod S.). Strandhjejle, *Squatarola s. squatarola* (1 mod S. og 1 med 40 Ryler paa Lavvandet). Allike, *Coloeus m. monedula* (30 mod S.V.). Forstuesvale, *Hirundo r. rustica* (mange mod S., mest Ungfugle); disse tildels sammen med faa Digesvaler, *Riparia r. riparia*, og Bysvaler, *Delichon u. urbica*, Stær, *Sturnus v. vulgaris* (10 og 25 mod S.V.). Engpiber, *Anthus pratensis* (4 ud og tilbage). Skovpiber, *Anthus t. trivialis* (3 mod S.V.). Gul Vipstjert, *Motacilla f. flava* (10, 3, 5, 1 mod S.), nogle gik paa Marken med Hvide Vipstjerter, *Motacilla a. alba*. Huldue, *Columba o. oenas* (25 mod S.Ø. og 5 mod S.).

Blandt de 61 Arter bemærkes foruden disse 21 rejsende: Klyde, *Recurvirostra a. avocetta* (2 i lavt Vand, ogsaa frivilligt svømmende). Tornskade, *Lanius c. collurio* (1 ung Fugl paa

Sydspidsen i en Kvasbunke). Ride, *Rissa t. tridactyla* (1 ung og 1 gammel Fugl sammen med Stormmaager).

Der blæste siden midt paa den foregaaende Nat en ret stærk og varm Østenvind, saa at der kunde ventes et lignende »Tilbagetræk« som omtalt under 9. Oktober 1933. Det er dog tvivlsomt, om det kan tydes saaledes denne Gang, naar der af og til var Maager og ialt 3 Fiskeørne, som fløj mod Øst.

## STORSPOVE OG STOR TORNSKADE YNGLENDE PAA RANDBØL HEDE

AF

HANS MEINHARDT

Tidligere har Konservator H. MADSEN<sup>1</sup> berettet om et Besøg, som han i Selskab med flere Interesserede aflagde paa Randbøl Hede 25. og 26. Maj 1931. Det var med Besøget Hensigten at søge fastslaaet, hvorvidt Storspoven, *Numenius a. arquata* (L.), ynglede paa nævnte Hede, idet Konservator MADSEN gennem Koncertsanger ANKER OLESEN havde bragt i Erfaring, at et Storspovepar havde haft Tilhold der den foregaaende Sommer. Ogsaa 1931 var Spoverne paa Randbøl Hede, men det lykkedes ikke Selskabet at faa noget haandgribeligt Bevis for, at Parret ynglede, trods timelange Eftersøgninger; Fuglenes hele Opførsel tydede dog paa, at det virkelig var Tilfældet. Da det saaledes, ved Konservator MADSEN's Beretning, var kommet til min Kundskab, at denne anselige Vader sandsynligvis ynglede paa Randbøl Hede, besøgte jeg de 2 følgende Aar, 1932 og 1933, flere Gange denne i Maanederne April, Maj og Juni. Ved mine Besøg saa og hørte jeg altid Storspoveparret, men min Søgen efter dets Æg eller Unger var stadig forgæves, endskønt Fuglenes Væremaade ved flere af Besøgene tydede paa, at de havde Yngel i Nærheden. Derimod havde jeg — som tidligere meddelt<sup>2</sup> — den Glæde at finde et Par af den Store Tornskade, *Lanius e. excubitor* L., ynglende i en lille Plantage derude.

<sup>1</sup> D.O.F.T., 1931, p. 104—108.

<sup>2</sup> D.O.F.T., 1933, p. 113.