

travlt beskæftiget med Ælmefrøet. De gamle Fugle saa jeg intet til, og den følgende Dag var Ungerne ogsaa forsvundet.

Senere har jeg ikke iagttaget Grønsiskener i Skovene ved Jægerspris; og Grunden hertil er sikkert den, at jeg Sommeren igennem har haft al min Opmærksomhed henvendt paa Dompapperens Yngleforhold.

---

## MINDRE MEDDELELSER

I det Følgende gengives et Antal tilsendte Notater om ornithologiske Iagttagelser. I de fleste Tilfælde er Meddelerens Ordlyd helt eller nogenlunde fulgt, kun et Mindretal af Bidragene, især saadanne, der er indkommet i Brevform er omskrevet. Et Antal Iagttagelser, som skønnedes at være af mindre almen Interesse er udeladt. Overskrifternes Ordlyd skyldes i Regelen Red. — En Del af Bidragyderne er ikke Medlemmer af D.O.F. En stor Del af disse Notater er viderebragt af Cand. theol. HALFDAN LANGE; Resten af Meddelerne har staaet i Forbindelse med Bestyrelsens Medlemmer. Disse Meddelelser stammer fra: Kommunalærer EGEDE ANDERSEN; Søborg. Lærer ERIK ASKEGAARD; Holsteinsminde, Fuglebjerg. Lærerinde, Frk. G. ASMUND; Fjords Allé 16, V. Kunstmaler ASSISOF; Trundevang 9, Charlottenlund. MOGENS BISGAARD; Glamsbjerg. JAN BOËTIUS; Hattensens Allé 18, F. Fru G. BRANDT; Raadhusvej 24, Charlottenlund. ARVID CARLSSON; Borgergade 104, K. Politifuldmægtig, Cand. jur. V. EHLERN; Aalborg. Frk. GRÜNER; Sortedams Dossering 25, N. Revisor ALEXIS HORNEMAN; Odense. Dyrlæge EGIL HORNEMAN; Haslev. Cand. mag. P. L. JØRGENSEN; Duevej 50, F. Chokoladehandler K. LØVENBORG; Klampenborg. Overlæge, Dr. med. N. J. STRANDGAARD; Bose-rup Sanatorium, Roskilde. Inspektør FR. THYE, Demstrup Hovedgaard, Havndal.

BERNT LØPPENTHIN

### Usædvanlige Gæster i Furesøen 1934.

25. Juni opholdt en Alk, *Alca torda*, sig i Kanalen ved Frederiksdal Kro, uanfægtet af Baadsejladsen. J. P. JENSEN

Sammen med andre Deltagere i en ferskvandsbiologisk Ekskursion med Prof. WESENBERG-LUND 26. Juni saa jeg en Alk svømme om i Nærheden af Kanalen til Sluseværket ved Frederiksdal. Den dykkede flere Gange og kom engang op med en Fisk, som en Hættemaage imidlertid øjeblikkelig frarøvede den. Kort efter svømmede Alken under stadig Dykken ind i Kanalen og lod sig nu ganske uforstyrret betragte paa faa Meters Afstand. Om Fuglen har været syg eller anskudt skal jeg ikke kunne udtale mig, men rent umiddelbart gjorde den ikke Indtryk deraf; naar den dykkede, blev den ofte ret længe nede og kom op temmelig langt fra Nedykningsstedet.

MOGENS HØJGAARD

Fra 3. Juni blev en Alk flere Dage set i Kanalen. 27. Juni fandt jeg den død i selve Furesøen udfor Frederiksdal, Fuglen blev bragt til Zoologisk Museum.

CARL ERIK GEDE

12. Februar svømmede en Ride, *Rissa tridactyla*, i Kanalen henimod Frederiksdal og lod sig betragte ganske nær.

HALFDAN LANGE

25. Marts saas paa 7 Meters Afstand en Rødstrubet Lom, *Colymbus stellatus*, ligge ved Kysten op mod Nørreskov. Den havde en sort Olieplet paa Bugen, hvad man saa, naar den drejede sig for at pille sine Bryst- og Sidefjer. Nogle Dage senere blev den atter set.

HANS LEVINSEN

### **Steller's And, *Polysticta stelleri* (PALL.), ved Sydfyn.**

I April 1934 modtog jeg fra Købmand LAURITZ NIELSEN, Faaborg, en Steller's And, som nogle Dage før var funden død ved Stranden paa Lyø. Den var frisk, tilsyneladende ubeskadiget; kun havde Kragerne været i Lag med den og hugget Hul paa Skindet paa Brystet. — Det fundne Eksemplar var en Han i Pragtdragt. Fuglen findes nu paa Zoologisk Museum.

Steller's And er en sjælden Gæst i Danmark; der kendes kun en halv Snes Tilfælde af dens Forekomst tidligere, næsten alle i Landets østlige Dele. Dens Ynglepladser er i det nordøstlige Sibirien og i den nordlige Del af Alaska. Ved Kysten i det nordlige Norge træffes den ret almindelig, saaledes i Varanger-

fjorden. Den kommer som en tilfældig og sjælden Gæst ned til Mellemeuropas Kyster.

O. HELMS

**Graagæs, *Anser anser*, i Hanherred.**


Ca. 60 Graagæs oversomrede i 1934 i Selbjergvejle uden at yngle. De trak hver Morgen i samlet Flok ud paa Engene for at græsse og tilbage til Rørskovene ved Søen om Aftenen. Antagelig ynglede kun 4—5 Par.

ARTHUR CHRISTIANSEN

**Lemlæstede Agerhøns, *Perdix perdix*, som klarer sig.**

18. September 1934 skød jeg i Sørig Mose ved Frederikshavn en Agerhøne (en Kok), der manglede Tærne paa begge Fødder, men som desuagtet har levet videre. Fuglen var i udmærket Foderstand, nærmest fed.

VIGGO EHLERN



Defekte Fødder af Agerhøne, *Perdix p. perdix*. 1: Venstre Fod bagfra. 2: Højre Fod bagfra. 3: Højre Fod forfra. 4: Venstre Fod forfra.

Frederikshavn 18. September 1934.

De afskaarne Fødder af ovennævnte Agerhøne blev tilsendt Overlæge HELMS, der overgav dem til Undertegnede. Paa den nederste Ende af Løbet havde udviklet sig en Slags Trædepude, som Fuglen sikkert kunde støtte paa i levende Live. Utvivlsomt har den bevæget sig med stærkt bøjede Intra-tarsalled (»Hælled«), saaledes at den har støttet paa hele eller

Størsteparten af Løbet. [Sml. Fotografierne.] — Et Røntgenfotografi, venligst taget af Læge og Tandlæge OVE BRINCH, viser tydeligt, at det drejer sig om en Fugl, der har mistet Tærerne ved et Ulykkestilfælde samt faaet det nederste Parti af Mellemfoden beskadiget.

I Dansk Jagttidende, 1934, p. 307 (17. Oktober) meddeles om en Agerhøne, som blev skudt ved Kolind paa Hønejagten første Dag. Fuglen manglede Tærerne paa højre Fod og et kort Stykke af Løbet; Saaret var helt lægt, og omkring Brudstedet var dannet en cirkelrund, fast Flade paa ca 1 cm i Diameter. Det var en gammel ♂; den fløj op sammen med 15 Ungfugle.

BERNT LØPPENTHIN

### Islom, *Colymbus i. immer*, ved Fanø om Sommeren.

En Islom, Han, i meget smuk Sommerdragt fandtes opskyllet paa Sønderho Strand, Fanø, ca. 15. Juni 1934. Fuglen blev udstoppet og er forevist mig af Førstelærer THOMSEN, Sønderho. Vingelængde 36 cm.

HALFDAN LANGE

### Lappedykkere ved Nakkebølle.

I 1926 indfandt Sorthalset Lappedykker, *Podiceps n. nigricollis*, BREHM sig første Gang i Inddæmningen ved Nakkebølle; her traf jeg 30. April en halv Snes Fugle og fandt deres Rede. I de nærmeste Aar derefter fandtes den ikke hvert Aar, og naar den fandtes, var det kun i ringe Tal. I de senere Aar er Tallet vokset; i 1933 var den almindeligt ynglende, og i 1934 overgik Tallet af ynglende Fugle langt Tallet af Rødhalset Lappedykker, *Podiceps g. griseigena* (BODD.), som tidligere var den talrigst ynglende af Slægten. 22. April 1934 saa jeg paa en aaben Vandflade i Inddæmningen 3 Toppet Lappedykker, *Podiceps c. cristatus* (L.), 4 Rødhalset Lappedykker og 40 Sorthalset Lappedykker.

O. HELMS

### Dværglappedykker, *Podiceps ruficollis*, i Stormvejr.

Under et Stormvejr i Esbjerg Havn iagttog Fisker JOHAN POULSEN, Ribe, (30. November 1931) en Dværglappedykker i Vinterdragt, som opholdt sig længe og dykkede mellem de store Hyttefade, der blev bevæget stærkt frem og tilbage, hvor-

for der hørte stor Dykkefærdighed til at undgaa at blive knust mellem dem.

HALFDAN LANGE

**Stormfugl, *Fulmarus glacialis*, ved Skagen.**

En Stormfugl fandtes opskyllet paa Skagens Strand 28. Juli 1931.

G. BRANDT

**Albino af Blishøne, *Fulica atra*.**

Da jeg 20. December 1933 besøgte Furesøen, laa der foruden de Tusinder af Trold-, Taffel-, Hvin- og Stokænder en mægtig Flok Blishøns, hvori en enkelt hvid Fugl lyste op mellem alle de sorte. Størrelsen var den samme som Blishønsenes og hele Skikkelsen ligesaa, men alligevel var jeg ikke sikker paa, om det virkelig var en hvid Blishøne eller muligvis en And med »tamt« Blod i Aarerne; da den imidlertid pludselig dykkede paa typisk Blishønemaner og lidt efter kom op paa samme Sted, idet den foretog de almindelige Hovedbevægelser fra Side til Side, som Blishønsene saa ofte gør, var der ikke mere Tvivl om, at det virkelig var en hvid Blishøne, jeg havde for mig. Senere saas den jagende andre Blishøns, som havde hentet noget op fra Bunden. Snehvid var Fuglen forøvrigt ikke, nærmest svagt flødefarvet, Næbbet rosa eller gulligt og Øjnene mørke — eller sandsynligst røde. Da jeg et Par Dage senere eftersøgte den, var den forsvundet.

E. PETERSEN

**Traner, *Megalornis grus*, over København og i Jylland.**

8. April 1934 trak en Flok Traner paa 28—30 Individer, kredsende i store Cirkler, hen over Amager og ind over København i nordvestlig Retning. De gik ret lavt over Fælled, i ca. 75 Meters Højde, og lod bestandig deres kraftige, trompetlignende Stemme høre; da de nærmede sig Byen, gik de et Par Hundrede Meter til Vejrs. — Den foregaaende Dag var der gaaet 6 Traner over København omtrent i samme Retning.

THORVALD FRØLICH

En Trane blev set og hørt 1. August 1934 ved Fiil Sø; den fløj fra Klitterne mod Øst.

EGEDE ANDERSEN

**Overvintrende Viber, *Vanellus vanellus*.**

23. December 1933 blev en Vibe skudt ved Sædding, Nordvest for Esbjerg, og 28. December saas endnu én sammesteds.

H. P. RANDLØV

**Tidlig Forekomst af Sortklire, *Tringa erythropus*.**

16. April 1933 saa jeg 2 Sortklirer ved Avedøre Holme.

CHR. KRÜGER

**Almindelig Præstekrave, *Charadrius hiaticula*, ynglende i Grusgrav langt fra Kysten.**

30. Maj 1934 saa Skovrider V. HOLSTEIN og Undertegnede et Par af Almindelig Præstekrave, der holdt til ved en større Grusgrav og Mergelbane i Nærheden af Brande, altsaa midt inde i Jylland. Efter Fuglenes Opførsel at dømme, var der ikke ringeste Tvivl om, at det var Ynglefugle, som havde Rede der.


AXEL KOEFOED

**Iagttagelse af Stylteløber, *Himantopus himantopus*, ved Charlottenlund.**

Da Undertegnede en Dag i Juli 1933 foretog en Spadseretur ved Charlottenlund, viste en Stylteløber sig nede ved Strandkanten. Da denne Fugl sjældent træffes paa saa nordlige Breddegrader, har Museumsinspektør R. HØRRING opfordret mig til nærmere at beskrive Iagttagelsen.

Omtalte Fugl kom saa hurtigt og tydeligt indenfor min Synskreds, at jeg ikke engang fik Tid til at overveje, om jeg havde taget Fejl. Dens Udseende med de umaadelig lange Ben er jo i høj Grad typisk, og da jeg aldrig før havde haft det Held at se den i levende Tilstand, standsede jeg for at iagttage den saa længe som muligt. Fuglen var ikke særlig sky, saa jeg kunde komme den temmelig nær, paa ca. 50 m. Den opførte sig meget besynderligt, og havde det ikke været i Juli Maaned, kunde man maaske have gættet paa Parringsleg; snart i Luften, snart paa Jorden fór den frem og tilbage langs en Strandstrimmel paa ca. 100 m, undertiden med hængende Vinger og næsten vaklende Trin, samt nu og da udstødende en pibende Lyd. Til Slut fór den i en stor Bue mod Nord, hvorefter den ikke viste

sig mere. For en Sikkerheds Skyld blev jeg en Times Tid paa Stedet, men Fuglen kom ikke tilbage.



Arvid Carlsson.

Stylteløber, *Himantopus himantopus*. Charlottenlund, Juli 1933.

I den halve Time, jeg havde Lejlighed til at iagttage Stylteløberen, tog jeg nogle Blyantsstudier, som er gengivet ovenfor.

ARVID CARLSSON

### Tidligt ynglende Klyder, *Recurvirostra avocetta*.

12. Maj 1933 iagttoges 2 Par Klyder paa Tømmerup Overdrev indenfor Koklapperne, og ved Eftersøgning lykkedes det at finde en faa Dage gammel Unge af det ene Par og Rede med 3 stærkt rugede Æg af det andet. I NAUMANN: Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas opgives Rugetiden til 17—18 Dage og Æglægningen maa saaledes være paabegyndt allerede 18.—19. April hos det ene Par og ca. 22.—24. April hos det andet. Ifølge HØRRING's Angivelse i Danmarks Fauna begynder Æglægningen en Uge ind i Maj eller senere; NAUMANN angiver iøvrigt samme Yngletid. Havde det været forarsagtigt og mildt Vejr omkring 20. April, kunde dette tænkes at have været Aarsagen til den tidlige Æglægning, men Vejret var tværtimod koldt med en Temperatur paa eller lige under Frysepunktet om Natten og 5—6° Varme midt paa Dagen.

E. PETERSEN

**Iagttagne Odinshaner, *Phalaropus lobatus*.**

2. September 1934 saa jeg en ung Odinshane i Kildesøen ved Klampenborg. Det foregaaende Døgn havde det været Orkan med stærk Regn.

Under en Udflugt, som nogle af Foreningens Medlemmer foretog til Selsø i Hornsherred 28. September 1934 blev der set 2 unge Odinshaner, som svømmede rundt i Søen.

For 3. Gang i samme Maaned iagttog jeg denne Art paa D. O. F.'s Ekskursion til Falsterbo, 16. September 1934 (se D. O. F. T., 1934, p. 155).

CHR. KRÜGER

**Thorshane, *Phalaropus fulicarius jourdaini*, i Mariagerfjord.**

♂ i Vinterdragt blev skudt 9. Oktober 1933. Den svømmede i det dybe Vand i Nærheden af Øen Treskelbakke. Den var saa lidt sky, at Jægeren kunde ro tæt hen til den; han troede, at den var saaret, og forsøgte at dræbe den ved et Slag med Aaren, men dette mislykkedes dog paa Grund af stærk Søgang, hvorfor han skød den. Da han derefter ikke kendte Fuglen, kom han til mig med den.

S. RASMUSSEN

**Skovsnepper, *Scolopax rusticola*, i Træer.**

26. November 1933 iagttoges en Snepe i Hem Vest for Skanderborg, idet den fløj ud fra Toppen af en høj og tæt Gran. — En Gang tidligere har jeg hørt om en Snepe, der satte sig op i et Træ. Det var en gammel Jæger, der fortalte Begivenheden, som jeg den Gang stillede mig noget tvivlende overfor. I nærværende Tilfælde er Sagen imidlertid paalidelig nok; det var min Søn, der gjorde Iagttagelsen.

R. P. RANDLØV

**Dværgmaager, *Larus minutus*, i Københavns Omegn.**

Ved Stranden Syd for Kongelunden saas 10. November 1930 en voksen Dværgmaage sammen med 40 Hættemaager og 3 Krager. Den skilte sig snart ud og jagede alene, flyvende ca. 2 m over Vandet. Ofte standsede den et Øjeblik paa hvælvede Vinger og med rundet Ryg, i Regelen med Hovedet mod Vinden. Da den havde hvilet paa Vandet en lille Tid, fløj den lavt og temmelig hurtigt bort mod Vest.



28. Marts 1931 laa en temmelig frisk, ung Dværgmaage, Hun, paa Stranden ved Sydhavnen, København. Om den var skudt blev ikke afgjort.

HALFDAN LANGE

### Hættemaagerne, *Larus ridibundus*, ved Nakkebølle.

1934 ynglede som sædvanlig Tusinder af Hættemaager i Inddæmningen ved Nakkebølle, men deres Reder laa dette Aar mest paa tørt Land, saa man kunde gaa til dem; ellers plejer Hovedmassen at ligge ude mellem Rørene. Grunden til Forandringen er vistnok, at Vandstanden i Inddæmningen er steget betydeligt. — I de 26 Aar, jeg har boet her, er det aldrig hændet, at Hættemaagerne er kommen herind paa Sanatoriets Grund, d. v. s. de flyver daglig herover, og en sjelden Gang har jeg set en i min Hønsegaard. Ude i Stranden laa ofte nogle ret tæt ved Strandbredden, men i det hele var de ret sky, undtagen paa selve Ynglepladsen, og Forsøg paa at fodre dem som i København er aldrig lykkedes tidligere. — 1934 var Forholdet anderledes; fra sidst i Maj begyndte de at gaa ned i den indhegnede Hønsegaard, og fra lidt hen i Juni kom de i Flokke ind ved selve Sanatoriet. I min Dagbog for 19. Juni staar der: »De sidder paa Taget, gaar i Plænerne og flyver omkring Bygningerne overalt, hvor de kan vente at finde lidt Føde. Det er et smukt Syn at se dem mod de grønne Træer, men jeg frygter for, at de skal finde ned i Køkkenhaven og anrette Ødelæggelser der. [Dette gjorde de imidlertid ikke — besynderligt nok.] De er ganske tamme paa samme Maade, som man ser det i København om Vinteren. De gaar og samler møjsommeligt en Bid paa de afsvedne Plæner og styrter sig skrigende flokkelvis over Føde, der kastes ud til dem.« De vedblev at holde sig her til over Midten af Juli, saa forsvandt de, drog med Ungerne ud til Øerne. I Begyndelsen af Juli saa jeg dem jævnlig flyvende højt i Luften og ude over Vandet, rimeligvis paa Insektfangst.

Grunden til Hættemaagernes Optræden i 1934 blev naturligvis drøftet, og der er næppe Tvivl om, at den var Mangel paa Føde. De udtørrede Marker og Græsgange indeholdt vel ikke de Insekter og Larver, som de for en stor Del lever af. Der er ogsaa opstillet den Formodning, at deres Sult for en Del skulde skyldes den Sygdom, som næsten har udryddet Bæn-

deltangen og dermed det Smaadyrliv, som holdt til her. I Begyndelsen af Juli laa hel- og halvvoxne Unger døde i Inddæmningen, men uden Tegn paa Sygdom; de var formodentlig døde af Sult.

Jeg troede, at Maagernes Optræden her ved Sanatoriet var et lokalt Fænomen, men da jeg midt i Juni kom til Bogense, blev det mig fortalt, hvorledes Maagerne i stor Mængde søgte ind til Byen, hvad de ganske vist var begyndt paa Aaret før, men ikke i tilnærmelsesvis saa stor Mængde; der fandtes Masser af dem inde i Gaderne. Da jeg nogle Dage senere kom til Horsens, berettedes mig dér det samme, hvorledes Hættemaagerne, hvad man aldrig havde oplevet før, slog sig ned i Gaderne. — Antagelig har man kunnet iagttage noget tilsvarende over hele Landet.

O. HELMS

### **Gulbenet Sølvmaage, *Larus argentatus* »cachinnans«, og Sildemaage, *L. fuscus*, i Sortedamssøen.**

En Flok gamle og unge Sølvmaager, ca. 10 ialt, opholdt sig paa 3 forskellige Dage med uroligt Vejr (ca. 10., 15. og 20. Marts 1934) i Sortedamssøen, København. Naar de stod paa det kunstige Stenrev, saa man tydeligt de voksnes gule Fødder, undertiden lige ved Siden af voksne Sølvmaager med de sædvanlige kødfarvede Fødder.

Sildemaager blev i ringe Antal ofte set i Søen fra Februar til midt i Maj.

FRK. GRÜNER

### **Om Forekomsten af Spidshalet Kjove, *Stercorarius parasiticus*, ved den danske Skagerrakkyst.**

I flere Aar har jeg regelmæssigt iagttaget Kjover ved Tannisbugten i Juli—August Maaned. Sædvanlig færdedes Fuglene enkeltvis eller 2 sammen, men i 1934 var der særlig mange, og jeg iagttog ofte 4 eller 6 Stykker samtidig, som Regel jagende fiskende Terner, idet 2 à 3 Kjover ofte forfulgte samme Terne, indtil denne afleverede Byttet. — Kjoverne var i alle Tilfælde ensfarvede, mørke Individider.

I. C. ANDERSEN

### **Optegnelser om Storke, *Ciconia ciconia*, fra Jylland.**

22. Juli 1934 ved Middagstid gik en Flok Storke paa ca. 50 paa en Eng ved Skaarup Odde paa Hannæs. Om Aftenen var

de borte, men næste Morgen, 23. Juli, kredsede 42 Storke i ca. 1 Kilometers Højde over Skaarup By. Siden viste de sig ikke.

ARTHUR CHRISTIANSEN

Det i D. O. F. T., 1933, S. 99, omtalte Storkepar, der overvintrede paa Møllen ved Tingstedholm, egentlig Gjedved Mølle, var i Foraaret 1933 ualmindelig tidligt paa Færde med Rugningen. Ungerne vare allerede store i Begyndelsen af Juni. Storkeparret har ogsaa overvintret i Vinteren 1933—34.

En Aften i Sommeren 1933 kom 5 Storke og tog Natteophold paa en Gaard paa Taaning Mark. For om muligt at faa dem til at fæste Bo, blev der Dagen efter stillet Redemateriale op paa et af Husene; men Storkene kom ikke igen, da de først vare rejste.

R. P. RANDLØV

#### **Skarverne (*Phalacrocorax carbo*) i Nakskov Fjord.**

Et af de Steder, hvor Skarven med Sikkerhed træffes Aaret rundt, er Indsejlingen til Nakskov Fjord. De sidder i større eller mindre Antal paa Bundgarnspæle og fjerner sig, saa snart Damperen kommer i nogenlunde Nærhed. Jeg har aldrig set saamange, som da jeg 16. August 1934 kom sejlene ind til Nakskov; der var mindst 50, som sad rundt om paa Bundgarnspælene, medens nogle fløj ind paa en af Holmene og slog sig ned sammen med nogle Svartbage, *Larus marinus*.

O. HELMS

#### **Suler, *Sula bassana*, fra Sjælland.**

13. Oktober 1934 blev en udfarvet Sule, Han, skudt af en Fisker paa Stranden ved Liseleje.

En afmagret, voksen Sule, Hun, blev indleveret fra Jægerspris, Hornsherred, til Udstopning hos Konservator KAUERAUF; den var død ca. 18. Oktober 1934. Fuglens Mave var næsten tom, indeholdt dog noget Tjære og en Stump tjæret Fiskesnæt, omtrent 5 smaa Masker, samt en lille Træsplint paa 3 cm.

HALFDAN LANGE

#### **Kongeørne, *Aquila chrysaëtos*, i Krengerupskovene, Fyn.**

I Vinteren 1932—1933 havde Krengerupskovene, tilhørende Lensgreve CHR. RANTZAU, Besøg af ikke mindre end 3 Konge-

ørne. — Ved Juletid rygtedes det, at der var set en mægtig Rovfugl i Kalkerupskoven, som danner det sydligste Afsnit af Krengerupskovene, og da jeg i den Anledning gik en Tur over mod Skoven, var jeg saa heldig i en Pløjemark lige udenfor Skovbrynet at se en stor Fugl, ivrigt optaget af at æde et eller andet Bytte. Langs et Hegn listede jeg mig henimod den, til jeg i en Afstand af ca. 100 m kunde konstatere, at det ikke kunde være andet end en Ørn. Medens jeg stod og betragtede Fuglen, littede den og svævede i store Kredse ind over Skoven; den satte sig snart efter i et stort Egetræ i Skovens Udkant. Jeg gik ud paa Marken for at se, hvad der havde optaget Ørnen saa stærkt, at den nær ikke havde opdaget mig, og fandt Aadslet af en lille Gris; det laa midt paa en Plads, hvor Jorden var traadt fast paa et Areal af flere Kvadratmeter.

Nu gik jeg hver Dag en Tur over til Skoven og opdagede snart, at den omtalte Eg var Ørnens faste Opholdssted; her sad den Morgen og Aften, dækket i Ryggen af Skoven og med vid Udsigt over Søholms Marker. Naar jeg paa mine Ture ikke var saa heldig at se Ørnen, saa jeg altid dens Spor i Form af Rester af Fasaner, den havde ædt. En Dag fik jeg Forklaringen paa de mange Fasanskeletter: Ørnen var ikke alene; højt oppe over Kalkerupskoven svævede 2 Ørne i store Kredse rundt om hinanden, som det forekom mig, næsten uden at bevæge de vældige Vinger med de spredte Svingfjer. Særlig sky var Fuglene ikke; ofte listede jeg mig ind paa dem, naar de sad i Egen, til en Afstand af ca. 50 m, og da der en Dag var Klapjagt netop i det Afsnit af Skoven, hvor Ørnene holdt til, saa man den ene af dem stige til Vejrs og i rolige Kredse forlægge Residensen til et skovbevokset Voldsted ved Søholm Sø. — Men samme Dag, som jeg saa de to Fugle over Kalkerupskoven, blev en tredie fundet dræbt af Stærkstrømmen ikke langt fra Krengerup Slot. Sagkyndige mente, at det var en ung Hun; Vingefang 170 cm, Længde fra Næb til Halespids: 80 cm. Den havde ligget saa længe, at den ikke lod sig udstoppe<sup>1</sup>.

Sidst i Januar 1933 forlod Ørnene Krengerupskovene, men samtidig meldtes det, at 2 Ørne holdt til paa den lille Ø Lin-

<sup>1</sup> Af Pladshensyn er et tilligemed Optegnelserne indsendt Fotografi af denne Kongeørn ikke reproduceret. (Red.)

derum udfør Mundingen af Haderslev Fjord, hvor de decimerede den store Bestand af vilde Kaniner.

MOGENS BISGAARD

### Optegnelser om et Par unge Hvepsevaager, *Pernis apivorus*.

2 Unger opholdt sig endnu ved en Rede, som jeg fandt i Auderød Skov ved Frederiksværk 26. August 1934; de kredsede over Redetræet og slog flere Gange ned paa selve Reden. De gamle Fugle saa jeg ikke noget til, skønt jeg opholdt mig i Skoven hele Dagen. Ungernes stadige Interesse for Reden var mig derfor noget paafaldende. Efter mine tidligere Iagttagelser forlader de ellers gerne denne samtidig med Forældrene.

Jeg undersøgte Reden og fandt en Mængde Stykker af itu-hakkede Hvepseboer; nogle af dem var helt nye og indeholdt friske Larver. — Det var derfor, Ungerne havde saa travlt oppe i Reden; de var som smaa blevet fodret af Forældrene med Kager fra Hvepseboer, og nu havde de øjensynlig selv bragt nogle saadanne op i Reden for der i Ro og Mag at pille Larverne ud.

N. H. JENSEN

### Iagttagne Kærhøge.

21. April 1931 iagttog jeg en Rørhøg, *Circus aeruginosus*, der fløj mod Øst langs Strandbrinken ved Gumperup ved Karrebæksminde.

ERIK ASKEGAARD

26. Marts 1932 blev en Rørhøg set fra Toget; den fløj i Nærheden af Jernbanen ved Gedser.

E. HORNEMAN

I Vinteren 1926 saa jeg ofte en Blaa Kærhøg *Circus cyaneus*, over Markerne ved Brabrand Sø.

CHR. KRÜGER

### Iagttagne Fiskeørne, *Pandion haliaetus*.

12. April 1931 saa Mekaniker VIGGO PRIOR en Fiskeørn i Esrom Sø; den fiskede og tog en mindre Fisk. — I Marts—April 1932 saa samme Iagttager atter en Fiskeørn i Esrom Sø. Det var en smuk lys Fugl med lyse Bukser. Den sad paa Isen ved

en Vaage og havde nogle Fiskerester spredt omkring sig. Af og til hoppede den et Stykke med halvt spredte Vinger. Der var Ænder i Nærheden, men disse viste ingen Frygt, og flere Krager bevægede sig omkring for at æde Fiskeresterne.

Ifølge flere Aviser opholdt en Fiskeørn sig ved Søndersø i 3 Uger indtil ca. 4. Oktober 1933. 17. September saas den af C. E. GEDE.

16. September 1934 hvilede en Fiskeørn paa en Telefonpæl ved Plantagen nær ved Blaavand (Oxbøl), meddeler Tandtekniker H. ERLANDSEN, Esbjerg. HALFDAN LANGE

Ved Gurre Sø saas 2 Fiskeørne, som begge fiskede, 3. September 1932. ASGER DITLEVSEN

17. August 1934 saa jeg ved Østkysten af Falster (Pomlenakke) ganske nær ved Kysten en Fiskeørn, der snart forsvandt i Retning sydpaa.

I Begyndelsen af September 1934 meddelte Købmand LAURITZ NIELSEN, Faaborg, mig, at man daglig kunde se en Fiskeørn i den store Mosestrækning »Sundet« ved Faaborg. Jeg fik først Lejlighed til selv at se den 28. September. Medens jeg stod og spejdede efter den, kom den flyvende og slog ned efter en Fisk, som den fløj bort med op til en Hegnspæl paa Marken, hvor den satte sig og fortærede Fisken. 1. Oktober saa jeg den igen flere Gange herude, kredsende omkring i Luften over Sundet. — Opholdsstedet her maa være udmærket for den; der er en Mængde Fisk i det fladvandede Sund, og umiddelbart op til dette ligger et Par mindre Skove. — Lidt hen i Oktober forsvandt Fuglen. I den sidste Tid af dens Ophold paa Stedet skal der være set 2 sammen. O. HELMS

27. September 1934 trak en Fiskeørn over Amager med vestlig Kurs. Den blev staaende et Øjeblik med blafrende Vinger over Kalveboderne, inden den fortsatte i Retning af Kammerlusen ved Badeanstalten »Sønderstrand«.

THORVALD FRØLICH

### Turteldue, *Streptopelia turtur*.

Førstelærer G. THOMSEN meddeler, at en Turteldue, mærket »Fanø ca. 1900«, findes udstoppet i Sønderho Skolesamling.

HALFDAN LANGE

### Optegnelser om Huldue, *Columba oenas*.

Det synes i det hele, at Antallet af Hulduer i Jægersborg Dyrehave er taget til næsten hvert Aar siden 1926; Allikerne er snarere taget en Del af. 1931 ynglede der navnlig mange Hulduer ved »Medaillehullet«. Da de to Arter jo yngler under ens Forhold, kan man næppe give Egernet Skylden for Allikernes Aftagen, og den stærke Forfølgelse af Egern i 1934 har ikke forårsaget nogen Forandring. Hulduernes Antal var det samme i 1934.

K. LØVENBORG

I Aarene 1926—1929 har jeg gentagne Gange set Hulduer i Frijsenborgskovene, hvor der yngler nogle Par.

CHR. KRÜGER

### Optegnelser om Ringdue, *Columba palumbus*.

Som det kunde ventes efter det rige Oldenaar, hvortil kom den milde Vinter, overvintrede en Mængde Ringduer 1933—34. I Smaaskovene ved Taaning opholdt sig til Stadighed 2—300 Stykker i større eller mindre Flokke.

Resterne af en Ringdue med Vortesyge fandtes 3. December 1933 ved Hem. Den var taget og delvis fortæret af et eller andet Rovdyr.

R. P. RANDLØV

### Iagttagne Natravne, *Caprimulgus europaeus*.

I Maj 1932 iagttog JESPER CLEMENSEN, Hørdumsgade, en gammel Fugl med hvid Plet paa Vingen paa Vestre Kirkegaard, København; den fløj flere Gange op fra Jorden.

25. August 1932 blev en Natravn skudt paa Amager Fælled. Den blev bortkastet, fordi den var fredet, af Arbmd. HERMAN HANSEN, Mjøsensgade.

HALFDAN LANGE

En Natravn sad paa Spidsen af en Pæl ved Engen tæt ved »Nordby Køje« paa Fanø 3. August 1934.

EGEDE ANDERSEN

### Iagttagne Isfugle, *Alcedo atthis ispida*.

13. August 1921 iagttog jeg en Isfugl i Mosen i Trørød, Vedbæk. Jeg fulgte den 2 Gange rundt om Mosen (Omkreds ca. 300 m) og saa den flyve op og sætte sig flere Gange. Næste Dag var den borte.

K. LØVENBORG

Februar 1929, i den haarde Kulde, holdt en Isfugl længe til ved den store aabne Grøft i Ermelunden. ASSISOFF

8. August 1931 saas en Isfugl flyve over Dammen i »Nordby Køje« paa Fanø. Man sagde, at den havde opholdt sig der i nogen Tid. A. JØRGENSEN, fhv. Apoteker

6. September 1932 saas en Isfugl, der skrigende fløj over en lille Skovsø med lavt Vand inde i Jonstrup Vang. EGEDE ANDERSEN

28. August 1933 iagttoges et Eksemplar ved Kolding Fjord. FRK. GRÜNER

11. September 1933 saa jeg en Isfugl flyve langs Mølleaaen, nedenfor Raavad. P. L. JØRGENSEN

Ifølge LARS ANDERSEN, Skotlandsgade 9, opholdt en Isfugl sig i Efteraaret 1933 i længere Tid ved Skydebanerne paa Amager. HALFDAN LANGE

16. November 1933 saa jeg en Isfugl flyve ved Voldgraven i Nyborg. ALEXIS HORNEMAN

23. Juli 1934 færdedes en Isfugl i en lille Granplantage ved Byholm paa Hannæs. Den fløj nogle Gange frem og tilbage over et dybt, næsten udtørret Vandhul, men syntes ikke at tænke paa Fiskeri, og den gemte sig, naar jeg rørte mig. I de følgende Dage var den forsvundet. — Om Vinteren er Isfugle ikke sjældne ved Kanalerne. ARTHUR CHRISTIANSEN

26. September 1934 fløj en Isfugl over Kanalen tæt ved Frederiksdal. ASGER DITLEVSEN

### Iagttagelser over Gøg, *Cuculus canorus*.

28. Juni 1934 fandt jeg i et mindre Mosehul i Holte en Rede af Rørsangeren, *Acrocephalus scirpaceus*, uden Redeæg, men med et meget lille, lyst Æg af Gøgen. 3. Juli var der kommet 2 Redeæg samt et betydelig større Gøgeæg af en noget lysere



Farve. Det første, lille, Gøgeæg var ikke mere i Reden og var formentlig fjernet af den anden Gøgehun, som lagde det større Æg.

AXEL KOEFOED

Saa sent som 28. August 1934 kukkede en Gøg flere Gange i et Hegn ved Tømmerby Fjord i Hanherred.

En Gøgeunge, som fløj fra en Rede af Engpiber, *Anthus pratensis*, 6. Juli 1934, blev endnu 15. Juli fulgt overalt og maadet uafbrudt af en af Engpiberne.

ARTHUR CHRISTIANSEN

### En Flok Vendehalse, *Jynx torquilla*.

Ifølge Forstkandidat PLOVHELD kom i August 1929 en hel Flok Vendehalse, maaske 10 ialt, paa Besøg ved Springforbi. Da ingen paa Statens Forsøgsstation for Skovbrug kendte disse Fugle, blev en af dem skudt af en Studerende. Den blev artsbestemt og kastet bort.

HALFDAN LANGE

### Grønspætter, *Picus viridis virescens*, ved Frijsenborg.

I 1926, 1927 og 1928 saa jeg flere Gange Grønspætten i Skovene omkring Frijsenborg. Det er mit Indtryk, at mindst 3 Par holder til der.

CHR. KRÜGER

### Stor Flagspættes Parring.

14. Maj 1933 saa jeg i Brakker Skov et Par Flagspætter parres. Hunnen sad i lodret Stilling paa en lodret Gren. Under selve Akten syntes Hannen at klamre sig til Hunnens Ryg, men den bevægede samtidig Vingerne hurtigt. Umiddelbart efter Parringen fløj Hannen bort, mens Hunnen blev siddende.

AXEL HOLM

### Nøddekriger, *Nucifraga caryocatactes*.

Ifølge Meddelelse fra Konservator KAUERAUF, København, blev 2 Nøddekriger med Haleplet over 2,5 cm indleveret til Udstopning ca. 15. og 29. Oktober 1931. Det har muligt drejet sig om den østlige Race: *N. c. macrorhynchus*.

Hr. OTTO HØFFDING, Classensgade, meddeler, at en Nøddekrige blev set paa ganske nært Hold 22. November 1931 i et Nøddehegn ved Bagsværd Sø.

HALFDAN LANGE

**Krage, *Corvus corone cornix* (> *corone*), og Skade, *Pica p. pica*, paa Ribeeøen.**

I Forsommeren 1930 indsamledes i Ribe af Jagtforeningen Æg til 5 Øre pr. Stk. og Fødder til 10 Øre pr. Par. Købmand STOCKHOLM SIMONSEN meddeler, at det samlede Antal blev 527 Æg og 449 Par Fødder af Krager og Skader.

HALFDAN LANGE

**Silkehalen, *Bombycilla garrulus*, ved Gilleleje i Vinterhalv-aaret 1932—1933.**

I Tilknytning til Dr. phil. P. JESPERSEN'S Arbejde (D. O. F. T., 1934, S. 14—25) skal jeg fremkomme med nedenstaaende Meddelelser.

Oktober. — 22. saas Silkehalen første Gang i Gilleleje By (8 Eksemplarer). — 26.: Ca. 25 i Kirkegaardens Træer. — 27.: 5 + 10 i Gilleleje By. — 30.: 3 Flokke, hver paa over 20 Stykker ved Nakkehoved og 5 Stykker i Granskoven (Gilleleje). — 31.: 2 i Granskoven og 5 i Byen.

November. — 6.: 10 ved Nakkehoved. — 7.: En Flok + 4 i Byen. — 14.: En Flok paa ca. 50 i Byen og 10 i et Træ ved Nakkehoved. — 15.: 2 ved Skolen. — 16.: 2 ved Kanalen. — 18.: Ca. 10 ved Nakkehoved + 3, der spiste Bær sammesteds. — 20.: 1 ved Gilbjerg. — 21.: 1 i Byen og 1 ved Nellerup. — 23.: 3 + 2 i Byen. — 26.: 2 Flokke paa over 15 Stk. hver ved Kanalen i Gilleleje. — 29.: 3 ved Kanalen, 2 + 3 + 4 i Byen. — 30.: 2 i Byen.

December. — 1.: 2 i Byen, 1 i Munkerup. — 11.: 1 sov om Eftermiddagen i et Træ i Byen, 3 saas ved Kanalen. — 13.: 7 Stykker ved Kanalen, Gilleleje; de aad Frugterne af Røn, Slaaen, Hyben og Tjørn og gylpede Frøene op. — 17.: 1 i Byen. — 20.: 1 i Byen. — 26.: 6 i Fjellingstrup.

Januar. — 1.: 4 i Søborg By. — 5.: 3 i Byen (Gilleleje). — 7.: 6 i Byen, 1 i Fjellingstrup. — 8.: 4 i Granskoven, 10 + 1 i Byen. — 12.: 1 i Byen, 2 ved Kanalen. — 24.: 1 ved Aaleki-stebro (Søborg), 2 ved Kanalen. — 25.: 2 i Byen. — 29.: 2 i Fjellingstrup. — Hele Maaneden holdt 2—4 til i Munkerup; de saas æde Rønnebær.

Februar. — 3.: 2 paa Kirkegården, 1 ved Nakkehoved, 2 i

Munkerup. — 4.: 2 + 2 i Byen. — 5.: 2 i Byen. — 7.: 2 i Byen. — 18.: 1 + 1 + 1 i Byen. — 28.: 1 i Byen.


Marts. — 6.: 2 i Byen. — 17.: 5 i Kirkegaardens Træer. — 19.: 1 i Byen; dette er sidste Dag, Fuglen blev set her.

Det synes ifølge ovenstaaende, at det største Antal Silkehaler har opholdt sig paa Egnen fra sidst i Oktober til sidst i November 1932. Fra Midten af Januar 1933 var her kun faa.

H. C. TERSLIN

### Albinoer af Forstuesvale, *Hirundo rustica*, og mærkelig Redebygning af samme.

Paa Demstrup Hovedgaard pr. Havndal iagttoges i Efter-sommeren 1933 3 hvidgraa Unger af Forstuesvalen. Disse Albinoer tumlede sig mellem mange normale Frænder, der absolut ikke syntes at ænse den afvigende Farve. Der var i alt Fald ikke Tale om nogen Forfølgelse. — Atter i 1934 er der iagttaget en saadan Unge af Forstuesvalen her; den syntes nærmest flødefarvet. Begge Aar er Albinoerne først set efter at have forladt Reden.



Skitse af en Rede af Forstuesvale, *Hirundo r. rustica*, paa en hængende Staldlampe.

Forøvrigt har jeg i 1934 set et morsomt Eksempel paa en aparte bygget Forstuesvalerede. Et Par Forstuesvaler byggede Rede paa en frithængende, elektrisk Staldlampe. Da Redens Vægt fik Lampen til at hælde, byggede Svalerne en Kontravægt, saaledes at Reden igen kom i normal Stilling. [Se hosstaaende Figur.]

FR. THYE

### Sent Kuld af Forstuesvale, *Hirundo rustica*.

3. Oktober 1934 saa jeg et Par Forstuesvaler made Unger i en Port i Hillerød.

KR. BARFOD

### Bysvale, *Delichon urbica*, paa Taaningeegnen.

D. O. F. T., 1933, S. 101, skrev jeg, at Bysvalen var i stærkt Aftagende. For nogle Aar siden kom et Par Bysvaler til en

Gaard paa Taaning Mark og byggede Rede. De havde Held til at yngle, og der er efterhaanden blevet en lille Koloni. 1933 var der 9 beboede Reder.

R. P. RANDLØV

### Mægtige Flokke af Stære, *Sturnus vulgaris*, ved Boserup Sanatorium.

I en Periode af August og de allerførste Dage af September 1934 var vi her fra Sanatoriet hver Aften nede ved Kattingsø for at beundre de umaadelige Stæreflokke; »millionvis« er vel nok lidt overdrevent, men at Antallet enkelte Dage har nærmet sig Millionen, kan næppe betvivles. I Løbet af ca. 2 Timer ved Solnedgangstid blev der ved med at komme store Flokke flyvende fra alle Verdenhjørner. Flokken svævede først som en Sky med varierende Former en Tid over Søen, saa pludselig »regnede« Stærene ned i Rørene som et sandt Skybrud, og de sad ikke, som jeg tidligere har set, 1—2 Stære paa hvert 4.—5. Rør, nede mellem Rørene. Nej, der sad 5—10 Stære paa næsten hvert eneste Rør, helt op til Toppen, saa at Rørene blev helt bøjet ned, og Rørene saa ganske ud som en Kornmark, der er pisket ned af en stormfuld Regnbyge; Stærene saas i store Flager, liggende som sorte Snedriver rundt om i Rørene. — I de første Dage af September var der meget færre Fugle end i August.

Efter at jeg i nogen Tid ikke havde set efter Stærene, var jeg 7. Oktober Kl. 16<sup>3</sup>/<sub>4</sub>—17<sup>3</sup>/<sub>4</sub> atter ved Kattingsø. Først var der kun enkelte Smaaflokke, men efterhaanden kom der flere og flere. Den mest imponerende Flok var en lang Falanks, hvis bageste Ende endnu var Syd for Kattingsø, mens den forreste Ende var lidt Nord for Søen; d. v. s. at Længden var ca. 2 km; Bredden skønnede vi at være ca. 200 m og Højden ca. 50 m. Det er overordentlig vanskeligt at skønne nogenlunde om Antallet, men jeg regner, at der var henimod 1 Million. Stærene fløj først en Tid om i større og mindre Flokke og satte sig af og til i de høje Træer, der staar ved Søen, hvor de lavede et forfærdeligt Spektakel; af og til fløj de ned paa en nærliggende Mark, der har Form af en lille Høj, og denne lignede da ganske et lille Kulbjerg. Efterhaanden fløj de nu ned i Rørene ved Søbredden, og det mærkelige var, at de ikke spredte sig saa meget,

som man skulde synes var rimeligt; de samlede sig i den nordøstlige Side af Søens Rør, og her sad de igen saa tæt, at de dannede en stor, sort Flade paa ca. 200 m's Længde og ca. 50 m's Bredde. I dette Omfang var alt sort næsten uden lysere Mellemlum. Pudsigt nok sad der lige i Midten en helt hvid Stær, der ogsaa skinnede imellem Stærene, naar de løftede sig i Flok. Naar de fløj omkring i Flok, lød det som et Vandfalds Brusen. — Der var mange Tilskuere til dette sjældne Syn, baade her fra Egnen og fra Roskilde, hvorfra Bilister og Cyklister var strømmet til.

Hver Morgen Kl. 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> [første Uge af Oktober 1934] havde vi det smukke Syn af Stærene, der omkredsede Sanatoriet. Det lød som et voldsomt Stormsus, naar de for forbi, men de spredtes ret hurtigt i Smaaflokke, som forsvandt i alle Verdenhjørner. Kun et mindre Antal satte sig i Træerne i Sanatoriehaverne og flagrede om ved Sommerens Stærekasser, som de nu og da aflagde en kort Visit.

N. J. STRANDGAARD

### Iagttagelser af Topmejser, *Parus cristatus mitratus*, paa Fyn og i Jylland.

18. Juli 1933 iagttoges en Topmejse ved Lundeborg, Sydøstfyn. Fuglen sad paa en Telefonsnor; den fløj i en Bue ud over Vandet og satte sig atter paa Snoren for derpaa at flyve til en lille Plantage i Nærheden.

JAN BOËTIUS

Under Henvisning til TH. KJÆR's Meddelelse (D. O. F. T., XXVI, 1932, p. 156) angaaende Topmejsens Forekomst paa Aarhusegnen, kan jeg oplyse, at 2 Topmejser indfandt sig i en Villahave i Brabrand Bakker i Vinteren 1927—1928. De følgende 2 Somre ynglede Fuglene paa denne Lokalitet. 1928 saa jeg dem med Unger, og 1929 fandt jeg Reden.

CHR. KRÜGER

### Drosselrørsanger, *Acrocephalus a. arundinaceus*, i Utterslev Mose ved København.

I September 1931 blev en Rede taget tæt ved en Klaring, meddeler ASGER FOG, Svend Gønges Vej 8. I en Del Aar er Fuglen ikke bemærket her, men maa i hvert Fald have ynglet nævnte Aar.

HALFDAN LANGE

**Misteldrosler, *Turdus v. viscivorus*, i Nordsjælland.**

25. Maj 1931 jagede en Misteldrossel snerrende efter en Musevaage, som strøg lavt over Bøgetræerne i Grib Skov, ret nær Nøddebo. Senere fløj en anden — eller mulig samme Fugl — over en ung Birkeopvækst et Stykke derfra.

Ved Donse, Lillerød, sang en eller to 5. Juni 1931 om Formiddagen Kl. 9, men ikke Kl. 10 og Kl. 16. — Himlen var overtrukket hele Dagen.

HALFDAN LANGE

**Albino af Solsort, *Turdus m. merula*.**

En næsten hvid Solsort ♂ blev overgivet mig til Udstopning 27. Januar 1934; det blev opgivet, at den var taget af en Kat. 3 Svingfjer i den ene Vinge og 2 i den anden var sorte; den døde Fugl havde kun 8 Styrefjer, hvoraf 4 var sorte og 4 hvide; Underhaledækfjerene var sorte, mens Overhaledækfjerene var hvide. Paa Ryggen, Brystet og Bugen var der enkelte, spredte, sorte Fjer; ellers var Fuglen ganske hvid. Den havde opholdt sig i den nordøstligste Del af Tørring Stationsby, hvor jeg ofte havde set den, første Gang 6. Februar 1933. Foråret 1934 har den sikkert ynglet; i Slutningen af Maj saa jeg den nemlig paa en Havegang i Færd med at samle Føde, som den derefter bar ind i et tæt Buskads.

AKSEL JACOBSEN

**Sortstrubet Bynkefugl, *Saxicola torquata rubicola*, paa Bornholm og Amager.**

13. Juli 1934 saa jeg en Sortstrubet Bynkefugl ♂ i Ølene, den var sammen med 4—5 andre Bynkefugle, ♀ og unge Fugle, men om disse var af samme Art, tør jeg ikke afgøre. ♂ er sikker. Da jeg kom igen næste Dag efter at have sat mig nærmere ind i Sagen, var de borte.

EDG. MADSEN

I Slutningen af August 1933 saa jeg en Sortstrubet Bynkefugl paa Taarnby Fælle. Fuglen, en gammel Han, var ikke mere end et Par Meter fra mig, saa der var ingen Vanskelighed ved at bestemme den.

THORVALD FRØLICH

**Ynglende Rødstjerte, *Phoenicurus phoenicurus*.**

D. O. F. T., XVIII, 1924, S. 5—12, berettede jeg lidt om Rødstjertens Ynglen her i Landet; den havde da 2 Aar i Træk,

1922 og 1923, ynglet ved Sanatoriet ved Nakkebøllefjord, det sidste Aar i min Have. Siden har jeg ikke truffet den ynglende før iaar, 1934. Sidst i Juni fandt jeg i Haven tæt ved min Bolig Reden af den; en Mejskasse, der var ophængt paa et Egetræ, var efterhaanden bleven til en halvaaben Kasse, og her havde Rødstjerten lagt 6 Æg. Reden var bygget af Mos og Bregneblade, foret med fine Plantetrevler, enkelte Haar og lidt Vat. Fuglen forlod Reden, før Æggene var udrugede, og det lykkedes mig ikke at finde den rugende andetsteds i Nærheden.

O. HELMS

2. Maj 1934 byggede et Par Rødstjerte i min Have i Holte, i en ophængt Stærekasse, hvor de senere fik et Kuld Unger ruget ud. Fuglens smukke Sang hørtes meget lidt i hele Yngle-tiden; jeg bemærkede, at Hannen sang mest tidligt om Morgen, ved 5-Tiden, hvorimod den saa godt som ikke sang om Dagen.

Jeg har set 2 andre Ynglepar af Rødstjerten i Holte; disse har ligeledes bygget i ophængte Fuglekasser og faaet Ungerne paa Vingerne.

Pastor KR. BARFOD har meddelt mig, at han 1934 har fundet 2 Par ynglende i Parkerne i Hillerød.

AXEL KOEFOED

### **Husrødstjert, *Phoenicurus ochruros gibraltariensis*, paa Lolland.**

Husrødstjerten blev i Juni 1931 set flere Gange ved Havnen i Nakskov. 16. Juli var Fuglen sammen med sine Unger.

ALEXIS HORNEMAN

### **Skærpiber, *Anthus spinoletta*, ved Midvintertide.**

14. Januar 1934 saa jeg en Skærpiber, der søgte Føde paa den opskyllede Tang i Svane møllebugten. Det foregaaende Døgn havde der været Snestorm.

CHR. KRÜGER

### **Overvintrende Gul Vipstjert, *Motacilla flava*.**

En Tid af Vinteren 1933—1934 opholdt en Gul Vipstjert sig ved Tørring, hvor jeg saa den ved Slaarupaa 3., 7. og 31. December samt 8. Januar.

AKSEL JACOBSEN

**Nordlig Vipstjert, *Motacilla flava thunbergi*, paa Saltholm.**

12. Maj 1934 saa Assistent E. PETERSEN og jeg 4 Nordlige Vipstjerte paa Saltholm. Fuglene, hvoraf 1 var en gammel Han, var i Flok med 4 almindelige Gule Vipstjerte.

CHR. KRÜGER

**Vinterforekomst af Hedelærke, *Lullula arborea*, paa Amager.**

I Forbindelse med FINN SALOMONSEN's Meddelelse (D. O. F. T., XXV, 1931, p. 140) om et Møde med Hedelærken paa Amager 3. Februar 1931 kan det maaske interessere, at jeg sammen med Læge KRABBE m. fl. 20. December 1925 Syd for Kongelunden saa 2 Hedelærker gaaende paa en Mark. De var i Modsætning til den af SALOMONSEN omtalte Flok aldeles ikke sky, men lod sig komme paa ca. 10 m's Afstand, saaledes at Top og Farver tydeligt kunde skelnes. Muligvis har de været noget forkomne, da Vejret var usædvanlig bidende med en isnende kold Blæst fra Sydøst og 5—6° Frost. Strandengene var omtrent islagte fra Højvande med Frost. — I SCHIÖLER's Liste over Danmarks Fugle (Danmarks Fugle, I, 1925, p. 236) omtales Arten ikke som delvis overvintrende, og mærkeligt er det, at disse 2 Fugle har modstaaet den netop i 1925 særlig haarde Frostvinter; i Begyndelsen af December var Temperaturen indtil ÷ 10—12°, ganske vist uden Sne af Betydning.

E. PETERSEN

**Grønsisken, *Carduelis spinus*, ynglende ved København.**

Mod al Forventning traf jeg Grønsiskenen ynglende i en Tjørn paa Fæstningsterrænet ved Husum. Der var 4 Æg i Reden, og ca. 28. Juni 1933 klækkedes heraf 4 Unger. Fuglen blev iagttaget ofte og paa meget tæt Hold, mens den rugede. Reden opbevares i Frk. Kruses Skole, St. Thomas Plads.

G. ASMUND

**Rede af Lille Korsnæb, *Loxia curvirostra*.**

Ifølge Meddelelse fra Stud. theol. P. F. B. HVORSLEV opdagede man i den strenge Vinter, Februar 1929, ved Hald Folkekuranstalt (Viborg) en Rede ca. 2,5 m over Jorden i et Grantræ.



Reden var bygget tæt ind til Stammen, og Korsnæbhunnen sad og varmede 4 Unger, som var saa store, at de flagrede ud. De blev fanget og undersøgt; de var gule med sorte Pletter.

HALFDAN LANGE

## ANMELDELSER

Prof. Dr. ERWIN STRESEMANN: Aves. Handbuch der Zoologie, Bind VII (Sauropsider) 2. Halvdel. Kwart, XI + 899 Sider, 944 Tekstfigurer. Walter de Gruyter & Co., Berlin og Leipzig, 1927—1934. — I April 1927 forelaa 1. Hefte af »Aves«, og med 8. Hefte, der udkom i Sommer, har dette glimrende Værk faaet sin Afslutning. For Tekstens Kvalitet borger Prof. STRESEMANN's Navn, som nok i Øjeblikket maa anses for det førende indenfor Europas Ornithologi.

STRESEMANN's Haandbog i Ornithologi er et Værk, som nu, da det er der, maa anses for uundværligt for videnskabeligt arbejdende Ornithologer i alle Lande, lige meget hvilken Gren af Ornithologien de dyrker; skal man se et eller andet udenfor sit snævrere Speciale, har man her en fortrinlig Vejledning, og ønsker man at vide mere end »Aves« giver, eller vil man se de originale Kilder, kan man søge i Litteraturlisten, der alene fylder 27 Sider, hvilket uvilkaarlig giver et Begreb om det kolossale Arbejde, som ligger til Grund for Værkets Udarbejdelse. Man finder Oplysninger om almene Forhold ved Fuglenes Anatomi og Fysiologi, Embryologi, Forplantnings- og Ernæringsbiologi, Stemme, geografiske Udbredelse, Trækforhold og Parasiter; endelig er der Afsnittet om Fuglenes Afstamning og Inddeling, der tilsammen fylder 125 Sider. I Fuglenes Klasse skelnes mellem 49 Ordener, men af disse er jo kun et Mindretal repræsenteret her i Norden. Ordningen af Stoffet er særdeles overskuelig; foroven paa hver Side angives, hvilket Hovedafsnit i Øjeblikket behandles, og i Margen anføres de mere begrænsede Emner.

Skade kun at Værket er saa kostbart: RM. 114,40 i Hefter og RM. 125,40 indbundet; omregnet til Danske Kroner faar man jo desværre for Tiden nogle andre, højere Tal at se. LØPP.

ALWIN PEDERSEN: Polardyr. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København, 1934. — I en pragtfuldt illustreret Bog meddeler Forf. en Række Iagttagelser, samlet under et 5 Aars Ophold i Østgrønland i Omraadet mellem Scoresbysund og Danmarkshavn. Efter et Forord gives en kort Beskrivelse af Landets Naturforhold. Herefter gaar Forf. over til Omtale af de forskellige Pattedyr, som træffes paa Land, i alt Fald til Tider (herunder saaledes Isbjørn og Hvalros).

Fuglene behandles paa 43 Sider. Fjældrypen, den Rødstrubede Lom