

ORNITHOLOGISKE IAGTTAGELSER FRA ET KORT OPHOLD PAA FÆRØERNE

AF

BERNT LØPPENTHIN

Da jeg deltog som Zoolog i Godthaabsekspeditionen til Nordøstgrønland i Sommeren 1930, blev der under et 3 Dages Ophold paa Færøerne d. 21.—23. Juni Lejlighed til et Par ornithologiske Ekskursioner, dels sammen med de Herrer Salomonsen og Møhl-Hansen til Østerø og dels alene i Thorshavns Omegn.

Af interessantere Iagttagelser kan nævnes følgende:

En Albino af Sildemaagen, *Larus fuscus graellsii*, iagttoges adskillige Gange i Thorshavns Havn, hvor den færdedes sammen med de normalt farvede Fugle, der i stort Antal fløj om mellem Skibene. Albinoen var hvid med gullige Vinger og Ryg, men iøvrigt var dens Størrelse og Vitalitet normal. Det var et fuldvoksent — eller næsten fuldvoksent — Individ.

Et Par km. Sydvest for Thorshavn saas et meget svagt pigmenteret Eksemplar af Skærpiberen, *Anthus spinoletta kleinschmidti*. Tegningen kunde skimtes, den var nogenlunde som en normal Skærpibers, men Fjerfarven var lyst graagul. Den omtalte Fugl var parret med et normalt farvet Individ, og begge hoppede iltert omkring i min umiddelbare Nærhed.

Omtrent sammesteds fandtes en endnu ikke helt færdigbygget Rede af Gærdesmutton, *Troglodytes troglodytes borealis*; den var anbragt ca. 3 m. over Jorden paa en Klippeblok, hvis Mosdække havde løsnet sig og saaledes afgav en ypperlig Redeplass. Begge de gamle Fugle fløj omkring og misbilligede i høj Grad min Interesse. Fareskriget lød som vor hjemlige Forms, men Sangen var — efter mit Skøn (jeg hørte kun denne ene ♂) — noget forskellig derfra; jeg syntes, den var knapt saa skingrende, som den jeg kendte i Forvejen.

Endelig saa Dr. Lauge Koch et Eksemplar af Rødstrubet Lom, *Colymbus stellatus*, sydøst for Strømø.