

Tornirisk, *Carduelis c. cannabina*, er alm. som ynglende.

Bjergirisk, *Carduelis flavirostris*, saas undertiden i Flokke paa Markerne, siddende i Toppen af forskellige Urter, hvis Frø de aad.

Svenske, *Chloris c. chloris*; er alm. som ynglende.

Dompap, *Pyrrhula p. pyrrhula*, er alm. Vintergæst.

Lille Korsnæb, *Loxia c. curvirostra*, og Stor Korsnæb, *Loxia pityopsittacus*, saas af og til om Vinteren i mindre Flokke sidde i Kronen paa Gran- og Fyrretræer for at udpille Frø af Koglerne.

## MOSEHORNUGLE, *Asio flammeus flammeus*,

### I NORDGRØNLAND

AF

FINN SALOMONSEN.

I Juni 1925 blev en Mosehornugle set i Jacobshavn i Nordgrønland. Fuglen blev nedlagt af en Eskimo, som ikke kendte denne fremmedartede Fugl, og udstoppet af Hr. Assistent Rose Bjare. Hr. Bjare meddelte mig, at Fuglen kom flyvende fra Syd og satte sig paa en Tagrygning. Den var ret mager, og Maven var fuldkommen tom.

Denne Forekomst er den 3die nordligste i Grønland. Mosehornuglen er, efter Winge, i 1884 set endnu nordligere, nemlig ved Umanak, og i Juni 1889 blev en skudt ved Søndre Upernivik. Sydligere i grønne Ejland, Sukkertoppen o. s. v. er den oftere set, og i det sydligste Grønland yngler den maaske.