

MINDRE MEDDELELSER

SAMMENSTILLEDE AF

BERNT LØPPENTHIN

Da jeg overtog Redaktionen, modtog jeg en Del mindre Meddelelser, og en Del andre er indkommet i Løbet af 1931 dels fra Medlemmer af D. O. F. dels fra andre Fugleinteresserede. Meddelelserne skyldes de Herrer: Dr. O. Christophersen, Sønder Omme; Kammerherre H. Collet, Gl. Køgegaard; fhv. Højesteretspræsident R. S. Gram, København; Apoteker Axel Holm, Egtved, Jylland; Stud. med. M. Ingerslev, Valby; Stud. mag. H. Jonassen, København; Stud. mag. Fl. Bolt Jørgensen, Charlottenlund; Lærer Hans Jørgensen, Aahøjrup pr. Brenderup; Assistent Th. Kjær, Aarhus; Kontorchef A. Koefoed, Holte; Dr. Edg. Madsen, Aakirkeby; Bagermester Hans Meinhardt, Vejle; Skolediscipel Ole Torrild Neel, Hellerup; Typograf C. Olsen, Nykøbing F.; Rentier Hans Pedersen, København; Assistent E. Petersen, Hellerup; Cand. pharm. S. Rasmussen, Hadsund; Stud. mag. Finn Salomonsen, København; Kaptajn G. v. Scholten, København; endelig har jeg selv meddelt et lille Udvalg, som jeg mener, har Interesse. — En Del indkomne Notitser af mindre Interesse er udeladt, og en Del er gengivet i en noget sammentrængt Form.

De smaa Iagttagelser, som de fleste Ornithologer noterer, har ofte stor Betydning, saa meget mere som de sjældnere kommer til Offentlighedens Kundskab, da Iagttagerne tit ikke ønsker at publicere Fundene paa anden Maade, og en kort Notits under nærværende Rubrik er ogsaa i Regelen fuldt ud tilstrækkelig. D. O. F.'s Medlemmer kan derfor ikke opfordres nok til at fremkomme med interessante Meddelelser, men de respektive Indsendere maa være fuldstændig sikre paa Fundenes Rigtighed; usikre Iagttagelser er ofte fejlagtige og kan ved noget ukritisk Behandling hurtigt blive til utrolige Krøniker, som det vil være til Skade at faa ind i vor ornithologiske Litteratur.

Red.

Stor Skallesluger, *Mergus m. merganser* L. — 19. Maj 1931 saa jeg ved Esrum Sø's Nordspids, ca. 30 m fra Land, en Stor Skallesluger ♀ med 12, 2 à 3 Dage gamle Ællinger. Da der er mange gamle, hule Træer og Stensætninger er der god Yngleplads for den.

H. Pedersen.

Lille Skallesluger, *Mergus albellus* L. — Følgende Iagttagelser fra København og Omegn: ♂ i Gentofte Sø 9. Marts 1913; ♀ i Sortedamssøen ved Dronning Louises Bro 1. Marts 1919; ♂ ad. i Øresund udfor Hellerup 19. December 1925. ♂ og ♀ sammen i Furesøen 2. Marts og 30. Marts 1928.

E. Petersen.

Blisgaas, *Anser a. albifrons* (Scop.). — En Flok paa 40—50 Individuer blev i Oktober 1921 iagttaget paa en Mark udenfor Næstved. En gammel og en ung Fugl, der begge udstoppedes, blev nedlagt.

C. Olsen.

Dværggaas, *Anser erythropus* (L.), skudt ved Randers Fjord. — Den 1. September 1930 skød en Fisker fra Hadsund en Gaas ved Mundingen af Randers Fjord. Den kom flyvende alene i temmelig stor Højde. Efter Hjemkomsten huggede han Hovedet af og plukkede Fuglen uden først at vise mig den. Jeg fik det afhuggede Hoved, som straks aabenbarede, at det var en Dværggaas. Ved en foretagen Kønsbestemmelse viste det sig at være en gammel Han, som altsaa nu desværre var gaaet tabt for en eventuel Opbevaring. Hovedet blev nu fotograferet ved Siden af et Centimetermaal, som gør det muligt at bestemme de forskellige Maal. Da det var Hensigten at skelettere Hovedet, blev dette koft; men det viste sig desværre at være ganske knust i Nakken, saa det ogsaa mislykkedes at bevare Kraniet. De forskellige Maal er:

Næblængde 35 mm, Næbbredde ved Roden 20 mm, Hovedets Længde 90 mm, Pandebliissens Længde 32 mm.

S. Rasmussen.

Bramgaas, *Branta leucopsis* (Bechst.), skudt ved Randers Fjord. — I Begyndelsen af November Maaned 1925 opholdt en lille Flok Bramgæs paa 5—6 Individuer sig i Engene ved Randers Fjord. Ud af denne Flok blev den 5. November skudt en Hun og den 9. November en Han.

S. Rasmussen.

Sortstrubet Lom, *Colymbus a. arcticus* L. — I November 1923 blev et Eksemplar i Sommerdragt skudt ved Falster.

C. Olsen.

Blishøne, *Fulica a. atra* L. — I den strænge Eftervinter i Februar og Marts 1931 saas et Fænomen, som sikkert aldrig før har vist sig. En Del Blishøns, som sandsynligvis for Vinteren havde slaaet sig ned paa Esrum Sø, blev nemlig, da Søen blev tillagt med Is, tvunget til at gaa op paa Markerne ved Kobæk Vig for at søge Føde. Mange fandtes døde paa de omliggende Marker, og de levende, kunde man se, var i yderste Nød.

Nedenfor skal jeg anføre nogle Optegnelser fra de Gange, jeg var derude:

17. Februar 1931: Blishønsene gik paa Græsmarken Vest for Vejen, de nærmeste i ca. 10 m Afstand. De tog intet Hensyn til Færdselen, som dog var temmelig stærk der; de saa temmelig kvikke ud og fjernede sig ned mod Søen, da vi stod af Vognen.

19. Februar: Ca. 400 gik paa Græsmarken Vest for Vejen, ca. 300 Øst for denne; de havde altsaa forceret Vejen.

23. og 26. Februar: Ca. 700 gik paa Græsmarken.

28. Februar: Blishønsene opholdt sig stadig paa Græsmarken, som nu omtrent var dækket med Sne, saa kun nogle fjorgamle Græsstubbe stak ovenfor. Stærkt Snefald hele Dagen over Nord-sjælland. Temperaturen var omtrent paa 0°.

4. Marts: Paa Markerne færdedes omtrent samme Antal som de foregaaende Dage.

7. Marts: De var nu mere spredte i mindre Flokke. Mange laa ned og spiste, tilsyneladende ganske udmattede. Enkelte saas stadig flyvende for at søge Føde. Jorden var meget sne-dækket; det var let Frost, men koldt.

10. Marts: Blishønsene blev fodret paa 3 forskellige Steder, og i Løbet af kort Tid gjorde de rent Bord. Foderet bestod af gammelt Brød og Korn. Nogle var nu saa udmattede, at de kunde tages med Hænderne. 1 blev bragt til Museet i omtrent død Tilstand og 1 leveret til Husmanden, som boede der; den blev anbragt i hans Kostald, hvor han havde nogle gaaende i Forvejen. De kom hurtig til Hægterne igen. Landskabet var nu fuldstændig dækket med Sne.

14. Marts: Stærkt Snefald 12. Marts og Natten mellem 12. og 13. Marts. Jorden var om muligt endnu mere snedækket. Let

Tøvejr. U. Møhl-Hansen talte ved Kobæk og paa Marken deromkring 88 døde Blishøns. Paa de andre Marker laa ogsaa en Del døde, saa Tallet var næppe under 150 ialt. Mange levende kunde tages med Hænderne; de saa nærmest ud til at være døende. U. Møhl-Hansen tog nogle med hjem; de kom hurtig til Kræfter og blev sat ud igen. Der indsamledes 15 døde Blishøns; deraf kom 11 til Zoologisk Museum, 4 til Landbohøjskolen.

17. Marts: Sneen var smeltet en Del, saa Halvdelen af Markerne var blottede. Dødeligheden var vist tildels ophørt.

21. Marts: Alle Blishønsene paa Markerne var stadig meget udmattede. Søen var endnu fuldstændig tillagt.

4. April: Mange Blishøns paa Markerne. Noget aabent Vand saas ved Kobæks Udløb i Esrum Sø.

6. April: Der taltes ca. 200 Blishøns; ca. 60 gik paa Marken og ca. 140 svømmede i det aabne Vand ved Kobæks Udløb i Søen. De 60 paa Marken saa elendige ud, de tog Vingerne til Hjælp, naar de skulde gaa; de andre i Søen saa ud til at klare sig godt nu.

14. April: 17 Blishøns saas paa Marken øst for Vejen ved Kobæk, kun 1 gaaende, Resten laa ned og furagerede; de tog Vingerne til Hjælp naar de flyttede sig. Mange Blishøns paa Søen, baade ved Kobæk og i Nordenden. De paa Søen fløj først op, naar man var dem meget nær, hvorpaa de nærmest faldt, naar de igen skulde gaa ned paa Vandet.

21. April: Blishønsene var ganske forsvundne fra Markerne; Søen var nu fuldstændig optøet.

Hvorvidt disse ca. 700 Blishøns var Træk nordfra eller Esrum Sø's Ynglebestand, er umuligt at udtale sig om, men hvis ikke lignende Fænomener er set ved den anden Side af Søen, kan det let være Ynglefuglene. Regner man 70 à 100 Reder fra Sommeren, kommer man til Tallet. At de ikke trak sydpaa havde vel sin naturlige Aarsag i, at deres Træktid forlængst var forbi.

Hans Pedersen.

Trane, *Megalornis g. grus* (L.). — En Trane, der havde brækket et Ben, blev i Oktober 1924 fanget ved Elkenøre, Østfalster.

C. Olsen.

Lille Præstekrave, *Charadrius dubius curonicus* (Gm.). — Undertegnede saa et Eksemplar af denne Art d. 11. Maj 1927 paa

det opfyldte Areal ved Islands Brygge. — 24. Maj 1927 iagttoges Arten gentagne Gange paa Vestsiden af Øland ved Limfjorden. — 2. Maj 1929 saas et Par ved et Vandhul paa Amager Fæled, lige Syd for Sundholm.

B. L.

Hvidbrystet Præstekrave, *Charadrius a. alexandrinus* (L.). — Saa tidligt som d. 14. Maj 1925 saas en ♀ med 3 nyudklækkede Unger paa Islands Brygge. 1927 fandtes et fuldlagt Kuld, hvorpaa ♀ rugede d. 29. April.

B. L.

Stenvender, *Arenaria i. interpres* (L.), paa Koklapperne ved Amager. — Arten iagttoges gentagne Gange i Forsommeren 1929, saaledes bl. a. 12. Maj og 1. Juni. Den sidste Dato saas tilige nogle Brushøns, *Philomachus pugnax* (L.), og paa Amager Fæled, indenfor Koklapperne, saas 2 Par Klyder, *Recurvirostra a. avocetta* (L.).

B. L.

Rødben, *Tringa t. totanus* (L.). — Den 23. Maj 1925 fandt jeg paa Tipperne en Rede, der var godt skjult i højt Græs. Fuglen rugede overordentlig fast og blev liggende til Trods for, at vi med en Stok bredte Græsset over den til Side og længe betragtede den. Inden vi forlod Stedet, dannede vi atter en Pyramide af Græsset om Reden, og Fuglen blev stadig liggende. Der har antagelig været meget rugede Æg eller lige udklækkede Unger i Reden.

Axel Koefoed.

[Ryle og Bekkasin holder ofte ret haardt paa Reden, men Rødben plejer oftest at forlade Reden paa langt Hold, ligesaa de paa mere nøgent Terræn rugende Vadefugle som Vibe, Klyde og Præstekraver.

Red.]

Dværgmaage, *Larus minutus* Pall. — En ung Fugl blev skudt ved Nykøbing F. 31. December 1929.

C. Olsen.

Splitterne, *Sterna s. sandvicensis* Lath. — 23. August 1931 iagttog jeg om Morgenen en Flok paa 5—6 Splitterner, som i Selskab med et Par almindelige Terner trak langs Bøtøs Kyst i sydlig Retning. Hen paa Eftermiddagen saa jeg atter 2 + 2 af samme Art, som fiskende fløj frem og tilbage mellem Bøtø og Ulslev Strand. Jeg har aldrig før med Sikkerhed iagttaget Arten her.

C. Olsen.

Spidshalet Kjøve, *Stercorarius p. parasiticus* (L.). — Et Eksempel blev i September 1923 skudt ved Frejlev Nakke.

C. Olsen.

Alk, *Alca torda* L., i Ferskvand. — Denne Art har jeg iagttaget gentagne Gange i Furesøen, der muligvis med sin relativt store Dybde byder Alkene nogenlunde gode Betingelser. 2. April 1925 blev 6 Eksemplarer set i Nærheden af Fiskebæk. 11. Januar 1926 saas 2 Flokke, en paa ca. 14 og en paa ca. 25; de havde vel forvildet sig herind i en Dagen i Forvejen herskende tæt Taage. 16. Marts 1927 laa 4 Alke langt ude paa Søen, og 19. December 1928 iagttoges en Flok paa 10 Fugle i Furesøens vestlige Del.

E. Petersen.

Hejre, *Ardea c. cinerea* L. — Paa Grund af det meget kolde Foraar 1931 var Hejrerne kommet et Par Uger senere end sædvanligt til Kolonien paa Høvdingsgaard i Sydsjælland. Da jeg besøgte Kolonien den 4. og 5. April, var Hejrerne ret tavse; i det Hele taget syntes de at være meget længere tilbage med deres Ynglen, end de plejede, og Fuglene har sikkert kun haft ganske friske Æg. Jeg besteg en Eg med 3 Reder, hvoraf en indeholdt fuldt Kuld paa 5 Æg, hvorpaa Hejren rugede; i en anden fandtes et næppe fuldtlagt Kuld paa 3 Æg; den tredie Rede var ikke taget i Besiddelse. — Ganske anderledes, da jeg den 13. April 1927 besøgte Kolonien; i en Eg fandtes 3 beboede Reder (4 Æg, 5 haardt rugede Æg og 3 vel en Uge gamle Unger), overalt hørtes Ungernes Skræppen fra Rederne, og de gamle Fugle fløj skrigende omkring. 1927 bestod Kolonien af godt 100 Reder; 1931 var der knapt saa mange (ca. 80), og nogle faa Par havde slaaet sig ned et Par Hundrede Meter fra Hovedkolonien. Lige op ad den lille Koloni laa en Natugle, *Strix a. aluco*, paa 3 Æg i en gammel Kragerede, paa hvis Kant man fra Jorden kunde skimte et indtørret Kragelig.

Indtil for ca. 15 Aar siden fandtes en Hejrekoloni i Næbskoven ved Præstø; antagelig er disse Fugle flyttet til Høvdingsgaard.

Da jeg den 23. Maj 1931 kom gaaende igennem Melteskov ved Præstø, hvor der findes en stor Raagekoloni, fortalte et vedholdende tek-tek-tek fra Trækronerne, at der var Hejreunger. Denne nye Koloni, som kun talte ganske faa Par, var anlagt i høje Bøge, som ogsaa blev benyttet af Raagerne. — I Slutningen af

forrige Aarhundrede ynglede der Hejrer i Melteskov, men Fuglene forjagedes (Vagn Holstein: Fiskehejren, 1927, p. 14).

B. L.

Sort Stork, *Ciconia nigra* L. — Efter venlig Tilladelse af Grev v. Schimmelmann, Lindenberg, besøgte jeg Tofte Skov, Øst for Lille Vildmose. Foruden en stor Bestand af oprindeligt Kronvildt findes der her en Rede af den Sorte Stork, hvor der 1931 er opfostret 3 Unger. Reden stod temmelig lavt, kun 8—10 Meter oppe i en gammel Birk og havde ganske anselige Dimensioner: 1—1½ Meter i Diameter og $\frac{3}{4}$ —1 Meter i Højde. Da jeg besøgte Lokaliteten 13. August 1931, stod de 2 Unger i Reden; efter at have betragtet dem en Stund paa Afstand vilde jeg vove mig nærmere, men de blev opmærksomme, og de store Fugle fløj behændigt bort mellem Træerne. De syntes i det Hele taget at være ret sky. De gamle Fugle saas ikke.

B. L.

I Begyndelsen af November 1926 saas en Sort Stork ved Lindeskoven, Syd for Nykøbing F. — 20. August 1929 saas 2 Eksemplarer flyvende ved Majbølle ved Guldborg, Lolland.

C. Olsen.

Sort Glente, *Milvus m. migrans* (Bodd.). — Henimod Aften den 20. Maj 1922 saa jeg en mørk Glente med svagt kløftet Hale trække roligt hen over Nykøbing F. i sydvestlig Retning.

C. Olsen.

Glente, *Milvus m. milvus* (L.). — En Glente iagttoges om Eftermiddagen den 5. April 1931 over Ordrup; den trak lavt over Villahaverne i nordlig Retning.

Fl. Bolt Jørgensen.

I Slutningen af September 1929 saas enkelte Glenter trække i sydlig Retning over Ugledie i Sydsjælland.

B. L.

Fiskeørn, *Pandion h. haliaëtus* (L.). — Iagttaget ved Frejlevaaens Udløb i Guldborgsund i Slutningen af September 1925 og atter i September 1930.

C. Olsen.

Perleugle (Tengmalms Ugle), *Aegolius f. funereus* (L.). — Denne Ugle, der flere Gange er iagttaget her om Vinteren baade af mig selv og andre, har jeg set her paa Bornholm om Sommeren, nemlig i Juli Maaned 1929.

Edg. Madsen.

Slørugle, *Tyto alba guttata* (Br.). — Sløruglen har i en Aarrække ynglet paa Lekkendegaarden i Sydsjælland. De holdt til i en stor Træ-Hejselade, hvor Reden første Gang blev fundet den 12. August 1920 ovenpaa Kornmagasinet, hvor en Del gamle Landbrugsmaskiner o. lign. havde faaet Plads. Under et Oprydningssarbejde vilde en Mand feje en Bunke »Tidseldun«, der laa i en Krog, bort, men da »Dunene« paa Grund af den ublide Behandling gav sig til at hvæse arrigt, blev jeg hidkaldt; der var 4 helt hviddunede Unger af noget forskellig Størrelse — den største som en Tamdue — og to sure Æg; de gamle Ugler saas ikke; Ungerne blev alle flyvefærdige. — I Marts 1921 opholdt et Par Slørugler sig i Laden. — Grundet paa Flytning fra Gaarden besøgte Laden nu ikke før den 21. April 1924, da atter et Par iagttoges, men der skal have været Slørugler alle de mellemliggende Aar. — 3. Juli 1925 indeholdt Reden 3 halvstore Unger, der sad i Førerkassen paa Hejseværket, der benyttedes til at transportere det nyindhøstede Korn fra den ene Ende af Laden til den anden; i Bunden af Kassen fandtes et tommehøjt Lag Gylp; de gamle saas ikke. — 1927 var Reden samme Sted som i 1925, og den indeholdt den 16. April 7 Unger af meget forskellig Størrelse; den største har været ca. 12—14, den mindste højest et Par Dage gammel. Den 4. Maj indeholdt Reden 6 Unger, og den 21. Maj var der kun 4 Unger tilbage; disse var nu næsten fuldfjerede og har antagelig ædt deres svagere Søsken. Ej heller under de 3 sidstnævnte Besøg saa jeg noget til de gamle Slørugler. — 23. Juli 1929 brændte Laden; siden har jeg ikke søgt efter Fuglen paa Lekkendegaarden. B. L.

Ringdue, *Columba p. palumbus* L. — 1927 fandt jeg sammen med Cand. mag. Knud Barfod saa tidligt som den 3. April i Rude Skov en Rede med 2 ca. 10 Dage gamle Unger. B. L.

Mursejler, *Micropus a. apus* (L.). Meget sen Forekomst af Mursejler i Hellerup og Omegn i Efteraaret 1918. — Endnu indtil Midten af August var Mursejlerne ret almindelige i Hellerup og Omegn, men i Dagene 16.—20. August saas kun faa; fra 21.—22. i Maaneden blev de dog atter talrigere, og det kunde derfor se ud til, at de danske Fugle var forsvundne fra Landet nogle Dage, før de nordligere ynglende ankom hertil paa deres Rejse sydpaa.

Hele September Maaned igennem saas de saa godt som dagligt i et Antal af indtil 5, i Reglen om Morgenen ved 8—9 Tiden. — Selv i Oktober blev de set paa 13 af Maanedens Dage, i dennes sidste Uge endog daglig fra 2—8 Fugle; sidste Dag, jeg selv saa dem, var 5. November, men en enkelt skal endog være set saa sent som 17. November.

Hvad der har været Grunden til denne overordentlig sene Forekomst, ved jeg jo ikke, men meget taler for, at det er den Mængde Myg, der til Stadighed fandtes, ligesom Vejret i hele Perioden var meget mildt. Det var dog ikke et velfyldt Spisekammer paa en begrænset Lokalitet, der opholdt Fuglene, thi Jagttagelserne er gjort spredt over hele Hellerup, helt ud til Charlottenlund og ind til Østerbro, ja, et Par Gange blev Mursejlerne set helt inde ved Gl. Strand i København; de opholdt sig dog overvejende i Nærheden af Bredden af Øresund. Hvorfra disse Fugle stammede, er ikke godt at sige, men det har næppe været danske Ynglefugle eller unge Fugle udruget i Danmark, men snarere unge norske, svenske eller muligvis nordrussiske Fugle, der kun opholdt sig her i nogen Tid, fordi Insektlivet var saa rigt.

Mærkeligt nok udsatte Mursejlerne atter i 1923 deres Afrejse til langt udover den normale Tid, Slutningen af August; dette Aar saas de sidste den 23. September, da de i Mængde (35—40 Stk.) blev set trækkende SV. over Amagers Sydkyst. Indtil denne Dato blev de set paa 14 Dage af September i et Antal af fra et Par til 20—25 Stkr. ofte flyvende den lige Vej mod SV.

E. Petersen.

24. August 1930 observerede jeg et stort Træk af Mursejlere passere over Bøtø Plantage og langs med Diget mod Syd og Sydvest. Vinden var om Aftenen SØ., men gik i Nattens Løb om til SV med Regnbyger. Fuglene kom om Morgenen tidlig i samlede Flokke paa 20—50, men da det blæste op om Formiddagen og klarede op, kom Trækket mere adskilt, og om Eftermiddagen, da det var en stormende vestlig Kuling, kom de meget spredt og enkeltvis, og de hvirvlede afsted dels langs Plantagen og dels hen over Diget, idet de kastede sig hid og did og ligesom behøvede stor Plads til at tumle sig paa. Det sammenlagte Antal af noterede Fugle var ca. 300, men en Del er trukket unoteret, bl. a. i en Frokostpavse. Noget Træk af lignende Art har jeg aldrig set.

C. Olsen.

Ellekrage, *Coracias g. garrulus* L. — 23. Maj blev en ♂ ad. fundet død ved Dueodde paa Bornholm, vist omkommet ved et Ulykkestilfælde; Eksemplaret kom til Bornholms Museum.

B. L.

Paa geologisk Ekskursion til Bornholm saa jeg et Eksemplar af Ellekragen i Paradisbakkerne den 6. Juni 1931; flere andre bl. a. Prof. Bøggild kan bekræfte Iagttagelsens Rigtighed.

Hagb. Jonassen.

I Skaane yngler Ellekragen omend meget faatalligt, og Da-toerne for de to her nævnte Fund paa Bornholm kunde nok tyde paa, at Arten eventuelt vilde yngle her. Det maa derfor paa det indstændigste henstilles til de paa Bornholm boende Ornithologer og til den derværende Naturfredningsforening at have Opmærksomheden henvendt paa dette Forhold. Det vilde være en Gevinst, om vi atter kunde regne denne pragtfulde Skabning til vore Ynglefugle.

Red.

Isfugl, *Alcedo atthis ispida* L. — Den 22. Juli 1927 iagttoges en Isfugl gentagne Gange i Lekkende Søer i Sydsjælland. Arten har næppe ynglet her.

B. L.

Gøg, *Cuculus c. canorus* L. — I Sommeren 1923 fandtes paa Faurskovveggen i Vestfyn en Gøgeunge i en Rede af Rørsangeren, *Acrocephalus s. scirpaceus* (Herm.); denne var anbragt mellem nogle Tagrørstængler, der stod lige ved Bredden og kun ca. 20 m fra Stuehuset paa en Gaard. Ungen trivedes godt, men faldt en skønne Dag i Vandet, da Reden var bleven den for lille. Den blev taget op og sat paa en lav Thuja, hvor Plejeforældrene fortsatte med at made den. I lang Tid efter at den kunde flyve, saas den i Nærheden af den Plads, hvor den var udruget.

Hans Jørgensen.

Det er ikke ualmindeligt, at Gøgeunger, der opfostres i Rørsangerreder, drukner, fordi de bliver for tunge, saa at forholdsvis svag Blæst formaar at frembringe Læsioner i Reden, som derefter falder i Vandet. Paa Sjælland, hvor Rørsangergøge er almindelige, kan man ofte iagttage dette.

Red.

Vendehals, *Iynx t. torquilla* L. — Iagttaget i en Have i Nykøbing F. 26. April 1924 og 26. August 1925.

C. Olsen.

4. Juli 1924 saa jeg en Vendehals i en Have nær Strandmølleaaens Udløb.

G. R. v. Scholten.

Grønspætte, *Picus viridis virescens* (Br.). — I Slutningen af November 1930 saa jeg en Grønspætte i et fældet Piletræ paa Gaden i Sdr. Omme By; jeg har ikke før set den her.

O. Christophersen.

I en Plantage i Nærheden af Egtved saas Grønspætten ofte i Færd med Myreboerne; naar man nærmede sig, plejede Spætten at indtage en Dækstilling med Næbbet lige i Vejret, omtrent ligesom Rørdrummen; naar den fandt sig opdaget, fløj den skrigende op.

Axel Holm.

I en lille Skov lige Syd for Mariager iagttog jeg en Grønspætte d. 14. August 1931. I Himmerland skal den ikke være sjælden.

B. L.

Stor Flagspætte, *Dryobates major* (L.). — En Tid paa Efteraaret 1929 søgte en Flagspætte hver Aften Soveplads i en Stærkasse, der var ophængt paa et Hus i Sdr. Omme.

O. Christophersen.

Lille Flagspætte, *Dryobates m. minor* (L.). — I et gammelt Elletræ lige uden for Vinduerne paa Gammel Køgegaard har jeg flere Gange i Dagene fra den 4. til den 12. Januar 1931 set en Lille Flagspætte; navnlig om Formiddagen fik jeg Lejlighed til at vise andre den, men kun et enkelt Eksempplar. Den 12. Januar var jeg horte, men da færdedes 2 Eksemplarer i et Par gamle Valnøddetræer ca. 35 Meter fra det ovennævnte Elletræ. Jeg undlod at aflive Fuglen som Bevis, saa man har kun mit Ord at holde sig til.

H. Collet.

Tretaaet Spætte, *Picoides t. tridactylus* (L.). — Denne Spætte har jeg set en Gang i December Maaned 1929 i Dagene lige før Jul i min Have her i Aakirkeby. Fuglen var meget lidt sky, saa jeg kunde iagttage den i flere Minutter paa et Par Meters Afstand og nøje mærke mig dens Farver. Da jeg ikke i Forvejen kendte Fuglen, lagde jeg ikke Mærke til, at den kun havde 3 Tæer, men efter at jeg har haft Lejlighed til at gennemgaa Skindpræparaterne paa Zoologisk Museum, er det aldeles utvivlsomt, at det er en ♀ af den Tretaaede Spætte, jeg har set.

Edg. Madsen.

Fundet omtales ogsaa af R. Hørring i Vidensk. Medd. Dansk nat. For. XC, 1930—31, p. 448.

Red.

Ravn, *Corvus c. corax* L. — Jeg har ikke selv set Arten i Omegnen af Nykøbing F. i de sidste 20—25 Aar; en Gang i Halvfemserne saa jeg en Efteraarsdag en Flok paa 10—11 Stykker svæve langs Stranden ud for Ny Kirstinebergs Jorder. — 10. Marts 1931 iagttog en af mine Brødre til sin store Forbavselse en Ravn, som sammen med 4 Raager trak lavt hen over hans Have ved Slotsbroen, idet den lod sit grove »Orr« høre.

C. Olsen.

Pirol, *Oriolus o. oriolus* (L.). — Denne Fugl har siden 1918 vist sig flere Steder i Omegnen af Nykøbing F.

C. Olsen.

Arten er ikke sjælden i de lollandske Skove, saaledes yngler den til Stadighed i Skovene under Aalholm, Kjærstrup, Lungholm og Engestofte; derimod maa den — i Modsætning til hvad man ofte ser angivet — absolut kaldes sjælden i Sydsjælland, hvor jeg aldrig selv har set eller hørt den. I 1927 er den dog set og hørt gentagne Gange i Christinelund Skov ved Præstø af J. Chr. Harboe.

B. L.

Digesvale, *Riparia r. riparia* (L.). — Da jeg 17. Juli 1930 var beskæftiget med at ringmærke Digesvaler, fandt jeg frisklagte Æg i 5 af de ca. 50 undersøgte Reder — i alle Tilfælde kun 2. Fra en Del af Rederne var Ungerne allerede udføjne, saa det har vel drejet sig om andet Kuld.

M. Ingerslev.

Bysvale, *Delichon u. urbica* (L.). — Saa sent som i Dagene 9., 10. og 11. November 1929 saas en enkelt Bysvale i Klampenborg.

E. Petersen.

Forstuesvale, *Hirundo r. rustica* L. — 10. November 1918 saas en ung Forstuesvale i Hellerup. — Ogsaa 1929 forsvandt de sidste Svaler sent, saaledes iagttoges 4 Forstuesvaler i Klampenborg 9., 10. og 11. November.

E. Petersen.

Toplærke, *Galerida c. cristata* (L.). — Toplærken var tidligere en sjælden Gæst ved Nykøbing F.; jeg har saaledes kun iagttaget den to Gange i Løbet af over 20 Aar. Nu er Forholdet anderledes. Siden 1921 har den jævnlig kunnet iagttages her

saavel Sommer som Vinter. Det er hovedsagelig ved Nr. Boulevard og Kohavevej, at jeg har set dem; og før min Have blev tilplantet, aflagde et Par undertiden et Besøg der, ligesom Hannen kunde ses syngende paa en Kartoffelrække eller paa Marken udenfor, og ofte saas den flagrende i sin ejendommelige Parringsflugt. I 1923, da der var Kløvermark udenfor mit Stakit, saas Parret ofte slaa sig ned der paa samme Sted. Enkelte Aar saas hyppigt 3 sammen, og i August—September 1928 saa jeg af og til 4 paa en Gang. — 23. Oktober 1927 saas en Flok paa 7, kommende fra NØ. og kredsende lidt, idet de lod deres Stemme høre. (Stærk Blæst fra Øst med Regn, næste Dag Nordenvind med Kulde). — Medio Januar 1929 saas 3 sammen; de saas af og til i Løbet af Sommeren. I November og December saas en Flok paa 4. — I 1930 saas et Par i Januar og Februar, en enkelt Gang 4. — En Dag i August saas 3, hvoraf den ene saa ud til at være en ung Fugl. — En Dag medio Oktober 1930 trak en Flok paa 10—12 Stkr. hen over Haven her. — I 1931 bemærkedes den første Gang medio Februar. — Paa Sukkerfabrikens Plads er den ogsaa iagttaget, og jeg har set en syngende Han paa en Husrygning paa Østerbro her.

C. Olsen.

Hedelærke, *Lullula a. arborea* (L.). — Den 3. Februar 1931 foretog Konservator Scheel og jeg en Udflugt til Amagers Sydvestkyst, til Kongelunden og de omkringliggende Markstrækninger. Det frøs flere Grader og sneede med Afbrydelser hele Dagen og en ret haard NØ.-Blæst gjorde Kulden vel bidende. Fuglene, vi observerede, svarede derfor til Vinterlandskabet og var næsten alle nordiske Gæster. I Skoven huserede Flokke af Kvækere, Sjaggere, Halemejsjer, Sortmejsjer (af den skandinaviske Form), Skovskader og Kærnebidere, paa Markerne dominerede Snespurvvene, og langs Kysten lavede Flokke af Graaænder, Hvinænder og nogle Store Skalleslugere op.

Til vor Overraskelse traf vi tæt ved Kysten en Flok lærkeagtige Fugle, der ved nærmere Eftersyn viste sig at være Hedelærker. Flokken, der talte ca. 50 Individuer, opholdt sig paa en sneklædt Pløjemark, der dog var blæst næsten bar. Paafaldende var først og fremmest Hedelærkernes korte Hale, der i Begyndelsen fik os til at antage dem for Tornirisker ell. lign., men da vi med en Del Besvær fik os sneget ind paa de meget sky Fugle, røbede hele deres Fysiognomi, at det var Hedelærker. Ikke blot

selve Udseendet — den korte Hale, den hvide Vingeplet, det lærkeagtigt spidse Næb, den rundagtige Top paa Hovedet, selve Farvetegningen etc. — men ogsaa deres Opførsel var typisk for Hedelærker. De løb nemlig om paa Jorden, fløj næsten ikke, ligesom Toplærken og andre Lærker, og naar de skræmtes op, udstødte de den sædvanlige Lærkekvidder tilsat nogle melodiske Toner: »Lyl-ly« eller saa.

Hedelærkerne opholdt sig i længere Tid paa Marken løbende om i Plovfurerne, saa forsvandt hele Flokken til en anden Mark. Men at de i flere Dage opholdt sig paa Egnen godtgøres af, at Konservator Madsen endnu den 8. Februar observerede en Flok derude, sandsynligvis den samme, som vi saa.

Ved Gennemgang af Litteraturen om de danske Fugle fandt jeg saa at sige ingen Omtale af Hedelærkens Forekomst tidligere paa Aaret end midt i Marts, med Undtagelse af at Halfdan Lange (»Ribes Fugleliv«) en Gang havde truffet nogle enkelte Eksemplarer en Vinter. — Samtidigt med Hedelærken saa vi en anden tidligt ankommen Fugl, idet en Flok Stære holdt til ude paa Markerne, men dette havde jo ikke Sjældenhedens Interesse.

Finn Salomonsen.

Hedelærken har jeg nu og da iagttaget i Træktiderne. I Beg. af Marts 1912 saa jeg en Flok paa 13 trække fra SV. lavt over Guldborgsund. — 15. Marts 1914 saa jeg 6 ved Nykøbing. — 6. Oktober 1918 saa jeg paa en Kløvermark ved Nr. Boulevard her ved Byen 2 Flokke (4+7). — 25. og 27. Marts 1919 saa jeg udenfor min Have paa omtalte Kløvermark 5 Hedelærker. — 24. Oktober 1921 bemærkede jeg en Flok paa 10—12 Stykker, kommende fra Nord og kastende sig i en Roemark. (Nordenblæst med koldt Bygevejr). — En Dag i Oktober 1923 saa jeg en Flok paa ca. 20, som trak forbi min Have. *C. Olsen.*

Nordlig Gul Vipstjert, *Motacilla flava thunbergi* Billberg. — 12. Maj 1912 saa jeg 3—4 Gule Vipstjerter af den nordlige, sort-hovede Race paa Øregaards Marker nord for København, hvor der dengang fandtes et Par Smaasøer og et mindre, sumpet Areal. 14. og 15. Maj saas nogle faa Stykker sammesteds.

E. Petersen.

Hvid Vipstjert, *Motacilla a. alba* L. — Allerede 8. Marts 1922 saas en Hvid Vipstjert ved Gentofte Sø. — I 1912 saas en Hvid

Vipstjert saa sent som 1. November komme gaaende paa Stranden i Hellerup; Temperatur 0° med Sne om Formiddagen. — 2. November 1919 saas en Fugl i Vinterdragt i Strandkanten ved Charlottenlund; 9. November iagttoges et Eksemplar ved Hellerup Lystbaadehavn. Alle de nævnte Fugle syntes friske og sunde.

E. Petersen.

Arten taaler Kulde særdeles vel; den yngler saaledes ved Angmagsalik (O. Helms, Medd. om Grønland LVIII, 1926, p. 263) og formodes ogsaa at yngle ved Scoresbysund (Alwin Pedersen, Medd. om Grønland LXXVII, 1930, p. 495).

Red.

Vandstær, *Cinclus c. cinclus* (L.). — I Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrifts 19. Aargang p. 104 har Dr. Krabbe gjort gældende, at man maa stille sig meget skeptisk overfor en Meddelelse om, at der skal være set mere end een Vandstær ved Kanalen mellem Furesø og Lyngby Sø. Og Dr. Krabbe synes i det Hele at være tilbøjelig til at mene, at Vandstæren her i Landet aldrig optræder to eller flere sammen. Maa jeg i den Anledning besvare Tidsskriftets Redaktion med følgende Bemærkninger:

Den 19. Februar 1927 saa jeg 2 (to) Vandstære i den nævnte Kanal. De sad sammen paa Isen og dykkede herfra. Og den 1. Februar 1931 saa jeg atter 2 (to) Vandstære i og ved den samme Kanal. Jeg iagttog dem i mere end en halv Times Tid og saa dem bl. a. mange Gange sidde ved Siden af hinanden paa Baadebroen ved Kanalen, og det lod til, at de kom rigtig godt ud af det sammen. Jeg saa dem flyve (de fløj flere Gange hen over mit Hoved), »støde Peber«, dykke og svømme paa og under Vandet. Derimod kunde jeg ikke se, om de ogsaa — hvad de skal kunne gøre, se »Britain's birds and their nests by George Rankin« (London, 1910) p. 305 — gik nede paa Bunden af Kanalen.

Til mine ovenstaaende Bemærkninger kan jeg føje, at andre af Foreningens Medlemmer (H. Pedersen og V. Thorup) den 20. Februar 1927 saa 3 (tre) Vandstære sidde sammen paa Baadebroen ved den ovennævnte Kanal, og at det i Tidsskriftets 11. Aargang p. 130 hedder: »To Vandstære opholdt sig nogle Dage ved den lille Bæk, der gaar fra Søholm Sø i Hellerup, sidste Gang, jeg saa dem, var 31. Oktober 1915« (A. Koefoed), hvortil knyttes en Bemærkning om, at H. Weis saa »dem« sammesteds den 8. No-

vember 1915. Sluttelig tør jeg maaske nævne, at H. Winge i Tidsskriftets 1. Aargang p. 20 siger om Vandstæren, at den — omend meget sjældent — yngler her i Landet. For yngler Vandstæren her, saa maa den naturnødvendigt ogsaa kunne optræde i mere end Enkelttal paa et og samme Sted. *R. Gram.*

Lille Fluesnapper, *Muscicapa p. parva* Bechst. — Den 16. Oktober 1930 saa vi i Kongelunden en Lille Fluesnapper. Iagttagelsen fandt Sted om Eftermiddagen Kl. ca. 16 i stille, klart Solskinsvejr. Vinden havde de foregaaende Dage været temmelig stærk, af sydlig, maaske nærmere sydvestlig, Retning.

Den iagttagne Fugl var en gammel Han, da det røde paa Struben var af en smuk, uplettet Farve, og den desuden havde de blaa Tegninger paa Hovedets Sider. En Forveksling med Rødhals, *Erythacus rubecula*, var fuldstændig umulig. Fluesnapperen var ikke alene mindre og dens Farver af anden Udbredelse end hos Rødhals, men dens Væremaade var ogsaa ganske forskellig fra Rødhalsens. Vi saa den først sidde i Toppen af en Tjørnebusk nær ved en lille Kanal; derfra flagrede den ind og ud mellem de høje Buske og bortsnappede i Luften svævende Insekter. Efter et Stykke Tid at have færdedes i Buskene fløj den højere op i nogle Egetræer, men deroppe nøjedes den ikke med at tage Insekter i Luften, men tog ogsaa, tilsyneladende da, Dyr fra Bladene.

Der var ikke andre af Arten, og den søgte ikke Selskab med andre Smaafugle. *Ole Torrild Neel.*

Gærdesanger, *Sylvia c. curruca* (L.). — I Uglelie i Sydsjælland hørtes en Gærdesanger gentagne Gange saa tidligt som den 23. April 1930. *B. L.*

Høgesanger, *Sylvia n. nisoria* (Bechst.). — I Forsommeren 1926 fandt jeg 4 beboede Reder af denne Art i Kongelunden, hvor Fuglen som andre Steder tydeligt nok holdt til paa den samme Biotop som Tornskaden, Tjørn og Roser. — 2. Juni fandt jeg en Rede med 5 let rugede Æg i en Rose 2 Meter fra Jorden; i Nærheden fandtes en paabegyndt Rede, som aldrig fuldendtes. 9. Juni fandtes en Rede med 5 smaa Unger; denne Rede stod lavt, $\frac{3}{4}$ Meter over Jorden i et tæt Tjørnekrat. En tredie Rede sad ganske lavt i en lille Tjørn i en Lysning i Skoven; den indeholdt den 16. Juni 3 Unger og 2 spraaede Æg. Endelig

fandtes 26. Juni en Rede med 4 noget rugede Æg 1 Meter fra Jorden i en frit udragende Gren fra en stor Tjørn. Denne sidste Rede var let synlig; de andre nævnte var særdeles godt skjulte, men Høgesangernes yderst intense og vedholdende Varselskrig forkyndte tydeligt, om man var paa deres Enemærker. Paa en særlig god Lokalitet med mange middelstore Tjørnebuske iagttoges indtil 3 ♂♂ samtidig; Sangen foredrages ofte flyvende, saaledes som man f. Eks. ogsaa ser Tornsangeren gøre.

I de følgende Aar er Arten oftere blevet iagttaget i Kongelunden, og Reden er ogsaa en enkelt Gang fundet af andre, men lige op ad det Krat, hvor jeg — ved et rent Tilfælde — fandt den første Rede, er der nu et yndet Tilholdssted for Københavnerne, der ligger i week-end-Lejr, hvad der unægtelig forstyrrer Idyllen i nogen Grad. Ikke desto mindre saa jeg 21. Maj 1929 3 Høgesangere i Skovbrynet lige i Nærheden af den nævnte Lokalitet.

I Tilslutning hertil skal nævnes en anden Høgesangerlokalitet nemlig Egehoved og Maderne ved Præstø. 1. Juni 1926 fandt Proprietær J. Chr. Harboe en Rede paa Maderne; denne sad let synlig 1½ Meter oppe i en ret aaben, fritstaaende Tjørn og indeholdt 3 Æg, som forsvandt under en selskabelig Udflugt til Stedet den paafølgende Dag. 4. Juni 1926 skræmte jeg paa Egehoved en ♀ af Reden, der sad ganske lavt i en forkrøblet, med Laver overvokset Tjørnebusk og indeholdt 6 Æg, og 2. Juli 1927 iagttog jeg sammesteds et Par Høgesangere med udføjne Unger.

B. L.

Gransanger *Phylloscopus collybita* [*abietina* Nilss. eller *collybita* (Vieill.)] i Sydsjælland om Sommeren. — Den 9. Juli 1929 hørte og saa jeg en ♂ ad. i Lekkende Skov. Den sad først en Stund og sang i Toppen af en høj Bøg, derefter fløj den ned og forsvandt i nogle Graner af noget mere end Mandshøjde.

B. L.

Sjagger, *Turdus pilaris* L. — 12. August 1928 saas en enkelt Fugl af denne Art i Haven paa Svinningegaarden. B. L.

Solsort *Turdus m. merula* L. — 24. Juni 1925 fandtes i min Have i Holte en Rede af Solsorten med 4 store Unger, der blev dræbt; den 6. Juli laa der atter 4 frisklagte Æg i samme Rede.

Axel Koefoed.

Husrødstjert *Phoenicurus ochrurus gibraltariensis* (Gm.). — Husrødstjertens Forekomst i Nykøbing F. synes noget ustadig; i de sidste Aar har jeg ikke hørt ret meget til den. 1913, 1917 og 1918 hørtes den om Foraaret synge fra Kirken. I 1921 er den set og hørt flere Steder i Byen, og ca. 1. September samme Aar saa jeg en Han i min Have. I Begyndelsen af August 1922 saas en Hun sammesteds, formentlig paa Træk eller Strejf. I Foraaret 1927 opholdt et Par sig ved Sukkerfabrikken.

C. Olsen.

Husrødstjerten yngler i Vejle. — Nævnte Art saas første Gang sidst i April 1929, og dens Opdagelse skyldtes Hannens karakteristiske Sang, som Meddeleren af dette indtil da ikke kendte. Efter at min Opmærksomhed var henledt paa Fuglen, iagttog jeg ofte denne, hvad der laa saa meget nærmere, eftersom dens Tilholdssted var et stort Fabrikskompleks umiddelbart i Nærheden af min Bopæl; bl. a. saas Hannen ofte sidde syngende paa den øverste Kant af en af de høje Fabriksskorstene. Uagtet der ikke blev fundet nogen Rede, maa det vel betragtes som hævet over enhver Tvivl, at Arten har ynglet her, da saavel Hannen som Hunnen blev set Sommeren igennem. Først hen paa Efteraaret forsvandt Fuglene herfra.

Det følgende Aar, 1930, indfandt Hannen sig atter her; den hørtes første Gang 13. April og blev set 2 Dage senere, hvorefter den forsvandt; til Gengæld hørte jeg den kort efter i Udkanten af Byen ved et Savværk, hvor den ikke før havde holdt til. Af dette sluttede jeg, at det var een og samme Fugl, men at den mærkeligt nok dette Aar havde foretrukket andre Lokalteter. Ligesom foregaaende Aar holdt Arten til paa det dette Aar foretrukne Sted, hvor den vel uden Tvivl har ynglet, men nogen Rede blev desværre ikke fundet.

I 1931 har jeg igen set Husrødstjerten her i Vejle. Den 20. April hørtes og saas en Han paa Stedet, hvor Arten havde Tilhold sidste Aar.

Hans Meinhardt.

Husrødstjerten har formentlig ynglet i Aarhusegnen i adskillige Aar. E. Hansen oplyser saaledes, at han for 5 à 6 Aar siden fandt et Par, der havde Rede i et gammelt Materialskur paa Havnepladsen. Der kom desværre ikke Unger, da Skuret blev nedrevet. I 1927 blev en Rede fundet i et Kolonihavehus i Byens Udkant. Om Fuglene der havde faaet udruget, har jeg ikke kunnet faa oplyst. I 1929 blev en Rede med Æg bragt op

til Lærer S. V. Knudsen, Zoologisk Museum, Aarhus, af en Jernbanefunktionærs Søn. Reden var fundet paa Jernbaneterrainet i en Buffe paa en gammel, kassabel Jernbanevogn. Ved Samtale med Lærer Knudsen oplyser denne, at han i de senere Aar har faaet opgivet, at Husrødstjerten var set flere Steder i Aarhus, navnlig paa Havneterrainet.

I Juni 1931 besluttede jeg grundigt at undersøge Jernbaneterrainet, hvor Reden i sin Tid var fundet. Paa Jernbanens Oplagsplads for gammelt kasseret Materiel, Vogne, Skinner, Lasker o. s. v. havde jeg den Glæde at se 4 à 5 Par gamle Fugle, uden at det dog lykkedes mig at finde nogen Rede. Den 24. Juni var Lærer Knudsen og Dr. Hoffmeyer med nede paa Pladsen at se Fuglene. Der var lige saa mange gamle Fugle som sidst og adskillige udføjne Unger. I Modsætning til Rødstjerten var den gamle Han allerede langt henne i Fældningsperioden, saa det hvide paa Vingerne var næsten borte, og det sorte paa Ryg og Hals var nærmest sodfarvet. Husrødstjerten er ikke nær saa sky som Rødstjerten. Den lod sig villigt iagttage selv paa ret nært Hold. Ved Samtale med Jernbanepersonalet blev det os fortalt, at »den sorte lille Fugl med den urolige røde Hale« var almindelig paa Pladsen, og at den havde været der en Del Aar. Der var i Aar tilfældigvis fundet 2 Reder, den ene i noget gammelt Materiel og den anden i en Stoppebom af Træ og Jord. Fuglene elskede de gamle Vogne. Snart saa man dem sidde paa Bufferne, snart paa Akslerne eller Taget, altid uroligt vippende med den røde Hale. Sidst i Juli forsvandt Fuglene fra Ynglepladsen.

Den 8. September saa jeg en gammel Han i fuld Pragtdragt paa en Byggeplads i Byens Udkant.

Efter min Mening har der formentlig i Aarhusegnen i Aar ynglet 6 à 8 Par Husrødstjerte. Fuglen ynder tilsyneladende Jernbaneterrain, idet den f. Eks. har ynglet i flere Aar paa Jernbaneplassen i Padborg.

Th. Kjær.

Rødstjert, *Phoenicurus ph. phoenicurus* (L.). — Denne Art er baade Foraar og Efteraar særdeles almindelig som Trækfugl i Aarhusegnen, og den yngler ikke saa faatalligt her. 1930 fandt jeg saaledes ikke mindre end 3 Reder i Marselisborg Skov, den ene i en Redekasse, og i Juni Maaned samme Aar saa jeg gamle Fugle med udføjne Unger i Riis Skov, Ry, Gjern m. fl. Steder.

Th. Kjær.

Grønsisken, *Carduelis spinus* (L.). — Medio Juni 1931 saa jeg en Grønsisken i nogle høje Graner omkring Gribsø i Nordsjælland. — 12.—14. August 1931 hørte jeg gentagne Gange Grønsiskenens Stemme i en Lund lige Nord for Frederikshavn. Begge Steder har det sikkert drejet sig om Ynglefugle. Paa Bornholm ruger Arten almindeligt; dertil vil jeg dog senere komme tilbage.

B. L.

Hortulan, *Emberiza hortulana* L. — Paa en Udflugt til Amagers Sydkyst 2. Maj 1927 saas 2 Hortulaner, øjensynlig ♂ og ♀, ved Kongelunden; den 7. Maj 1928 saas atter en ♂ ved Kongelunden, og den 6. Maj 1929 saas en ♀ i Hovmarksmosen Syd for Jægersborg Dyrehave.

E. Petersen.
