

REVIDERET FORTEGNELSE OVER DANMARKS FUGLE

PAA GRUNDLAG AF

E. LEHN SCHIØLERS LISTE I »DANMARKS FUGLE«

UDGIVET AF DANSK ORNITHOLOGISK FORENING

Den »Fortegnelse over Danmarks Fugle« som Herluf Winge 1907 offentliggjorde i dette Tidsskrifts 1. Aargang, har med Rette senere hen dannet det systematiske, faunistiske og biologiske Grundlag for de fleste Afhandlinger inden for den danske Ornithologi.

Imidlertid har nu, efter 20 Aars Forløb, af forskellige Grunde en ny Udgave vist sig ønskelig. For det første har Listen modtaget ikke saa faa Forøgelser, idet dels en Række sjældne, tilfældigt optrædende Fugle for første Gang er blevet paaviste, dels Kendskabet til flere af de almindelige Arter er blevet uddybet, idet navnlig Spørgsmaalet om, hvilke Racer, der træffes her i Landet, er blevet gjort til Genstand for nøjere Undersøgelse. Endvidere har der, i adskillige Tilfælde, vist sig Ændringer med Hensyn til Arternes Hyppighed; visse optræder nu utvivlsomt med større Individantal, medens desværre andre og tilmed særligt ejendommelige Former navnlig paa Grund af hensynsløs Forfølgelse er taget stærkt af.

Et andet Forhold, der ligeledes taler for en Revision af den oprindelige Liste, er Navnespørgsmaalet. Det har efterhaanden vist sig ønskeligt, dels i enkelte Tilfælde at foretage Ændringer af de danske Navne, dels og ganske i Særdeleshed foruden de i Tidsskriftet i Regelen benyttede, latinske Navne ogsaa at faa en Liste over de i Nutiden saa mange Steder i Udlandet benyttede, systematiske Navne.

Endelig var der et Forhold af rent praktisk Natur, der ligefrem krævede Udgivelsen af en ny Fortegnelse. Den gamle Liste var i Virkeligheden næsten utilgængelig for de fleste yngre

Medlemmer af Foreningen, idet det paagældende Bind af Tidsskriftet forlængst var udsolgt, og Særtryk aldrig forekom.

Som Følge heraf var det med stor Glæde, at Foreningen af sin Formand, Hr. E. Lehn Schiøler, fik Tilladelse til at benytte som Grundlag for en ny Fortegnelse den Liste, som 1925 er trykt i »Danmarks Fugle«. Foreningen nedsatte derefter et Udvalg, bestaaende af R. Hørring, P. Jespersen, R. Jul. Olsen, R. H. Stamm og Å. Vedel Tåning; dette skulde som Helhed navnlig tage Stilling til, hvilke danske og latinske Navne, der skulde foretrækkes, medens de rent formelle Spørgsmaal lagdes i Redaktørens Haand.

I den nu foreliggende Liste opregnes Fuglene i samme Orden som i Winge's Liste. I de danske Navne er der foretaget enkelte Ændringer, medens derimod de latinske er beholdt uforandrede. Samtidig er dog, som Synonymer, tilføjet de nyere Navne, og hvor Racer særligt opføres, betegnes disse, for ikke at skabe yderligere Forvirring, udelukkende ved de nyere Navne. Denne Ordning vil maaske ikke tilfredsstille alle, men den synes i al Fald som en Overgang at være den mest hensigtsmæssige; allerede nu helt at opgive de hidtil benyttede, latinske Navne til Fordel for de nye, der tilmed ingenlunde synes at ligge urokkeligt fast, vilde for de fleste af Tidsskriftets Læsere kun volde Besvær. Det maa i denne Sammenhæng ganske særligt erindres, at den ret omfangsrige, mere eller mindre populære, hjemlige Litteratur, hvis Fremkomst man med Glæde har kunnet hilse i de senere Aar, udelukkende benytter de ældre Navne.

Efter Hovedfortegnelsen, i hvilken de biologiske Bemærkninger næsten overalt svarer til dem, der findes i »Danmarks Fugle«, følger derpaa forskellige Oversigter over de her i Landet ynglende Fugle, over de tilfældige Gæster, over Trækfugle og over Standfugle, ogsaa for dette Afsnit, der oprindeligt er fremkommet sammesteds, er Foreningen Hr. E. Lehn Schiøler megen Tak skyldig.

R. H. Stamm.

ANDEFUGLE, LAMELLIROSTRES.

1. Krikand, *Anas crecca*.
Nettion crecca crecca (L.).
 Ret faatallig ynglende, hyppigst i Jylland. Trækfugl. Meget almindelig paa Gennemrejse. Kendes fra Stenalder.
2. Atling, *Anas querquedula*.
Querquedula querquedula (L.).
 Ikke sjælden som ynglende. Trækfugl.
3. Blaavinget And, *Anas discors*.
Querquedula discors (L.).
 Kun truffet en Gang; tilfældig Gæst fra Amerika.
4. Pibeand, *Anas penelops*.
Mareca penelops (L.).
 Talrig paa Gennemrejse og overvintrende, desuden enkelte oversomrende. Kendes fra Stenalder.
5. Knarand, *Anas strepera*.
Chauleasmus streperus (L.).
 Faatallig som ynglende. Trækfugl.
6. Spidsand, *Anas acuta*.
Dafila acuta acuta (L.).
 Ret faatallig som ynglende. Trækfugl. Talrig paa Gennemrejse. Kendes fra Stenalder.
7. Stokand, *Anas boscas*.
 Optræder i 2 Racer:
Anas platyrhyncha platyrhyncha L.
 Stokand. Meget almindelig som ynglende. Vist overvejende Trækfugl. Kendes fra Stenalder og Jernalder. I nyeste Tid er den danske Stokand ved Fodring og Krydsning med indfangede Vintergæster af den større, nordøstlige Race bragt noget ud af den naturlige Tilstand.
Anas platyrhyncha archiboscas Brehm.
 Nordøstlig Stokand. Om Vinteren almindelig, ankommende allerede i September. Gæster fra Nordøst. Fanges jævnlig i Fuglekøjerne paa Fanø. Ofte overvintrende. Kendes fra Stenalder.
8. Skeand, *Anas clypeata*.
Spatula clypeata (L.).
 Almindelig som ynglende. Trækfugl. Talrig paa Gennemrejse. Kendes fra Stenalder.
9. Gravand, *Tadorna cornuta*.
Tadorna tadorna (L.).
 Almindelig som ynglende. Trækfugl. Kendes fra Sten- og Jernalder.

10. Rustand, *Tadorna casarca*.
Casarca ferruginea (Pall.).
 Truffen nogle faa Gange. Tilfældig Gæst fra Sydøst.
11. Knopsvane, *Cygnus olor*.
Cygnus olor (Gm.).
 Faatallig som ynglende; har været langt almindeligere. Nærmest Standfugl. Gæster fra Øst ses om Vinteren. Kendes fra Stenalder.
12. Pibesvane, *Cygnus minor*.
Cygnus bewickii bewickii Yarr.
 Vintergæst; paa sine Steder ikke sjælden. Kendes fra Stenalder.
13. Sangsvane, *Cygnus musicus*.
 Optræder i 2 Racer:
Cygnus cygnus cygnus (L.).
 Sangsvane. Almindelig Vintergæst. Kendes fra Stenalder.
Cygnus cygnus islandicus Brehm.
 Islandsk Sangsvane. Tilfældig Vintergæst.
14. Troldand, *Fuligula cristata*.
Fuligula fuligula (L.).
 Ikke helt sjælden som ynglende; har bredt sig i de senere Aar. Almindelig Vintergæst. Kendes fra Stenalder.
15. Bjergand, *Fuligula marila*.
Fuligula marila marila (L.).
 Formodning om dens Ynglen i Landet har været fremsat; gyldigt Bevis savnes dog. Almindelig Vintergæst. Kendes fra Stenalder.
16. Taffeland, *Fuligula ferina*.
Nyroca ferina (L.).
 Ret almindelig som ynglende. Almindelig Vintergæst.
17. Hvidøjet And, *Fuligula nyroca*.
Nyroca nyroca nyroca (Güld.).
 Tilfældig Gæst fra Mellemeuropa. Kun truffen faa Gange.
18. Rødhovedet And, *Fuligula rufina*.
Netta rufina (Pall.).
 Tilfældig Gæst fra Sydøst eller Sydvest.
19. Hvinand, *Glaucion clangula*.
Bucephala clangula clangula (L.).
 Almindelig Vintergæst. Maaske ynglende, men gyldigt Bevis mangler; træffes regelmæssigt sine Steder om Sommeren. Kendes fra Stenalder.
20. Havlit, *Pagonetta glacialis*.
Clangula hyemalis (L.).
 Almindelig Vintergæst. Kendes fra Stenalder.

21. Sortand, *Oedemia nigra*.
Oidemia nigra nigra (L.).
 Almindelig Vintergæst. Ikke sjælden om Sommeren, men da næsten udelukkende, ligesom for Fløjlsandens Vedkommende, fjorgamle Fugle. Kendes fra Stenalder.
22. Fløjlsand, *Oedemia fusca*.
Oidemia fusca fusca (L.).
 Almindelig Vintergæst. Ikke ynglende, yngre Fugle træffes almindeligt om Sommeren. Kendes fra Stenalder.
23. Steller's And, *Somateria dispar*.
Polysticta stelleri (Pall.).
 Tilfældig Gæst fra Nordøst; truffen nogle faa Gange.
24. Ederfugl, *Somateria mollissima*.
Somateria mollissima mollissima L.
 Faatallig ynglende; noget almindeligere paa Slesvigs Vestkyst: Rømø. Standfugl. Talrig Vintergæst. Kendes fra Sten- og Jernalder.
25. Kongeederfugl, *Somateria spectabilis*.
Somateria spectabilis (L.).
 Sjælden Vintergæst fra Nordøst.
26. Lille Skallesluger, *Mergus albellus*.
Mergus albellus L.
 Regelmæssig, noget faatallig Vintergæst.
27. Stor Skallesluger, *Mergus merganser*.
Mergus merganser merganser L.
 Sjælden og faatallig som Ynglefugl. Vist Standfugl. Almindelig Vintergæst. Yngre Fugle undertiden oversomrende her i Landet. Kendes fra Stenalder.
28. Toppet Skalleslugger, *Mergus serrator*.
Mergus serrator L.
 Ret almindelig som ynglende. Vist Standfugl. Almindelig Vintergæst. Kendes fra Sten- og Jernalder.
29. Svanegaas, *Anser cygnoides*.
Cygnopsis cygnoides (L.).
 Tilfældig Gæst fra Øst. Kun truffen en Gang; to Stykker.
30. Sædgaas, *Anser segetum*.
Anser fabalis fabalis (Lath.).
 Meget talrig paa Gennemrejse, stundom overvintrende.
31. Kortnæbbet Gaas, *Anser brachyrhynchus*.
Anser brachyrhynchus Baill.
 Almindelig paa Gennemrejse og undertiden sine Steder overvintrende.
32. Sushkins Gaas, *Anser neglectus*.
Anser neglectus Sushk.
 Tilfældig Gæst fra Nordøst; truffen en Gang.

33. Blisgaas, *Anser albifrons*.
Anser albifrons albifrons (Scop.).
 Paa Gennemrejse, men ikke meget talrig.
34. Dværggaas, *Anser erythropus*.
Anser erythropus (L.).
 Sjælden Vintergæst fra Nordøst.
35. Graagaas, *Anser cinereus*.
Anser anser anser (L.).
 Pletvis ynglende; paa sine Steder endnu ret talrig. Trækfugl.
 Almindelig paa Gennemrejse. Kendes fra Sten- og Jernalder.
36. Indisk Gaas, *Anser indicus*.
Anser indicus (Lath.).
 Tilfældig Gæst fra Øst. Kun truffen en Gang.
37. Rødhalsset Gaas, *Anser ruficollis*.
Branta ruficollis (Pall.).
 Tilfældig Gæst fra Sibirien; skudt nogle faa Gange.
38. Knortegaas, *Anser torquatus*.
 Optræder i 2 Racer:
Branta bernicla bernicla (L.).
 Knortegaas. Meget almindelig paa Gennemrejse og overvin-
 trende. Kendes fra Stenalder.
Branta bernicla hrota (O. F. Müller).
 Lysbuget Knortegaas. Ses paa Gennemrejse og overvintrende,
 men knap saa talrig.
39. Bramgaas, *Anser leucopsis*.
Branta leucopsis (Bechst.).
 Ikke sjælden paa Gennemrejse og om Vinteren.

HØNSEFUGLE, RASORES.

40. Vagtel, *Coturnix communis*.
Coturnix coturnix coturnix (L.).
 Ynglefugl, men er i seneste Tid bleven sjældnere. Trækfugl.
41. Agerhøne, *Perdix cinerea*.
Perdix perdix perdix (L.).
 Ynglefugl. Standfugl. Almindelig. Nu vist kun faa Steder
 ublandet.
42. Urfugl, *Tetrao tetrix*.
Lyrurus tetrix britannicus (With. & Lönnberg).
 Ret almindelig Standfugl i Jylland.
43. Tjur, *Tetrao urogallus*.
Tetrao urogallus urogallus (L.).
 Almindelig i Stenalder, men forlængst uddød; i Nutiden truffen
 en enkelt Gang.

LOMFUGLE, COLYMBIFORMES.

44. Dværglappedykker, *Tachybaptus minor*.
Podiceps ruficollis ruficollis (Pall.).
 Ret almindelig som ynglende. Trækfugl, undertiden dog overvintrende. Kendes fra Stenalder.
45. Nordisk Lappedykker, *Podiceps auritus*.
Podiceps auritus (L.).
 Faatallig Vintergæst. Beretningerne om dens Ynglen i Landet næppe rigtige.
46. Sorthalset Lappedykker, *Podiceps nigricollis*.
Podiceps nigricollis nigricollis Brehm.
 Ret almindelig som Ynglefugl i Vestjylland, men har ogsaa begyndt at yngle paa Sjælland. Trækfugl; undertiden overvintrende.
47. Rødhalsset Lappedykker, *Podiceps griseigena*.
Podiceps griseigena griseigena (Bodd.).
 Ret almindelig som Ynglefugl. Trækfugl. Træffes dog ofte om Vinteren. Kendes fra Stenalder.
48. Toppet Lappedykker, *Podiceps cristatus*.
Podiceps cristatus cristatus (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl, nogle dog undertiden overvintrende. Kendes fra Stenalder.
49. Sortstrubet Lom, *Colymbus arcticus*.
Colymbus arcticus arcticus L.
 Regelmæssig men noget faatallig Vintergæst; nogle yngre Fugle oversomre stundom. Kendes fra Sten- og Jærnalder.
50. Islom, *Colymbus glacialis*.
 Sjælden Vintergæst, der optræder i 2 Racer:
Colymbus immer immer Brünn.
 Islom. Faatallig, ustadig Vintergæst.
Colymbus immer adamsii Gray.
 Hvidnæbbet Islom. Meget sjælden Vintergæst fra Nordøst.
51. Rødstrubet Lom, *Colymbus septentrionalis*.
Colymbus stellatus Pontopp.
 Almindelig Vintergæst; undertiden oversomrende. Kendes fra Stenalder.

STORMFUGLE, TUBINARES.

52. Lille Stormsvale, *Procellaria pelagica*.
Hydrobates pelagicus (L.).
 Tilfældig Vintergæst fra Atlanterhavet.
53. Kløfthalet Stormsvale, *Procellaria leucorrhoa*.
Oceanodroma leucorrhoa leucorrhoa (Vieill.).
 Tilfældig Vintergæst fra Atlanterhavet.

54. Skraape, *Puffinus anglorum*.
Er truffen i 2 Racer:
Puffinus puffinus puffinus (Brünn.).
Almindelig Skraape. Tilfældig Vintergæst fra Atlanterhavet.
Puffinus puffinus mauretanicus Lowe.
Middelhavsskraape. Truffen en Gang som tilfældig Gæst fra Middelhavet.
55. Sodfarvet Skraape, *Puffinus griseus*.
Puffinus griseus (Gm.).
Truffen en Gang i nyeste Tid. Tilfældig Gæst fra Atlanterhavet.
56. Storskraape, *Puffinus gravis*.
Puffinus gravis (O'Reilly).
Truffen en Gang i nyeste Tid. Tilfældig Gæst fra Atlanterhavet.
57. Stormfugl, *Fulmarus glacialis*.
Fulmarus glacialis glacialis (L.).
Gæst fra Atlanterhavet, paa Vestkysten dog ret hyppigt forekommende. Skylls ofte død paa Land.

VANDHØNS, RALLIFORMES.

58. Engsnarre, *Crex pratensis*.
Crex crex (L.).
Ret almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Ses jævnlig paa Gennemrejse.
59. Lille Rørvagt, *Porzana minuta*.
Porzana parva (Scop.).
Kun set faa Gange i Landet. Formodes at yngle. Trækfugl.
60. Dværgrørvagt, *Porzana pygmaea*.
Porzana pusilla intermedia (Herm.).
Kun set faa Gange i Landet. Formodes at yngle. Trækfugl.
61. Plettet Rørvagt, *Porzana maruetta*.
Porzana porzana (L.).
Ret almindelig Ynglefugl. Trækfugl.
62. Vandrikse, *Rallus aquaticus*.
Rallus aquaticus aquaticus L.
Almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Ret talrig paa Gennemrejse, ofte overvintrende.
63. Rørhøne, *Gallinula chloropus*.
Gallinula chloropus chloropus (L.).
Almindelig Ynglefugl. Trækfugl, dog ret ofte overvintrende.
64. Blishøne, *Fulica atra*.
Fulica atra atra L.
Almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Ikke sjældent overvintrer en Del. Kendes fra Stenalder.

TRANEFUGLE, GRUIFORMES.

65. Dværgtrappe, *Otis tetrax*.
Otis tetrax tetrax L.
 Tilfældig Gæst fra Syd.
66. Stortrappe, *Otis tarda*.
Otis tarda tarda L.
 Tilfældig Gæst fra Syd, vel fra Nordtyskland. Har forsøgt at yngle her.
67. Kravetrappe, *Otis undulata macqueenii*.
Chlamydotis undulata macquenii (Gray).
 Tilfældig Gæst fra Sydøst.
68. Trane, *Grus cinerea*.
Megalornis grus grus (L.).
 Har tidligere ynglet i Landet. Ses regelmæssigt paa Gennemrejse. Kendes fra Sten- og Jernalder.
69. Jomfrutrane, *Grus virgo*.
Anthropoides virgo (L.).
 Tilfældig, sjælden Gæst fra Syd.

VADEFUGLE, LIMICOLÆ.

70. Triel, *Oedinenus crepitans*.
Burhinus oedinenus oedinenus (L.).
 Tilfældig, ret sjælden Gæst fra Syd.
71. Vibe, *Vanellus cristatus*.
Vanellus vanellus (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Ikke sjældent nogle overvintrende.
72. Strandhjejle, *Charadrius squatarola*.
Squatarola squatarola squatarola (L.).
 Almindelig paa Gennemrejse. For- og Efteraar.
73. Hjejle, *Charadrius pluvialis*.
 Optræder i 2 Racer:
Charadrius apricarius apricarius (L.).
 Nordlig Hjejle. Meget almindelig paa Gennemrejse For- og Efteraar.
Charadrius apricarius oreophilus A. C. Meinertzhagen.
 Hjejle. Ynglefugl i Jylland. I de senere Aar i aftagende Antal.
74. Pomeransfugl, *Eudromias morinellus*.
Eudromias morinellus L.
 Ret almindelig paa Gennemrejse, mest om Foraaret. Efterretningerne om dens Ynglen i Landet næppe at lide paa.
75. Lille Præstekrave, *Ægialitis minor*.
Ægialites dubius curonicus (Gm.).
 Faatallig Ynglefugl. Trækfugl.

76. Almindelig Præstekrave, *Ægialitis hiaticula*.
Optræder i 2 Racer:
Aegialites hiaticula hiaticula (L.).
Almindelig Præstekrave. Almindelig som Ynglefugl. Trækfugl.
Aegialites hiaticula tundrae (Lowe).
Nordøstlig Præstekrave. Ikke sjælden paa Gennemrejse.
77. Hvidbrystet Præstekrave, *Ægialitis cantiana*.
Aegialites alexandrinus alexandrinus (L.).
Ret almindelig Ynglefugl. Trækfugl.
78. Stenvender, *Streptopelia interpres*.
Arenaria interpres interpres (L.).
Faatallig Ynglefugl. Trækfugl. Ret talrig paa Gennemrejse.
79. Strandskade, *Hæmatopus ostreologus*.
Haematopus ostralegus ostralegus L.
Almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Almindelig paa Gennemrejse.
80. Braksvale, *Glareola praticola*.
Glareola pratincola pratincola (L.).
Truffen en Gang.
81. Ørkenløber, *Cursorius gallicus*.
Cursorius cursor cursor (Lath.).
Tilfældig, sjælden Gæst fra Syd.
82. Smaaspøve, *Numenius phaeopus*.
Numenius phaeopus phaeopus (L.).
Almindelig paa Gennemrejse.
83. Storspøve, *Numenius arquatus*.
Numenius arquata arquata (L.).
Almindelig paa Gennemrejse; undertiden overvintrende, særlig paa Jyllands Vestkyst.
84. Lille Kobbersneppe, *Limosa lapponica*.
Limosa lapponica lapponica (L.).
Almindelig paa Gennemrejse For- og Efteraar.
85. Sorthalet Kobbersneppe, *Limosa ægocephala*.
Limosa limosa limosa (L.).
Ret faatallig Ynglefugl. Ikke helt sjælden paa Gennemrejse.
86. Sneppeklire, *Macrorhamphus griseus*.
Macrorhamphus griseus scolopaceus (Say).
Truffen en Gang. Tilfældig Gæst fra Amerika.
87. Mudderklire, *Actitis hypoleuca*.
Actitis hypoleuca (L.).
Undertiden ynglende. Trækfugl. Almindelig paa Gennemrejse.
88. Tinksmed, *Totanus glareola*.
Tringa glareola L.
Ret almindelig som ynglende. Trækfugl. Ret almindelig paa Gennemrejse.

89. Svaleklire, *Totanus ochropus*.
Tringa ochropus L.
 Formodes at have ynglet her i Landet. Trækfugl. Ret almindelig paa Gennemrejse.
90. Rødben, *Totanus calidris*.
Tringa totanus totanus (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Almindelig paa Gennemrejse. Kendes fra Stenalder.
91. Sortklire, *Totanus fuscus*.
Tringa erythropus (Pall.).
 Ret faatallig paa Gennemrejse, mest unge Fugle og om Efteraaret.
92. Hvidklire, *Totanus glottis*.
Tringa nebularia (Gunn.).
 Ret almindelig paa Gennemrejse.
93. Bartram's Klire, *Bartramia longicauda*.
Bartramia longicauda (Bechst.).
 Truffen en Gang. Tilfældig Gæst fra Amerika.
94. Brushane, *Machetes pugnax*.
Philomachus pugnax (L.).
 Ret almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Ogsaa paa Gennemrejse. Kendes fra Stenalder.
95. Stytløber, *Himantopus candidus*.
Himantopus himantopus himantopus L.
 Tilfældig sjælden Gæst fra Syd.
96. Klyde, *Recurvirostra avocetta*.
Recurvirostra avocetta L.
 Yngler nogle Steder i Landet, talrigst i Jylland. Trækfugl.
97. Dværgryle, *Tringa minuta*.
Erolia minuta (Leisl.).
 Almindelig paa Gennemrejse.
98. Temminck's Ryle, *Tringa temminckii*.
Erolia temminckii (Leisl.).
 Ikke sjælden paa Gennemrejse.
99. Sortgraa Ryle, *Tringa maritima*.
Erolia maritima maritima (Brünn.).
 Ret almindelig Vintergæst.
100. Islandsk Ryle, *Tringa canutus*.
Erolia canutus canutus (L.).
 Almindelig paa Gennemrejse.

101. Almindelig Ryle, *Tringa alpina*.
Optræder her i Landet i 2 Racer:
Erolia alpina alpina (L.).
Almindelig Ryle. Almindelig paa Gennemrejse, undertiden overvintrende.
Erolia alpina schinzii Brehm.
Schinz's Ryle. Almindelig som Ynglefugl. Trækfugl.
102. Krumnæbbet Ryle, *Tringa subarquata*.
Erolia ferruginea (Brünn.).
Ret almindelig paa Gennemrejse.
103. Brednæbbet Ryle, *Limicola pygmæa*.
Limicola falcinellus falcinellus (Pontopp.).
Ret faatallig paa Gennemrejse.
104. Selning, *Calidris arenaria*.
Crocethia alba (Pall.).
Almindelig paa Gennemrejse. Ofte overvintrende.
105. Odinshane, *Phalaropus hyperboreus*.
Phalaropus lobatus (L.).
Ret sjælden paa Gennemrejse, undertiden overvintrende.
106. Thorshane, *Phalaropus fulicarius*.
Phalaropus fulicarius (L.).
Sjælden paa Gennemrejse og overvintrende.
107. Smaabekkasin, *Limnocyptes gallinula*.
Limnocyptes minimus (Brünn.).
Almindelig paa Gennemrejse. Ofte overvintrende.
108. Hørsegøg, *Gallinago scolopacina*.
Capella gallinago gallinago (L.).
Almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Almindelig paa Gennemrejse; nogle undertiden overvintrende.
109. Tredækker, *Gallinago major*.
Capella media (Lath.).
Nu meget faatallig Ynglefugl; tidligere almindeligere. Ret faatallig paa Gennemrejse.
110. Skovsneppe, *Scolopax rusticula*.
Scolopax rusticula rusticula L.
Hist og her ynglende faatalligt. Trækfugl. Talrig paa Gennemrejse, nogle stundom overvintrende.

MAAGE- OG ALKEFUGLE, LARIFORMES.

111. Dværgmaage, *Larus minutus*.
Larus minutus Pall.
Hist og her ynglende faatalligt. Forekommende undertiden om Vinteren.

112. Hættemaage, *Larus ridibundus*.
Larus ridibundus ridibundus L.
 Almindelig Ynglefugl. Er efterhaanden bleven nærmest Standfugl. Kendes fra Stenalder.
113. Stormmaage, *Larus canus*.
Larus canus canus L.
 Almindelig Ynglefugl. Standfugl. Kendes fra Stenalder.
114. Sølvmaage, *Larus argentatus*.
Larus argentatus argentatus Pontopp.
 Sølvmaage. Ret almindelig Ynglefugl. Standfugl. Kendes fra Sten- og Jernalder. Talrig Vintergæst.
Larus argentatus cachinnans Pall.
 Gulbenet Sølvmaage. Sølvmaager med gule Ben er nogle Gange trufne her i Landet, uden at det har været muligt at afgøre, om de tilhører Artens typiske Form, der muligvis *kan* have gule Ben, eller Racen *cachinnans*.
115. Sildemaage, *Larus fuscus*.
 Optræder her i Landet i 3 Racer:
Larus fuscus fuscus L.
 Sildemaage. Yngler paa Græsholmen ved Christiansø, N. for Bornholm. Ret faatallig Efteraars- og Vintergæst fra østsvenske Ynglepladser.
Larus fuscus intermedius Schiöler.
 Norsk Sildemaage. Faatallig Gæst fra vestsvenske og norske Ynglepladser.
Larus fuscus affinis Reinh.
 Britisk Sildemaage. Ustadig Gæst paa Jyllands Vestkyst.
116. Svartbag, *Larus marinus*.
Larus marinus L.
 Har maaske ynglet en enkelt Gang; fuldgyldigt Bevis mangler. Ses almindelig hele Aaret; om Sommeren mest yngre Fugle i Fædningstragter. Kendes fra Stenalder.
117. Hvidvinget Maage, *Larus leucopterus*.
Larus glaucoides Meyer.
 Tilfældig Vintergæst.
118. Graamaage, *Larus glaucus*.
Larus hyperboreus Gunn.
 Jævnlig Vintergæst, særlig ved Jyllands Vestkyst: mest unge Fugle.
119. Ride, *Larus tridactylus*.
Rissa tridactyla tridactyla (L.).
 Ikke sjælden Vintergæst.
120. Ismaage, *Larus eburneus*.
Pagophila eburnea (Phipps).
 Sjælden, tilfældig Vintergæst.

121. Dværgterne, *Sterna minuta*.
Sterna albifrons albifrons Pall.
 Ret almindelig Ynglefugl. Trækfugl.
122. Fjordterne, *Sterna hirundo*.
Sterna hirundo hirundo L.
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Kendes fra Stenalder.
123. Havterne, *Sterna macrura*.
Sterna macroura Naum.
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl.
124. Dougall's Terne, *Sterna paradisea*.
Sterna dougallii dougallii Mont.
 Meget sjælden; har maaske ynglet. Trækfugl.
125. Splitterne, *Sterna cantiaca*.
Sterna sandvicensis sandvicensis Lath.
 Pletvis talrigt ynglende. Trækfugl.
126. Røvterne, *Sterna caspia*.
Hydroprogne tschegrava tschegrava (Lep.)
 Vistnok udryddet som ynglende. Faatallig og sjælden Trækfugl.
127. Sandterne, *Sterna anglica*.
Gelochelidon nilotica nilotica (Gm.).
 Talrigt ynglende nogle Steder i Jylland. Trækfugl.
128. Hvidvinget Terne, *Sterna leucoptera*.
Chlidonias leucoptera (Temm.).
 Tilfældig sjælden Gæst fra Syd.
129. Sortterne, *Sterna nigra*.
Chlidonias nigra nigra (L.).
 Ret almindelig ynglende. Trækfugl.
130. Kjove, *Lestris parasitica*.
Stercorarius parasiticus parasiticus (L.).
 Har ynglet enkelte Steder. Fra ny Tid ingen Underretning.
 Ikke sjælden paa Gennemrejse.
131. Lille Kjove, *Lestris longicauda*.
Stercorarius longicaudus Vieill.
 Ikke helt sjælden paa Gennemrejse.
132. Mellemkjove, *Lestris pomatorhina*.
Stercorarius pomarinus (Temm.).
 Faatallig, regelmæssigt paa Gennemrejse.
133. Storkjove, *Lestris catarrhactes*.
Stercorarius skua skua (Brünn.).
 Sjælden, tilfældig Vintergæst.
134. Tejste, *Cephus grylle*.
Uria grylle grylle (L.).
 Faatallig som ynglende; har været almindeligere. Vist Stand-
 fugl. Almindelig Vintergæst.

135. Lomvie, *Uria troile*.
Optræder i 2 Racer:
Uria aalge aalge (Pontopp.).
Langnæbbet Lomvie. Almindelig Vintergæst. Kendes fra Stenalder.
Uria aalge albionis With.
Sydlig Lomvie. Den blege, sydlige Form træffes i vore Farvande; om det er den, der har ynglet faatalligt i Landet paa Bornholm, er uvist.
136. Kortnæbbet Lomvie, *Uria arra*.
Uria lomvia lomvia (L.).
Sjælden Vintergæst.
137. Søkonge, *Mergulus alle*.
Alle alle (L.).
Ustadig Vintergæst, undertiden talrig.
138. Alk, *Alca torda*.
Alca torda L.
Ynglende paa Græsholmen ved Christiansø, N. for Bornholm. Almindelig Vintergæst. Kendes fra Stenalder.
139. Gejrfugl, *Alca impennis*.
Alca impennis L.
Kendes her i Landet kun fra Stenalder; har vist da ynglet her eller i Nærheden.
140. Lunde, *Fratercula arctica*.
Optræder i 2 Racer:
Fratercula arctica arctica (L.).
Lunde. Regelmæssig, dog ikke talrig Vintergæst, særlig paa Jyllands Vestkyst.
Fratercula arctica grabae (Brehm).
Færøisk Lunde. Gæster fra de faa Ynglepladser paa Sveriges Vest- og Norges Sydvestkyst ses her.

HEJREFUGLE, CICONIIFORMES.

141. Tophejre, *Ardea comata*.
Ardeola ralloides ralloides (Scop.).
Tilfældig, sjælden Gæst fra Syd.
142. Kohejre, *Ardea bubulcus*.
Ardeola ibis ibis (L.).
Tilfældig, sjælden Gæst fra Syd.
143. Hejre, *Ardea cinerea*.
Ardea cinerea cinerea L.
Ret almindelig som ynglende. Trækfugl, dog jævnlig overvin-trende. Kendes fra Sten- og Jernalder.

144. Purpurhejre, *Ardea purpurea*.
Ardea purpurea purpurea L.
 Tilfældig, sjælden Gæst fra Syd.
145. Dværghejre, *Ardetta minuta*.
Ixobrychus minutus minutus (L.).
 Sjælden Gæst; Trækfugl.
146. Rørdrum, *Botaurus stellaris*.
Botaurus stellaris stellaris (L.).
 Har været almindelig Ynglefugl, nu faatallig. Trækfugl, nogle overvintrende. Kendes fra Stenalder.
147. Nathejre, *Nycticorax griseus*.
Nycticorax nycticorax nycticorax (L.).
 Tilfældig, sjælden Gæst fra Syd.
148. Sort Ibis, *Plegadis falcinellus*.
Plegadis falcinellus falcinellus (L.).
 Tilfældig Gæst fra Syd.
149. Skehejre, *Platalea leucorodia*.
Platalea leucorodia leucorodia L.
 Har nogle Gange i senere Tid ynglet her i Landet. Tilfældig Gæst fra Syd, vist fra Holland.
150. Stork, *Ciconia alba*.
Ciconia ciconia ciconia (L.).
 Stærkt aftagende i Antal men dog endnu nogenlunde almindelig som ynglende. Trækfugl.
151. Sort Stork, *Ciconia nigra*.
Ciconia nigra L.
 Meget faatallig som ynglende. Trækfugl. Kendes fra Stenalder.

AAREFODEDE, STEGANOPODES.

152. Skarv, *Phalacrocorax carbo*.
 Optræder i 2 Racer:
Phalacrocorax carbo carbo (L.).
 Storskarv. Vintergæst, paa sine Steder talrig og oversomrende, mest yngre Fugle. Kendes fra Sten- og Jernalder.
Phalacrocorax carbo subcormoranus (Brehm).
 Almindelig Skarv. Har ynglet i Landet men er nu udryddet som Ynglefugl. I nyeste Tid atter truffen strejfende i vore Farvande, vel fra Ynglepladser paa Rügen og andetsteds nær Østersøens sydlige Kyster. Kendes ogsaa fra Stenalder: Nexelø.
153. Topskarv, *Phalacrocorax graculus*.
Phalacrocorax aristotelis aristotelis (L.).
 Tilfældig, ret sjælden Gæst.

154. Dværgskarv, *Phalacrocorax pygmaeus*.
Phalacrocorax pygmaeus (Pall.).
 Tilfældig, sjælden Gæst fra Sydøst. Angives truffen en Gang.
155. Krøltoppet Pelikan, *Pelecanus crispus*.
Pelecanus crispus Bruch.
 Kendt fra Stenalder. Nyere Iagttagelser af Pelikaner i Danmark kan ikke anses for sikre.
156. Sule, *Sula bassana*.
Sula bassana bassana (L.).
 Ustadig Gæst fra Atlanterhavet og Nordsøen; paa Jyllands Vestkyst dog jævnligt forekommende hvert Aar. Kendes fra Sten- og Jernalder.

ROVFUGLE, RAPTATORES.

157. Taarnfalk, *Falco tinnunculus*.
Falco tinnunculus tinnunculus L.
 Ret almindelig ynglende. Tildels overvintrende. Talrig paa Gennemrejse.
158. Amerikansk Taarnfalk, *Falco sparverius*.
Falco sparverius sparverius L.
 Tilfældig Gæst fra Amerika. Kun truffen en Gang.
159. Rødfodfalk, *Falco vespertinus*.
Falco vespertinus vespertinus L.
 Sjælden. Trækfugl. Har maaske ynglet her i Landet.
160. Dværgfalk, *Falco aesalon*.
Falco columbarius aesalon Tunst.
 Regelmæssig paa Gennemrejse og som Vintergæst.
161. Lærkefalk, *Falco subbuteo*.
Falco subbuteo subbuteo L.
 Var tidligere ikke helt sjælden som ynglende. Trækfugl.
162. Vandrefalk, *Falco peregrinus*.
Falco peregrinus peregrinus Tunst.
 Yngler endnu et Par Steder. Ikke sjælden som Vintergæst. Med Hensyn til Forekomsten af Racen *calidus* kan intet sikkert siges.
163. Jagtfalk, *Falco gyrfalco*.
Falco rusticolus rusticolus L.
 Sjælden Vintergæst.
164. Musevaage, *Buteo vulgaris*.
 Optræder i følgende 3 Racer:
Buteo buteo buteo (L.).
 Almindelig Musevaage. Almindelig Ynglefugl. I de senere

- Aar stærkt aftaget i Tal. Trækfugl. Undertiden overvintrende. Kendes fra Sten- og Jernalder.
Buteo buteo intermedius Menzbier.
 Østlig Musevaage. Ikke sjælden paa Gennemrejse. Mere eller mindre udprægede Stykker ses.
Buteo buteo vulpinus Gloger.
 Steppevaage. Sjælden Gæst fra Sydøst.
165. Ørnevaage, *Buteo ferox*.
Buteo ferox ferox (Gm.).
 Meget sjælden Gæst fra Sydøst.
166. Vintermusevaage, *Buteo lagopus*.
Buteo lagopus lagopus (Brünn.).
 Ret almindelig Vintergæst.
167. Lille Skrigørn, *Aquila nævia*.
Aquila pomarina pomarina Brehm.
 Sjælden Gæst fra Sydøst.
168. Stor Skrigørn, *Aquila clanga*.
Aquila clanga Pall.
 Sjælden Gæst fra Sydøst.
169. Kongeørn, *Aquila fulva*.
Aquila chrysaëtus (L.).
 Har tidligere ynglet i Landet. Nu faatallig Vintergæst. Kendes fra Sten- og Jernalder.
170. Havørn, *Haliaëtus albicilla*.
Haliaëtus albicilla albicilla (L.).
 Udryddet som Ynglefugl. Var Standfugl. Faatallig Vintergæst. Kendes fra Sten- og Jernalder.
171. Slangeørn, *Circaëtus gallicus*.
Circaëtus gallicus (Gm.).
 Tilfældig Gæst fra Syd.
172. Hvepsevaage, *Pernis apivorus*.
Pernis apivorus apivorus (L.).
 Faatallig Ynglefugl. Trækfugl. Ret talrig paa Gennemrejse. Kendes fra Stenalder.
173. Sort Glente, *Milvus migrans*.
Milvus migrans migrans (Bodd.).
 Tilfældig Gæst fra Syd. Har forsøgt at yngle.
174. Glente, *Milvus icinus*.
Milvus milvus milvus (L.).
 Vist nu udryddet som Ynglefugl. Var Trækfugl, Ses endnu en sjælden Gang paa Gennemrejse. Kendes fra Stenalder.
175. Rørhøg, *Circus aeruginosus*.
Circus aeruginosus aeruginosus (L.).
 Som Ynglefugl nu stærkt indskrænket i Tal. Trækfugl.

176. Hedehøg, *Circus cineraceus*.
Circus pygargus (L.).
 Tiltager som Ynglefugl. Trækfugl.
177. Blaa Kærhøg, *Circus cyaneus*.
Circus cyaneus cyaneus (L.).
 Har maaske ynglet i Landet, men Underretning usikker. Ikke sjælden paa Gennemrejse og som Vintergæst.
178. Steppehøg, *Circus pallidus*.
Circus macrourus (Gm.).
 Tilfældig, sjælden Gæst fra Sydøst.
179. Spurvehøg, *Accipiter nisus*.
Accipiter nisus nisus (L.).
 Ret almindelig Ynglefugl. Tildels Trækfugl. Talrig paa Gennemrejse. Kendes fra Stenalder.
180. Duehøg, *Astur palumbarius*.
 Optræder i 3 Racer:
Astur gentilis gentilis (L.).
 Svensk Duehøg. Den større og lidt lysere, svenske Form ikke helt sjælden om Vinteren som Gæst; mest unge Fugle.
Astur gentilis dubius Sparrman.
 Duehøg. Sjælden Ynglefugl. I de seneste Aar lidt tiltagende i Antal. Standfugl. Kendes fra Bronze- og Jernalder.
Astur gentilis buteoides Menzbier.
 Russisk Duehøg. Den større og som Ungfugl helt graalige, russiske Form hyppigere om Vinteren end den svenske.
181. Fiskeørn, *Pandion haliaëtus*.
Pandion haliaëtus haliaëtus (L.).
 Har vist nu helt ophørt at være Ynglefugl i Landet. Var Trækfugl. Ses aarligt, men faatallig og sjælden paa Gennemrejse. Kendes fra Stenalder.
182. Aadselgrib, *Neophron percnopterus*.
Neophron percnopterus percnopterus (L.).
 Truffen en Gang som tilfældig Gæst fra Sydøst.
183. Gul Grib, *Gyps fulvus*.
Gyps fulvus fulvus (Habl.).
 Tilfældig Gæst fra Syd. Meget sjælden.
184. Graa Grib, *Vultur monachus*.
Aegyptius monachus (L.).
 Tilfældig Gæst fra Syd. Meget sjælden.

UGLER, STRIGES.

185. Spurveugle, *Glaucidium passerinum*.
Glaucidium passerinum passerinum (L.).
 Sjælden Vintergæst.

186. Kirkeugle, *Athene noctua*.
Athene noctua noctua (Scop.).
 Almindelig Ynglefugl i Jylland og paa Fyen. I Landets andre Dele ret sjælden. Standfugl.
187. Perleugle, *Nyctale funerea*.
Aegolius funereus funereus (L.).
 Ustadig Vintergæst. Somme Vintre ikke sjælden.
188. Høgeugle, *Surnia ulula*.
Surnia ulula ulula (L.).
 Sjælden Vintergæst.
189. Natugle, *Syrnium aluco*.
Strix aluco aluco L.
 Almindelig Ynglefugl, dog aftagende i Tal. Standfugl. Kendes fra Sten- og Jernalder. — Maaske tilhører Natuglerne i Landets vestlige Dele den vestlige Form, *Strix aluco sylvatica* Shaw eller danner Overgangen dertil. Spørgsmaalet lader sig endnu ikke besvare sikkert.
190. Dværghornugle, *Scops giu*.
Otus scops scops (L.).
 Truffen en Gang i Landet i nyeste Tid.
191. Mosehornugle, *Otus brachyotus*.
Asio flammeus flammeus (Pontopp.).
 Sjælden Ynglefugl. Vist Standfugl. Almindelig paa Gennemrejse og som Vintergæst.
192. Skovhornugle, *Otus vulgaris*.
Asio otus otus (L.).
 Ikke sjælden som Ynglefugl. Vist Standfugl. Ret talrig paa Gennemrejse og som Vintergæst.
193. Stor Hornugle, *Bubo maximus*.
Bubo bubo bubo (L.).
 Har tidligere ynglet faatallig. Nu udryddet. Meget sjælden Vintergæst.
194. Sneugle, *Nyctea nivea*.
Nyctea nyctea (L.).
 Faatallig, ustadig Vintergæst.
195. Slørugle, *Strix flammea*.
Tyto alba guttata (Brehm).
 Ikke helt sjælden Ynglefugl, navnlig i Jylland og paa Fyen. Standfugl.

DUEFUGLE, COLUMBIFORMES.

- 196 Steppehøne, *Syrnhaptes paradoxus*.
Syrnhaptes paradoxus (Pall.).
 Er et Par Gange indvandret i Landet i Flokke, kommende fra Øst. Ynglede, men forsvandt snart igen.

197. Turteldue, *Turtur auritus*.
Streptopelia turtur turtur (L.).
 Faatallig; yngler dog vist. En enkelt Gang funden med Rede.
 Trækfugl.
198. Østlig Turteldue, *Turtur orientalis*.
Streptopelia orientalis orientalis (Lath.).
 Tilfældig, sjælden Gæst fra Øst.
199. Huldue, *Columba oenas*.
Columba oenas oenas L.
 Faatallig som Ynglefugl. Trækfugl. Talrig paa Gennemrejse.
200. Ringdue, *Columba palumbus*.
Columba palumbus palumbus L.
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl, dog bliver mange hele Vinteren.
 Kendes fra Stenalder.

SKRIGEFUGLE, CLAMATORES.

201. Natravn, *Caprimulgus europæus*.
Caprimulgus europaeus europaeus L.
 Faatallig Ynglefugl. Trækfugl.
202. Mursejler, *Cypselus apus*.
Apus apus apus (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl.
203. Alpesejler, *Cypselus melba*.
Apus melba melba (L.).
 Tilfældig Gæst fra Syd. Truffen to Gange.
204. Ellekrage, *Coracias garrulus*.
Coracias garrulus garrulus L.
 Har ynglet i Landet, men er nu udryddet. Var Trækfugl. Nu
 meget sjælden Gæst paa Gennemrejse.
205. Biæder, *Merops apiaster*.
Merops apiaster (L.).
 Tilfældig Gæst fra Syd.
206. Isfugl, *Alcedo ispida*.
Alcedo atthis ispida L.
 Faatallig Ynglefugl. Vist Standfugl. Ikke helt sjælden Vinter-
 gæst.

KLATREFUGLE, SCANSORES.

207. Skadegøg, *Clamator glandarius*.
Clamator glandarius (L.).
 Truffen en Gang som tilfældig Gæst fra Syd.
208. Gøg, *Cuculus canorus*.
Cuculus canorus canorus L.
 Almindelig som ynglende. Trækfugl.

209. Vendehals, *Iynx torquilla*.
Iynx torquilla torquilla L.
 Faatallig Ynglefugl. Trækfugl. Ret almindelig paa Gennemrejse.
210. Graaspætte, *Gecinus canus*.
Picus canus canus Gm.
 Meget sjælden Vintergæst.
211. Grønspætte, *Gecinus viridis*.
Picus viridis virescens (Brehm).
 Faatallig Ynglefugl, mest i Jylland. Standfugl. Kendes fra Stenalder. — Maaske forekommer ogsaa den typiske, Svenske Grønspætte *Picus viridis viridis* L. paa Sjælland. Spørgsmaalet kan endnu ikke afgøres med Sikkerhed.
212. Lille Flagspætte, *Dendrocopus minor*.
Dryobates minor minor (L.).
 Sjælden Vintergæst, vist fra Sverige.
213. Mellemlagspætte, *Dendrocopus medius*.
Dryobates medius medius (L.).
 Ret sjælden og faatallig Ynglefugl. Standfugl.
214. Stor Flagspætte, *Dendrocopus major*.
 Optræder i 2 Racer:
Dryobates major major (L.).
 Nordisk Flagspætte. Meget faatallig Ynglefugl paa Bornholm.
Dryobates major pinetorum (Brehm).
 Stor Flagspætte. Ret almindelig Ynglefugl. Standfugl. Kendes fra Stenalder.
215. Sortspætte, *Picus martius*.
Dryocopus martius martius (L.).
 Sjælden Vintergæst. Kendes fra Stenalder; var den Gang vist hjemmehørende i Landet.
216. Hærfugl, *Upupa epops*.
Upupa epops epops L.
 Har været ikke sjælden Ynglefugl i Landet, men er nu udryddet. Var Trækfugl. Ses endnu af og til som Gæst, men skydes da som Regel.

SPURVEFUGLE, PASSERES.

217. Skovskade, *Garrulus glandarius*.
Garrulus glandarius glandarius (L.).
 Ret almindelig Ynglefugl. Standfugl. Undertiden talrig Vintergæst. Kendes fra Stenalder.
218. Nøddekrige, *Nucifraga caryocatactes*.
 Optræder i 2 Racer:
Nucifraga caryocatactes caryocatactes (L.).
 Nøddekrige. Har ynglet paa Bornholm; fra nyere Tid savnes

Underretning; men Arten har dog maaske ynglet paa Sjælland i 1912. Sjælden Vintergæst.

Nucifraga caryocatactes macrorhynchus (Brehm).

Langnæbbet Nøddekrige. Undertiden talrig Vintergæst fra Øst.

219. Skade, *Pica caudata*.

Pica pica pica (L.).

Pletvis almindelig Ynglefugl. Standfugl.

220. Allike, *Corvus monedula*.

Optræder i 3 Racer:

Coloeus monedula monedula (L.).

Allike. Almindelig Ynglefugl. Tildels Standfugl. Talrig paa Gennemrejse.

Coloeus monedula spermologus (Vieill.).

Vestlig Allike. Faatallig Ynglefugl i Landets sydvestlige Del. Vist Standfugl.

Coloeus monedula collaris (Drummond).

Halsbaandallike. Alliker med lyse Halvringe paa Halssiden ikke helt sjældne. Gæster fra Øst?

221. Raage, *Corvus frugilegus*.

Corvus frugilegus frugilegus L.

Almindelig Ynglefugl. Trækfugl, dog jævnlig overvintrende. Talrig paa Gennemrejse.

222. Krage, *Corvus cornix*.

Optræder i 2 Racer:

Corvus cornix cornix L.

Graakraage. Almindelig Ynglefugl. Standfugl. Talrig paa Gennemrejse og som Vintergæst. Kendes fra Sten- og Jernalder.

Corvus cornix corone L.

Sortkrage. Yngler i Landets sydlige og sydvestlige Egne, hvor Melleformer mellem den og Graakragen er hyppige.

223. Ravn, *Corvus corax*.

Corvus corax corax L.

Meget faatallig Ynglefugl, næsten udryddet. Standfugl. Kendes fra Bronzealder.

224. Rødrygget Tornskade, *Lanius collyrio*.

Lanius collurio collurio L.

Ret almindelig Ynglefugl. Trækfugl.

225. Rødhovedet Tornskade, *Lanius senator*.

Lanius senator senator L.

Meget sjælden. Skal have ynglet her i Landet.

226. Rosenbrystet Tornskade, *Lanius minor*.

Lanius minor Gm.

Tilfældig Gæst fra Syd.

227. Stor Tornskade, *Lanius excubitor*.
Lanius excubitor excubitor L.
 Ikke sjældnen paa Gennemrejse eller som Vintergæst. Efterretning om dens Ynglen savner Bekræftelse.
228. Pirol, *Oriolus galbula*.
Oriolus oriolus oriolus (L.).
 Faatallig Ynglefugl, dog bredende sig. Trækfugl.
229. Silkehale, *Ampelis garrula*.
Bombycilla garrulus (L.).
 Ustadig Vintergæst; undertiden talrig.
230. Digesvale, *Hirundo riparia*.
Riparia riparia riparia (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Talrig paa Gennemrejse.
231. Bysvale, *Hirundo urbica*.
Delichon urbica urbica (L.).
 Almindelig Ynglefugl, dog ikke saa talrig som Dige- og Forstuesvale. Trækfugl.
232. Forstuesvale, *Hirundo rustica*.
Hirundo rustica rustica L.
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Talrig paa Gennemrejse.
233. Spætmejse, *Sitta europæa*.
 Forekommer i 2 Racer:
Sitta europæa europæa L.
 Nordisk Spætmejse. Spætmejsen af den typiske Race forekommer paa Sjælland; det kan ikke siges med Sikkerhed, om de kun er Gæster eller blander sig med den følgende.
Sitta europæa caesia Wolf.
 Almindelig Spætmejse. Paa Sjælland findes en Mellemform svarende til Racen *homeyeri* Hart. I Jylland træffes rene *caesia*, tildels ogsaa paa Fyen.
234. Hedelærke, *Alauda arborea*.
Lullula arborea arborea (L.).
 Faatallig Ynglefugl. Trækfugl. Ret almindelig paa Gennemrejse.
235. Lærke, *Alauda arvensis*.
Alauda arvensis arvensis (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Talrig paa Gennemrejse, nogle at se hele Vinteren.
236. Toplærke, *Alauda cristata*.
Galerida cristata cristata (L.).
 Ret almindelig Ynglefugl i Jylland og paa Fyen, bredende sig ogsaa til de andre Øer. Standfugl.
237. Bjerglærke, *Alauda alpestris*.
Eremophila alpestris flava (Gm.).
 Ustadig Vintergæst, stundom talrig.

238. Stær, *Sturnus vulgaris*.
Sturnus vulgaris vulgaris L.
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Undertiden nogle overvin-
 trende.
239. Rosenstær, *Pastor roseus*.
Pastor roseus (L.).
 Tilfældig Gæst fra Sydøst.
240. Gulhovedet Trupial, *Xanthocephalus icterocephalus*.
Xanthocephalus xanthocephalus Bp.
 Truffen en enkelt Gang og da muligvis undsluppen af Fangenskab.
241. Gærdesmutte, *Troglodytes parvulus*.
Troglodytes troglodytes troglodytes (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Standfugl. Almindelig Vintergæst.
242. Træløber, *Certhia familiaris*.
 Forekommer i 2 Racer:
Certhia familiaris familiaris L.
 Nordlig Træløber. Strejfer af og til over fra Sverige.
Certhia familiaris macrodactyla Brehm.
 Træløber. Ret almindelig Ynglefugl. Standfugl.
243. Vandstær, *Cinclus aquaticus*.
Cinclus cinclus cinclus (L.).
 Ikke sjælden Vintergæst. Underretning om dens Ynglen i
 Landet behøver Bekræftelse.
244. Brunelle, *Accentor modularis*.
Prunella modularis modularis (L.).
 Ret almindelig Ynglefugl. Trækfugl, nogle overvintrer dog.
245. Musvit, *Parus major*.
Parus major major L.
 Almindelig Ynglefugl. Standfugl.
246. Blaamejse, *Parus coeruleus*.
Parus coeruleus coeruleus L.
 Almindelig Ynglefugl. Standfugl.
247. Sortmejse, *Parus ater*.
Parus ater ater L.
 Ikke sjælden Ynglefugl. Bredende sig. Standfugl. Danske Sort-
 mejser synes at være en Melleform mellem *Parus ater ater*
 og den britiske Form *Parus ater britannicus* Sharpe & Dresser.
248. Sumpmejse, *Parus palustris*.
Parus palustris palustris L.
 Ret almindelig Ynglefugl. Standfugl.
249. Topmejse, *Parus cristatus*.
Parus cristatus mitratus Brehm.
 Bredende sig som Ynglefugl i Jylland og, i de sidste Aar, lige-
 ledes paa Fyen. Standfugl.

250. Halemejsje, *Acredula caudata*.
Aegithalos caudatus europaeus (Herm.).
 Ret faatallig Ynglefugl. Standfugl.
251. Skægmejsje, *Panurus biarmicus*.
Panurus biarmicus biarmicus (L.).
 Sjælden Gæst fra Syd.
252. Tornsanger, *Sylvia cinerea*.
Sylvia communis communis Lath.
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl.
253. Gærdesanger, *Sylvia curruca*.
Sylvia curruca curruca (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl.
254. Munk, *Sylvia atricapilla*.
Sylvia atricapilla atricapilla (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl.
255. Havesanger, *Sylvia hortensis*.
Sylvia borin (Bodd.).
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl.
256. Høgesanger, *Sylvia nisoria*.
Sylvia nisoria nisoria (Bechst.).
 Faatallig Ynglefugl. Trækfugl.
257. Gulbug, *Hypolais icterina*.
Hypolais icterina (Vieill.).
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl.
258. Kærsanger, *Acrocephalus palustris*.
Acrocephalus palustris (Bechst.).
 Ikke sjælden Ynglefugl. Trækfugl.
259. Rørsanger, *Acrocephalus arundinaceus*.
Acrocephalus scirpaceus scirpaceus (Herm.).
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl.
260. Drosselrørsanger, *Acrocephalus turdinus*.
Acrocephalus arundinaceus arundinaceus (L.).
 Ret sjælden Ynglefugl. Trækfugl.
261. Sivsanger, *Acrocephalus phragmitis*.
Acrocephalus schoenobaenus (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl.
262. Vandsanger, *Acrocephalus aquaticus*.
Acrocephalus aquaticus (Gm.).
 Sjælden Ynglefugl. Trækfugl.
263. Græshoppesanger, *Locustella naevia*.
Locustella naevia naevia (Bodd.).
 Sjælden Ynglefugl i Landets sydligste Dele. Trækfugl.

264. Flodsanger, *Locustella fluviatilis*.
Locustella fluviatilis (Wolf).
 Tilfældig Gæst fra Øst.
265. Løvsanger, *Phylloscopus trochilus*.
Phylloscopus trochilus trochilus (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Talrig paa Gennemrejse. Om
 Racen *eversmanni* (Bp.) forekommer, kan ikke siges.
266. Gransanger, *Phylloscopus rufus*.
 Optræder i 2 Racer:
Phylloscopus collybita collybita (Vieill.).
 Gransanger. Faatallig Ynglefugl. Trækfugl. De faa Gran-
 sangere, der har ynglet i Landet, tilhører vistnok den typiske
 Race.
Phylloscopus collybita abietinus (Nilss.).
 Skandinavisk Gransanger. Ret talrig paa Gennemrejse.
267. Skovsanger, *Phylloscopus sibilatrix*.
Phylloscopus sibilatrix sibilatrix (Bechst.).
 Ikke sjælden Ynglefugl. Trækfugl.
268. Hvidbrynet Løvsanger, *Phylloscopus superciliosus*.
Phylloscopus humei praemium Math. & Ire.
 Tilfældig Gæst fra Øst, Sibirien.
269. Fuglekonge, *Regulus cristatus*.
Regulus regulus regulus L.
 Ret almindelig Ynglefugl; nærmest Standfugl. Talrig paa
 Gennemrejse.
270. Rødtoppet Fuglekonge, *Regulus ignicapillus*.
Regulus ignicapillus ignicapillus (Temm.).
 Tilfældig Gæst fra Syd. Har i de senere Aar dog bredt sig
 mod Nord og kan træffes ynglende i Sønderjylland.
271. Engpiber, *Anthus pratensis*.
Anthus pratensis (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Talrig paa Gennemrejse. Ses
 stundom hele Vinteren.
272. Skærpiber, *Anthus aquaticus*.
Anthus spinoletta littoralis Brehm.
 Ret faatallig Ynglefugl. Trækfugl. Paa Gennemrejse ses ofte
 Skærpibere; de forbliver undertiden om Vinteren. Det kan dog
 endnu ikke siges, til hvilken Race disse hører.
273. Markpiber, *Anthus campestris*.
Anthus campestris (L.).
 Faatallig Ynglefugl nogle faa Steder i Landet. Trækfugl.
274. Skovpiber, *Anthus arboreus*.
Anthus trivialis trivialis (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Trækfugl.

275. Gul Vipstjert, *Motacilla flava*.
Forekommer i 3. Racer:
Motacilla flava flava L.
Gul Vipstjert. Almindelig Ynglefugl. Trækfugl.
Motacilla flava thunbergi Billberg.
Nordlig Vipstjert. Regelmæssigt ret talrig paa Gennemrejse.
Motacilla flava rayi (Bp.).
Gulhovedet Vipstjert. Tilfældig Gæst fra England.
276. Bjergvipstjert, *Motacilla melanope*.
Motacilla cinerea cinerea Tunst.
Tilfældig Gæst fra Syd eller Vest. I nyeste Tid funden ynglende i Jylland.
277. Hvid Vipstjert, *Motacilla alba*.
Forekommer i 2 Racer:
Motacilla alba alba L.
Hvid Vipstjert. Almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Talrig paa Gennemrejse.
Motacilla alba yarrellii Gould.
Sortrygget Vipstjert. Tilfældig Gæst fra Vest.
278. Vindrossel, *Turdus iliacus*.
Turdus musicus L.
Meget almindelig og talrig paa Gennemrejse; ofte nogle overvintrende.
279. Guldrossel, *Turdus varius*.
Turdus dauma aureus Hol.
Truffen to Gange som tilfældig Gæst fra Sibirien.
280. Sangdrossel, *Turdus musicus*.
Optræder i 2 Racer:
Turdus ericetorum ericetorum Turton.
Sangdrossel. De her i Landet ynglende Sangdrosler tilhører vist denne Race eller staar den i mindste meget nær.
Turdus ericetorum philomelus Brehm.
Nordlig Sangdrossel. Meget almindelig og talrig paa Gennemrejse.
281. Misteldrossel, *Turdus viscivorus*.
Turdus viscivorus viscivorus L.
Ret faatallig Ynglefugl. Nærmest Trækfugl, undertiden overvintrende. Hyppigere paa Gennemrejse; saadanne tilhører vist en østlig Race, blegere end den typiske, engelske Race. Kendes fra Stenalder.
282. Sortstrubet Drossel, *Turdus atrigularis*.
Turdus ruficollis atrogularis Temm.
Tilfældig, sjælden Gæst fra Sibirien.

283. Brundrossel, *Turdus fuscatus*.
Turdus eunomus Temm.
 Tilfældig, sjælden Gæst fra Sibirien.
284. Sjagger, *Turdus pilaris*.
Turdus pilaris L.
 Talrig paa Gennemrejse og som Vintergæst.
285. Ringdrossel, *Turdus torquatus*.
Turdus torquatus L.
 Ikke sjælden, men noget faatallig paa Gennemrejse.
286. Solsort, *Turdus merula*.
Turdus merula merula L.
 Almindelig Ynglefugl. Standfugl. Talrig paa Gennemrejse.
287. Digesmutte, *Saxicola oenanthe*.
 Optræder i 2 Racer:
Oenanthe oenanthe oenanthe (L.).
 Digesmutte. Ret almindelig Ynglefugl. Talrig paa Gennemrejse.
Oenanthe oenanthe leucorrhoa (Gm.).
 Større Digesmutte. Forekommer undertiden paa Gennemrejse.
288. Bynkefugl, *Praticola rubetra*.
Saxicola rubetra rubetra (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Talrig paa Gennemrejse.
289. Sortstrubet Bynkefugl, *Praticola rubicola*.
Saxicola torquata rubicola (L.).
 Maaske faatallig ynglende i Landets sydvestlige Del. Nærmest Trækfugl, maaske undertiden overvintrende.
290. Rødstjert, *Ruticilla phoenicura*.
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (L.).
 Ret faatallig som ynglende. Trækfugl. Talrig paa Gennemrejse. Kendes fra Stenalder.
291. Husrødstjert, *Ruticilla titys*.
Phoenicurus ochrurus gibrallariensis (Gm.).
 Bredende sig som Ynglefugl. Trækfugl, dog undertiden overvintrende.
292. Rødhals, *Erithacus rubecula*.
Erithacus rubecula rubecula (L.).
 Talrig paa Gennemrejse. De Rødhalse, der yngler almindeligt i Landet, tilhører maaske den vestlige Race *Erithacus rubecula melophilus* Hart. eller staar den i det mindste nær. Spørgsmaalet kan endnu ikke sikkert afgøres. Rødhalsen ses hele Vinteren.
293. Blaaahals, *Cyanecula suecica*.
 Optræder i 3 Racer:
Luscinia suecica suecica (L.).
 Blaaahals. Paa Gennemrejse, ikke hyppig.

- Luscinia suecica cyanecula* (Wolf).
Sydlig Blaahals. Meget sjælden, faatallig Ynglefugl. Trækfugl.
Luscinia suecica gaetkei (Kleinschm.).
Norsk Blaahals. Blandt de gennemrejsende forekommer
maaske denne Race, der yngler i det sydvestlige Norge.
294. Sydlig Nattergal, *Luscinia vera*.
Luscinia megarhyncha megarhyncha Brehm.
Sjælden Gæst fra Syd. Skal yngle faatalligt i Sønderjylland.
295. Nattergal, *Luscinia philomela*.
Luscinia luscinia (L.).
Almindelig som ynglende over det meste af Landet, dog ikke
i det nordlige og vestlige Jylland. Trækfugl.
296. Lille Fluesnapper, *Muscicapa parva*.
Siphia parva parva Bechst.
Meget sjælden, ustadig Ynglefugl. Trækfugl.
297. Broget Fluesnapper, *Muscicapa atricapilla*.
Ficedula hypoleuca hypoleuca (Pall.).
Ret almindelig Ynglefugl. Trækfugl. Talrig paa Gennemrejse.
298. Hvidhalset Fluesnapper, *Muscicapa albicollis*.
Ficedula albicollis Temm.
Hvidhalset Fluesnapper. Tilfældig Gæst fra Syd.
299. Graa Fluesnapper, *Muscicapa grisola*.
Muscicapa striata striata (Pall.).
Almindelig Ynglefugl. Trækfugl.
300. Graaspurv, *Passer domesticus*.
Passer domesticus domesticus (L.).
Almindelig Ynglefugl. Standfugl.
301. Skovspurv, *Passer montanus*.
Passer montanus montanus (L.).
Almindelig Ynglefugl. Standfugl.
302. Bogfinke, *Fringilla coelebs*.
Fringilla coelebs coelebs L.
Almindelig Ynglefugl. Tildels Trækfugl, mange overvintrende.
Talrig paa Gennemrejse.
303. Kvækerfinke, *Fringilla montifringilla*.
Fringilla montifringilla L.
Har ynglet nogle faa Gange. Almindelig Vintergæst, undertiden
i stor Mængde.
304. Kærnebider, *Coccothraustes vulgaris*.
Coccothraustes coccothraustes coccothraustes (L.).
Ikke sjælden Ynglefugl. Standfugl. Vintergæst.

305. Grønsisken, *Chrysomitris spinus*.
Carduelis spinus (L.).
 Faatallig, sjælden Ynglefugl. Almindelig Vintergæst.
306. Stillits, *Carduelis elegans*.
Carduelis carduelis carduelis (L.).
 Ret almindelig Ynglefugl. Tildels Standfugl. Vintergæst.
307. Brunsvenske, *Ligurinus sinicus*.
Chloris sinica sinica (L.).
 Tilfældig Gæst fra Østasien.
308. Svenske, *Ligurinus chloris*.
Chloris chloris chloris (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Tildels Standfugl.
309. Gulirisk, *Serinus hortulanus*.
Serinus canaria serinus (L.).
 Tilfældig Gæst fra Syd.
310. Tornirisk, *Cannabina linota*.
Carduelis cannabina cannabina (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Mest Trækfugl, dog mange overvintrende, maaske Gæster.
311. Bjergirisk, *Cannabina flavirostris*.
Carduelis flavirostris flavirostris (L.).
 Ret almindelig Vintergæst.
312. Graasisken, *Cannabina linaria*.
 Træffes i 2 Racer:
Carduelis linaria linaria (L.).
 Graasisken. Ret almindelig Vintergæst.
Carduelis linaria holboellii (Brehm).
 Stornæbbet Graasisken. Blandt de almindelige Graaiskener forekommer ikke sjældent denne Form.
313. Sibirisk Graasisken, *Cannabina exilipes*.
Carduelis hornemanni exilipes (Coues).
 Tilfældig Gæst fra Sibirien.
314. Dompap, *Pyrrhula vulgaris*.
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (L.).
 Ret almindelig Vintergæst.
315. Karmindompap, *Pyrrhula erythrina*.
Carpodacus erythrinus erythrinus (Pall.).
 Tilfældig, sjælden Gæst fra Øst.
316. Krognæb, *Pinicola enucleator*.
Pinicola enucleator enucleator (L.).
 Ustadig, stundom talrig Vintergæst.
317. Hvidvinget Korsnæb, *Loxia leucoptera*.
Loxia leucoptera bifasciata (Brehm).
 Tilfældig, ustadig Vintergæst fra Øst. Stundom ret talrig.

318. Lille Korsnæb, *Loxia curvirostra*.
Loxia curvirostra curvirostra L.
 Ret faatallig Ynglefugl. Standfugl. Talrigere som Gæst.
319. Stor Korsnæb, *Loxia pityopsittacus*.
Loxia pityopsittacus Borkh.
 Ikke sjælden Vintergæst.
320. Rørspurv, *Emberiza schoeniclus*.
Emberiza schoeniclus schoeniclus (L.).
 Almindelig Ynglefugl. Mest Trækfugl. Talrig paa Gennemrejse, nogle stundom overvintrende.
321. Hørtulan, *Emberiza hortulana*.
Emberiza hortulana L.
 En sjælden Gang ynglende. Trækfugl. Faatallig paa Gennemrejse.
322. Gulspurv, *Emberiza citrinella*.
Emberiza citrinella citrinella (L.).
 Gulspurv. Almindelig Ynglefugl. Standfugl.
323. Kornverling, *Emberiza miliaria*.
Emberiza calandra calandra L.
 Almindelig Ynglefugl. Standfugl.
324. Laplandsverling, *Emberiza lapponica*.
Calcarius lapponicus lapponicus (L.).
 Tilfældig Vintergæst.
325. Snespurv, *Emberiza nivalis*.
Plectrophenax nivalis (L.).
 Almindelig Vintergæst.

I ovenstaaende Liste er — naar fraregnes 2 jordfundne Arter, en Rype, *Lagopus sp.*, og en Stormfugl, *Oestrelata sp.*, af hvilke de foreliggende Knogler har været utilstrækkelige til sikker Artsbestemmelser — alle de Fugle nævnt, som overhovedet er trufne inden for Danmarks Grænser. Den Rolle, som de enkelte Arter spiller i det samlede Faunabillede, er imidlertid højst forskellig; alle Overgange findes i Virkeligheden mellem Arter, som kan ses hver eneste Dag, og saadanne, som er rent tilfældige Gæster og kun jagttagne en enkelt Gang. Tallet af Fugle, der yngler her i Landet, er derfor langt ringere, kun 177 Arter, og af disse er tilmed mange sjældne og faatallige. Erindres maa det dog samtidig, at en Række Arter, uden at yngle her i Landet, alligevel til Tider kan udgøre en meget væsentlig Del af den samlede Fuglebestand, nemlig de Arter, som enten om Foraaret og om Efteraaret drager gennem Landet i stort Antal, eller som ved Vintertid tager Ophold her i store Skarer. Til Oplysning om disse Forhold anføres i det følgende en Række Oversigter.

ARTER, DER YNGLER ELLER I HISTORISK TID HAR YNGLET
I DANMARK.

Krikand.	Skovsneppe.
Atling.	Dværgmaage.
Knarand.	Hættemaage.
Spidsand.	Stormmaage.
Stokand.	Sølvmage.
Skeand.	Sildemaage.
Gravand.	Dværgterne.
Knopsvane.	Fjordterne.
Troldand.	Havterne.
Taffeland.	Splitterne.
Ederfugl.	*Rovterne.
Stor Skallesluger.	Sandterne.
Toppet Skallesluger.	Sorterne.
Graagaas.	*Kjove.
Vagtel.	Tejste.
Agerhøne.	*Sydlig Lomvie.
Urfugl.	Alk.
Dværglappedykker.	Hejre.
Sorthalset Lappedykker.	Rørdrum.
Rødhalset Lappedykker.	Skehejre.
Toppet Lappedykker.	Stork.
Engsnarre.	Sort Stork.
Plettet Rørvagtel.	*Almindelig Skarv.
Vandrikse.	Taarnfalk.
Rørhøne.	Lærkefalk.
Blishøne.	Vandrefalk.
*Stortrappe.	Almindelig Musevaage.
*Trane.	*Kongeørn.
Vibe.	*Havørn.
Hjejle.	Hvepsevaage.
Lille Præstekrave.	*Glente.
Almindelig Præstekrave.	Rørhøg.
Hvidbrystet Præstekrave.	Hedehøg.
Stenvender.	Spurvehøg.
Strandskade.	Duehøg.
Sorthalet Kobbersneppe.	*Fiskeørn.
Mudderklire.	Kirkeugle.
Tinksmed.	Natugle.
Rødben.	Mosehornugle.
Brushane.	Skovhornugle.
Klyde.	*Stor Hornugle.
Schinz's Ryle.	Slørugle.
Horseøg.	*Steppehøne.
Tredækker.	Turteldue.

Huldue.
 Ringdue.
 Natravn.
 Mursejler.
 *Ellekrage.
 Isfugl.
 Gøg.
 Vendehals.
 Grønspætte.
 Mellemflagsspætte.
 Stor Flagsspætte.
 Nordisk Flagspætte.
 *Hærfugl.
 Skovskade.
 *Nøddekrige.
 Skade.
 Allike.
 Vestlig Allike.
 Raage.
 Graakrage.
 Sortkrage.
 Ravn.
 Rødrygget Tornskade.
 Pirol.
 Digesvale.
 Bysvale.
 Forstuesvale.
 Nordisk Spætmejse.
 Almindelig Spætmejse.
 Hedelærke.
 Lærke.
 Toplærke.
 Stær.
 Gærdesmutte.
 Træløber.
 Brunelle.
 Musvit.
 Blaamejse.
 Sortmejse.
 Sumpmejse.
 Topmejse.
 Hålemejse.
 Tornsanger.
 Gærdesanger.
 Munk.
 Havesanger.
 Høgesanger.

Gulbug.
 Kærsanger.
 Rørsanger.
 Drosselrørsanger.
 Sivsanger.
 Vandsanger.
 Græshoppesanger.
 Løvsanger.
 Gransanger.
 Skovsanger.
 Fuglekonge.
 Rødtoppet Fuglekonge.
 Engpiber.
 Skærpiber.
 Markpiber.
 Skovpiber.
 Gul Vipstjert.
 Bjergvipstjert.
 Hvid Vipstjert.
 Sangdrossel.
 Misteldrossel.
 Solsort.
 Digesmutte.
 Bynkefugl.
 Rødstjert.
 Husrødstjert.
 Rødhals.
 Blaahals.
 Nattergal.
 Lille Fluesnapper.
 Broget Fluesnapper.
 Graa Fluesnapper.
 Graaspurv.
 Skovspurv.
 Bogfinke.
 Kvækerfinke.
 Kærnebider.
 Grønsisken.
 Stillits.
 Svenske.
 Tornirisk.
 Lille Korsnæb.
 Rørspurv.
 Hortulan.
 Gulspurv.
 Kornverling.

Tilsammen udgør dette 177 Arter, af hvilke dog 4 træffes rugende i 2 Racer; paa Bornholm træffes saaledes Nordisk Flagspætte, som hidtil ikke er paavist i det øvrige Danmark, endvidere optræder Almindelig Spætmejse i Jylland og paa Fyen, Melleformer mellem denne og Nordisk Spætmejse, Formen *homeyeri*, paa Sjælland. I Landets sydlige og sydvestlige Del yngler Vestlig Allike, i den øvrige Del den typiske Form. Hvor Graakragen i de samme Egne møder Sortkragen, dannes Melleformer mellem disse.

Af de med * betegnede Arter er Rovterne og Glente paa Randen af Udryddelse som Ynglefugle, hvis de sidste Par ikke allerede er forsvundne; om Lomvie og Kjøve vides intet sikkert fra nyere Tid, og det samme gælder Nøddekrige; de øvrige er forsvundne.

ARTER, DER MED STØRRE ELLER MINDRE SIKKERHED
FORMODES AT YNGLE I DANMARK.

Pibeand.	Dougall's Terne.
Bjergand.	Dværghejre.
Hvinand.	Rødfodfalk.
Nordisk Lappedykker.	Sort Glente.
Lille Rørvagtel.	Blaa Kærhøg.
Dværgrørvagtel.	Rødhovedet Tornskade.
Pomeransfugl.	Stor Tornskade.
Storspove.	Vandstær.
Svaleklire.	Sortstrubet Bykefugl.
Svartbag.	

De tre Andearter Pibeand, Bjergand og Hvinand er trufne her i Yngletiden, Pibeand oftest, saa godt som hvert Aar, og Hvinand ses i Nørrejylland paa sine Steder hele Sommeren; men de undersøgte Stykker af Pibeanden har næsten altid vist sig at være anskudte Fugle, og Flokkene af Hvinænder kan være etaarige, ikke ynglende Fugle, der oversomre Syd eller Vest for deres egentlige Ynglested; ganske vist er saa unge Fugle af Hvinand undersøgte — de første Dage i August Maaned — at det ligger nær at tro paa Fuglens Rugen her i Landet, men Bevis derfor er det ikke. Heller ikke Bjergandens Rugen kan siges at være en fastslaaet Kendsgerning.

Beretningerne om, at Nordisk Lappedykker skulde yngle her i Landet, beror utvivlsomt paa Forveksling med Sorthalset Lappedykker.

Rødfodfalk og Sort Glente har uden Tvivl forsøgt at yngle her, men endnu er vist Forsøget ikke lykkedes. Om Blaa Kærhøg tør formodes, at en Forveksling med Enghøg foreligger, men Arten yngler jo Syd for os, saa umuligt er det ikke, at den kan vise sig at være Ynglefugl her i Landet.

Mærkelig lyder det, at Pomeransfuglen skulde have ynglet her; den har ganske vist ruget i England og Mellemeuropa, hvor den endnu yngler, men den er i Yngletiden Bjærgbeoer; det ligger nær at tro paa en Forveksling med t. Eks. Hjejlen.

Om Storspoven og Svalekliren gælder, at de gamle Fugle træffes her saa tidligt om Eftersommeren, kort efter Midsommer i Slutningen af Juni Maaned, paa Tilbagerejse, at det er forstaaeligt, at dette Forhold har givet Anledning til Formodninger om, at de yngler i Landet. Meddelelsen efter Hage i Kjærbølling (1852, Side 292) om, at Svalekliren har ynglet i Oddermosen, synes ikke sikker nok, og at Teilmann skulde have skudt den fra 4 Æg paa Vilslev Enge ved Ribe beror sikkert paa en Forveksling med Tinksmed, saaledes som ogsaa paapeget af Collin i »Skandinaviens Fugle«, Side 526.

Lille Rørvagtel, Dværgrørvagtel og Rødhovedet Tornskade er trufne her om Foraaret, og formodentlig derfor antages de at yngle, men Bevis foreligger ikke; det samme gælder ogsaa Sortstrubet Bynkefugl. For Vandstærs og Stor Tornskades Vedkommende er der skellig Grund til at tvivle; snarere kunde man tro, at Dougall's Terne virkelig en enkelt Gang har ruget her, men Beretningerne er ikke egnede til at give Vished. Tilbage staar Svartbag; dens Æg skal være fundne paa Bosserne ved Samsø en Gang; da denne Maage findes her Aaret rundt — udfarvede eller saa godt som udfarvede Stykker ses ogsaa om Sommeren — kan det tænkes, at Synet af saadanne Fugle i Forbindelse med Fund af store Æg af Sølvmaagen har givet Anledning til Forveksling; Muligheden af Svartbagens Ynglen tør ikke bestrides, men det er ønskeligt at faa bedre Sikkerhed, inden Sagen fastslaas som Kendsgerning.

ARTER, DER HAR YNGLET HER I LANDET ELLER I DETS
UMIDDELBARE NÆRHED I STENALDER ELLER TIDLIGERE.

Tjur.
Gejrfugl.

Krøltoppet Pelikan.
Sortspætte.

TILFÆLDIGE GÆSTER.

A. Fra Vest og Sydvest.

Amerika, Atlanterhavet, de britiske Øer, Holland.

Blaavinget And.	Topskarv.
Lille Stormsvale.	Storkjove.
Kløfthalet Stormsvale.	Purpurhejre.
Almindelig Skraape.	Amerikansk Taarnfalk.
Sodfarvet Skraape.	Gulhovedet Trupial.
Storskraape.	Skægmejse.
Sneppeklire.	Gulhovedet Vipstjert.
Bartram's Klire.	Sortrygget Vipstjert.

B. Fra Syd og Sydøst.

Mellemevropa, Middelhavslandene, Sydrusland, Syrien.

Rustand.	Steppevaage.
Hvidøjet And.	Ørnevaage.
Rødhovedet And.	Lille Skrigørn.
Middelhavsskraape.	Stor Skrigørn.
Lille Rørvagtel.	Slangeørn.
Dværgrørvagtel.	Sort Glente.
Dværgrappe.	Steppehøg.
Stortrappe.	Aadselgrib.
Kravetrappe.	Gul Grib.
Jomfrutrane.	Graa Grib.
Triel.	Dværghornugle.
Braksvale.	Alpesejler.
Ørkenløber.	Biæder.
Stytløber.	Skadegøg.
Hvidvinget Terne.	Rødhovedet Tornskade.
Tophejre.	Rosenbrystet Tornskade.
Kohejre.	Rosenstær.
Dværghejre.	Flodsanger.
Nathejre.	Rødtoppet Fuglekonge.
Sort Ibis.	Sydlig Nattergal.
Dværgskarv.	Hvidhalset Fluesnapper.
Rødfodfalk.	Gulirisk.

C. Fra Nord, Nordøst og Øst.

Norge, Sverige, Lapland, Kola, Finland, Nordrusland,
Ishavsøgrupper, Sibirien.

Steller's And.	Dværggaas.
Kongeederfugl.	Indisk Gaas.
Svanegaas.	Rødhalsset Gaas.
Sushkin's Gaas.	Hvidnæbbet Islom.

Ismaage.	Hvidbrynet Løvsanger.
Kortnæbbet Lomvie.	Guldrossel.
Spurveugle.	Sortstrubet Drossel.
Høgeugle.	Brundrossel.
Stor Hornugle.	Brunsvenske.
Østlig Turteldue.	Sibirisk Graasisken.
Graaspætte.	Karmindompap.
Lille Flagspætte.	Hvidvinget Korsnæb.
Sortspætte.	Laplandsverling.

To Arter, Steppehøne og Langnæbbet Nøddekrige, den ene fra Sydøst, den anden fra Nordøst, vel fra Nordrusland eller Sibirien, maa siges at være noget mere end tilfældige Gæster; førstnævnte kom i saa store Skarer Vest over, at man skulde tro, det drejede sig om et Forsøg fra Artens Side paa at vinde nyt Land; Mennesket forhindrede sig selv i at se, om Forsøget kunde være gennemført. Sidstnævnte indvandrer i saa stort Tal og saa ofte, at dens Besøg næsten kan kaldes jævnlige.

ARTER, DER REGELMÆSSIGT ELLER NOGENLUNDE
REGELMÆSSIGT DRAGER GENNEM LANDET.

Krikand.	Smaaspove.
Pibeand.	Storspove.
Spidsand.	Lille Kobbersneppe.
Nordøstlig Stokand.	Sorthalet Kobbersneppe.
Skeand.	Tinksmed.
Sædgaas.	Svaleklire.
Kortnæbbet Gaas.	Rødben.
Blisgaas.	Sortklire.
Graagaas.	Hvidklire.
Knortegaas.	Brushane.
Lysbuget Knortegaas.	Dværgryle.
Bramgaas:	Temminck's Ryle.
Engsnarre.	Islandsk Ryle.
Vandrikse.	Almindelig Ryle.
Trane.	Schinz's Ryle.
Vibe.	Krumnæbbet Ryle.
Strandhjejle.	Brednæbbet Ryle.
Nordlig Hjejle.	Odinshane.
Pomeransfugl.	Thorshane.
Almindelig Præstekrave.	Smaabekkasin.
Nordøstlig Præstekrave.	Horsegøg.
Hvidbrystet Præstekrave.	Tredækker.
Strandskade.	Skovsneppe.

Sildemaage.	Munk.
Norsk Sildemaage.	Havesanger.
Britisk Sildemaage.	Høgesanger.
Havterne.	Gulbug.
Splitterne.	Kærsanger.
Rovterne.	Rørsanger.
Sandterne.	Drosselrørsanger.
Kjove.	Sivsanger.
Lille Kjove.	Vandsanger.
Mellemkjove.	Græshoppesanger.
Lunde.	Løvsanger.
Almindelig Musevaage.	Skandinavisk Gransanger.
Østlig Musevaage.	Skovsanger.
Hvepsevaage.	Fuglekonge.
Glente.	Engpiber.
Blaa Kærhøg.	Skærpiber.
Spurvehøg.	Skovpiber.
Fiskeørn.	Gul Vipstjert.
Mosehornugle.	Nordlig Vipstjert.
Skovhornugle.	Hvid Vipstjert.
Huldue.	Vindrossel.
Ringdue.	Sangdrossel.
Natravn.	Misteldrossel.
Mursejler.	Sjagger.
Ellekrage.	Ringdrossel.
Gøg.	Solsort.
Vendehals.	Digesmutte.
Skovskade.	Større Digesmutte.
Allike.	Bynkefugl.
Krage.	Rødstjert.
Digesvale.	Rødhals.
Bysvale.	Blaahals.
Forstuesvale.	Norsk Blaahals.
Hedelærke.	Broget Fluesnapper.
Lærke.	Graa Fluesnapper.
Stær.	Bogfinke.
Tornsanger.	Kvækerfinke.
Gærdesanger.	Rørspurv.

REGELMÆSSIGE ELLER NOGENLUNDE REGELMÆSSIGE
VINTERGÆSTER.

Pibeand.	Troldand.
Stokand.	Bjergand.
Knopsvane.	Taffeland.
Pibesvane.	Hvinand.
Sangsvane.	Havlit.

- Sortand.
 Fløjlsand.
 Ederfugl.
 Lille Skallesluger.
 Stor Skallesluger.
 Toppet Skallesluger.
 Sædgaas.
 Knortegaas.
 Lysbuget Knortegaas.
 Bramgaas.
 Nordisk Lappedykker.
 Rødhalsed Lappedykker.
 Toppet Lappedykker.
 Sortstrubet Lom.
 Islom.
 Rødstrubet Lom.
 Stormfugl.
 Vandrikse.
 Storspove.
 Sortgraa Ryle.
 Almindelig Ryle.
 Smaabekkasin.
 Horsegøg.
 Skovsneppe.
 Dværgmaage.
 Stormmaage.
 Sølvmaage.
 Sildemaage.
 Norsk Sildemaage.
 Svartbag.
 Hvidvinget Maage.
 Graamaage.
 Ride.
 Tejste.
 Langnæbbet Lomvie.
 Sydlig Lomvie.
 Søkonge.
 Alk.
 Lunde.
 Færøisk Lunde.
 Hejre.
 Storskarv.
 Almindelig Skarv.
 Sule.
 Taarnfalk.
- Dværgfalk.
 Vandrefalk.
 Jagtfalk.
 Almindelig Musevaage.
 Vintermusevaage.
 Kongeørn.
 Havørn.
 Blaa Kærhøg.
 Spurvehøg.
 Duehøg.
 Russisk Duehøg.
 Perleugle.
 Mosehornugle.
 Skovhornugle.
 Sneugle.
 Ringdue.
 Isfugl.
 Stor Tornskade.
 Silkehale.
 Skovskade.
 Halsbaandallike.
 Bjerglærke.
 Gærdesmutte.
 Nordlig Træløber.
 Vandstær.
 Brunelle.
 Engpiber.
 Skærpiber.
 Vindrossel.
 Misteldrossel.
 Rødhals.
 Kvækerfinke.
 Kærnebider.
 Grønsisken.
 Stillits.
 Bjergirisk.
 Graasisken.
 Stornæbbet Graasisken.
 Dompap.
 Krognæb.
 Lille Korsnæb.
 Stor Korsnæb.
 Laplandsverling.
 Snespurv.

STANDFUGLE.

*Stokand.	Stor Flagspætte.
*Knopsvane.	Nordisk Flagspætte.
Troldand.	Skovskade.
Taffeland.	Nøddekrige.
Ederfugl.	Skade.
Stor Skallesluger.	Allike.
Toppet Skallesluger.	Vestlig Allike.
Agerhøne.	Raage.
Urfugl.	Graakrage.
Dværglappedykker.	Sortkrage.
Sorthalset Lappedykker.	Ravn.
Rødhalsed Lappedykker.	Almindelig Spætmejs.
Toppet Lappedykker.	*Lærke.
*Vandrikse.	Toplærke.
Rørhøne.	*Stær.
Blishøne.	Gærdesmutte.
*Vibe.	Træløber.
*Horsegøg.	Musvit.
*Dværgmaage.	Blaamejs.
Hættemaage.	Sortmejs.
Stormmaage.	Sumpmejs.
Sølvmaage.	Topmejs.
Tejste.	Halemejs.
Lomvie.	Fuglekonge.
Alk.	*Engpiber.
*Hejre.	Solsort.
Rørdrum.	*Sortstrubet Bynkefugl.
*Taarnfalk.	Husrødstjert.
Vandrefalk.	*Rødhals.
Havørn.	Graaspurv.
Spurvehøg.	Skovspurv.
Duehøg.	Bogfinke.
Kirkeugle.	Kærnebider.
Natugle.	*Grønsisken.
*Mosehornugle.	*Stillits.
Skovhornugle.	Svenske.
Slørugle.	*Tornirisk.
Ringdue.	Lille Korsnæb.
Isfugl.	Rørspurv.
Grønspætte.	Gulspurv.
Mellemflagspætte.	Kornverling.

Af en ægte Standfugl forlanges jo, at den skal yngle i Landet og forblive der hele Aaret, og dette gælder ogsaa for de paa ovenstaaende Liste nævnte Arter. Nogle Forbehold er det dog nødvendigt at tage.

De fire Lappedykkerarter viger ikke gerne for Vinteren; de søger fra de ferske Vande, ved hvilke de yngler, ud i Sunde og Bælter; men er Vinteren meget haard, saa at ogsaa disse lukkes, maa de bort. En Del Lappedykkere forlader dog Landet uden tvingende Grund, og det vil altid være vanskeligt at afgøre, om de tilbageværende virkelig er indfødte Fugle eller Vintergæster andetsteds fra, t. Eks. fra Skandinavien og Rusland.

Noget lignende gælder om Rørhøne og Blishøne; førstnævnte er i Løbet af de sidste 30—40 Aar tiltaget stærkt i Antal; den trives aabenbart godt her i Landet og er ved at forsøge paa at blive Standfugl. Mange bliver her om Vinteren, naturligvis navnlig i milde; i haarde Vintre maa de standhaftige ligesom Blishønsene døje ondt. Lignende Kaar har Rørdrummen, der nu næsten kun findes i Rørskovene i Vestjylland.

Om de med * mærkede Arter gælder, at det ikke er muligt at staa inde for, om de Fugle, der ses her Vinteren igennem, virkelig er de indfødte danske, eller om de er Gæster fra Skandinavien og Rusland. De *fleste* Stokænder er saa godt som sikkert fremmede, men *nogle* danske bliver vel, mest vist i Vestjylland, eller hvor der fodres. Hejren ses hyppigere om Vinteren nu end for 20 Aar siden; om disse Fugle er danske eller Vintergæster andetsteds fra, lader sig vanskeligt afgøre; Hejren strejfer jo vidt om, kommer stundom til Færøerne og Island, ja endog Grønland har den naaet. Antallet af vore Mejsler forøges maaske om Vinteren med Gæster fra Øst og Nordøst; i hvert Fald er Mejsler faldet ved Fyrene.

En og anden dansk Taarnfalk bliver her maaske, men de, der ses, kan lige saa godt være fremmede Gæster, og saaledes forholder det sig ogsaa med Vibe, Horsegøg, Dværgmaage, Vandrikse, Mosehornugle, Rødhals, Engpiber, Lærke, Rørspurv, Stillits og Tornirisk; om de Grønsiskener, der yngler her — vistnok en *sjælden* Gang — bliver her eller vandrer bort, er heller ikke til at sige. Rimeligvis bliver de, men hvem kan skelne dem i Gæsternes store Skarer?

Hvis Lomvie endnu yngler her i Landet, fjærner den sig næppe fra vore Farvande om Vinteren.

I forholdvis ny Tid har Sortstrubet Bynkefugl og Sort Rødstjert begyndt at vise sig her i Landet, mest i den sydvestlige

Del, og den Omstændighed, at de saa ofte er trufne ogsaa om Vinteren, tyder paa, at de er ved at blive Standfugle. Hættemaage og Solsort kan siges at være blevet det.

Om en Del af de i foranstaaende Liste over Danmarks Fugle nævnte Arter gælder, at de kun er trufne en enkelt Gang i Landet og hører hjemme i Egne, der ligger saa fjærnt fra Danmark, at Tvivl om, at de er kommet her ved egen Hjælp, d. v. s. uden Indgreb fra Menneskets Side, ganske naturligt kan opstaa; man kunde tænke sig, at de var undslupne fra Bur, fra zoologiske Haver eller fra Andeparker. I Regelen bærer en Fugl, der har været holdt i Fangenskab, Spor deraf, og i saadanne Tilfælde er Afgørelsen ikke vanskelig at træffe; men Fugle kan undslippe fra Fangenskab og opholde sig saa længe i fri Tilstand paa et Sted, at en Fældeperiode overstaas og giver Fuglen en ny, frisk Fjerdragt. I saadanne Tilfælde er det naturligvis umuligt at staa inde for, om man har en virkelig vild Fugl for sig eller ej. Det har dog været anset for sikrest ved denne Lejlighed at medtage ogsaa saadanne Tilfælde, som kan forekomme tvivlsomme, saaledes Svanegaas, Dværgskarv, Amerikansk Taarnfalk og Gulhovedet Trupial, idet en Fortielse maaske kunde gøre, at man i Fremtiden var vanskeligere stillet, hvis Tilfældene skulde gentage sig. Fuglene har jo Vinger og bruger dem undertiden uden Hensyntagen til Zoogeografiens Regler.

ALFABETISKE NAVNEFORTEGNELSER

MED HENVISNING TIL ARTERNES LØBENUMRE.

I. DANSKE NAVNE.

- Aadselgrib 182.
Agerhøne 41.
Alk 138.
Allike 220.
—, Vestlig 220.
Alpesejler 203.
And, Blaavinget 3.
—, Hvidøjet 17.
—, Rødhovedet 18.
—, Steller's 23.
Atling 2.
- Biæder 205.
Bjergand 15.
Bjergirisk 311.
Bjerglærke 237.
Bjergvipstjert 271.
Blaahals 293.
—, Norsk 293.
—, Sydlig 293.
Blaamejse 246.
Blisgaas 33.
Blishøne 64.
Bogfinke 302.
Braksvale 80.
Bramgaas 39.
Brundrossel 283.
Brunelle 244.
Brunsvenske 307.
Brushane 94.
Bynkefugl 288.
—, Sortstrubet 289.
Bysvale 231.
- Digesmutte 287.
—, Større 287.
Digesvale 230.
Dompap 314.
Drossel, Sortstrubet 282.
Drosselrørsanger 260.
Duehøg 180.
—, Svensk 180.
—, Russisk 180.
Dværgfalk 160.
Dværggaas 34.
- Dværghejre 145.
Dværghornugle 190.
Dværglappedykker 44.
Dværgmaage 111.
Dværgryle 97.
Dværgrørvagtel 60.
Dværgskarv 154.
Dværgterne 121.
Dværgtrappe 65.
- Ederfugl 24.
Ellekrage 204.
Engpiber 271.
Engsnarre 58.
- Fiskeørn 181
Fjordterne 122.
Flagspætte, Lille 212.
—, Stor 214.
—, Nordisk 214.
Flodsanger 264.
Fluesnapper, Broget 297.
—, Graa 299.
—, Hvidhalset 298.
—, Lille 296.
Fløjlsand 22.
Forstuesvale 232.
Fuglekonge 269.
—, Rødtoppet 270.
- Gaas, Indisk 36.
—, Kortnæbbet 31.
—, Rødhalsset 37.
—, Sushkins 32.
Gejrfugl 139.
Glente 174.
—, Sort 173.
Graagaas 35.
Graakrage 222.
Graamaage 118.
Graasisken 312.
—, Stornæbbet 312.
—, Sibirisk 313.
Graaspurv 300.
Graaspætte 210.

- Gransanger 266.
 —, Skandinavisk 266.
 Gravand 9.
 Grib, Graa 184.
 —, Gul 183.
 Græshoppesanger 263.
 Grønsisken 305.
 Grønspætte 211.
 Gulbug 257.
 Guldrossel 279.
 Gulirisk 309.
 Gulsurv 322.
 Gærdesanger 253.
 Gærdesmutte 241.
 Gøg 208.

 Halemejse 250.
 Halsbaandallike 220.
 Havesanger 255.
 Havlit 20.
 Havterne 123.
 Havørn 170.
 Hedehøg 176.
 Hedelærke 234.
 Hejre 143.
 Hjejle 73.
 —, Nordlig 73.
 Hornugle, Stor 193.
 Horsegøg 108.
 Hortulan 321.
 Huldue 199.
 Husrødstjert 291.
 Hvepsevaage 172.
 Hvidklire 92.
 Hvinand 19.
 Hærfugl 216.
 Hættemaage 112.
 Høgesanger 256.
 Høgeugle 188.

 Ibis, Sort 148.
 Isfugl 206.
 Islom 50.
 —, Hvidnæbbet 50.
 Ismaage 120.

 Jagtfalk 163.
 Jomfrutrane 69.

 Karmindompap 315.
 Kirkeugle 186.
 Kjove 130.
 —, Lille 131.
 Klire, Bartram's 93.
 Klyde 96.
 Knarand 5.
 Knopsvane 11.
 Knortegaas 38.
 —, Lysbuget 38.

 Kobbersneppe, Lille 84.
 —, Sorthalet 85.
 Kohejre 142.
 Kongeederfugl 25.
 Kongeørn 169.
 Kornverling 323.
 Korsnæb, Hvidvinget 317.
 —, Lille 318.
 —, Stor 319.
 Krage 222.
 Kravetrappe 67.
 Krikand 1.
 Krognæb 316.
 Kvækerfinke 303.
 Kærhøg, Blaa 177.
 Kærnebider 304.
 Kærsanger 258.

 Laplandsverling 324.
 Lappedykker, Nordisk 45.
 —, Rødhalsset 47.
 —, Sorthalset 46.
 —, Toppet 48.
 Lom, Rødstrubet 51.
 —, Sortstrubet 49.
 Lomvie 135.
 —, Kortnæbbet 136.
 —, Langnæbbet 135.
 —, Sydlig 135.
 Lunde 140.
 —, Færoisk 140.
 Lærke 235.
 Lærkefalk 161.
 Løvsanger 265.
 —, Hvidbrynet 268.

 Maage, Hvidvinget 117.
 Markpiber 273.
 Mellemflagspætte 213.
 Mellemkjove 132.
 Middelhavsskraape 54.
 Misteldrossel 281.
 Mosehornugle 191.
 Mudderklire 87.
 Munk 254.
 Mursejler 202.
 Musevaage 164.
 —, Østlig 164.
 Musvit 245.

 Nathejre 147.
 Natravn 201.
 Nattergal 295.
 —, Sydlig 294.
 Natugle 189.
 Nøddekrige 218.
 —, Langnæbbet 218.

 Odinshane 105.

- Pelikan, Krøltoppet 155.
 Perleugle 187.
 Pibeand 4.
 Pibesvane 12.
 Pirol 228.
 Pomeransfugl 74.
 Præstekrave, Almindelig 76.
 —, Hvidbrystet 77.
 —, Lille 75.
 —, Nordøstlig 76.
 Purpurhejre 144.
- Raage 221.
 Ravn 223.
 Ride 119.
 Ringdrossel 285.
 Ringdue 200.
 Rosenstær 239.
 Rovterne 126.
 Rustand 10.
 Ryle. Almindelig 101.
 —, Brednæbbet 103.
 —, Islandsk 100.
 —, Krumnæbbet 102.
 —, Schinz's 101.
 —, Sortgraa 99.
 —, Temminck's 98.
 Rødben 90.
 Rødfodfalk 159.
 Rødhals 292.
 Rødstjert 290.
 Rørdrum 146.
 Rørhøg 175.
 Rørhøne 63.
 Rørsanger 259.
 Rørspurv 320.
 Rørvagtel, Lille 59.
 —, Plettet 61.
- Sandterne 127.
 Sangdrossel 280.
 —, Nordlig 280.
 Sangsvane 13.
 —, Islandsk 13.
 Selning 104.
 Sildemaage 115.
 —, Norsk 115.
 —, Britisk 115.
 Silkehale 229.
 Sivsanger 261.
 Sjagger 284.
 Skade 219.
 Skadegøg 207.
 Skallesluger, Lille 26.
 —, Stor 27.
 —, Toppet 28.
 Skarv, Almindelig 152.
 Skeand 8.
 Skehejre 149.
- Skovhornugle 192.
 Skovpiber 274.
 Skovsanger 267.
 Skovskade 217.
 Skovsneppe 110.
 Skovspurv 301.
 Skraape, Almindelig 54.
 —, Sodfarvet 55.
 Skrigørn, Lille 167.
 —, Stor 168.
 Skægmejse 251.
 Skærpiber 272.
 Slangeørn 171.
 Slørugle 195.
 Smaabekkasin 107.
 Smaaspove 82.
 Sneppeklire 86.
 Snespurv 325.
 Sneugle 194.
 Solsort 286.
 Sortand 21.
 Sortklire 91.
 Sortkrage 222.
 Sortmejse 247.
 Sortspætte 215.
 Sortterne 129.
 Spidsand 6.
 Splitterne 125.
 Spurvehøg 179.
 Spurveugle 185.
 Spætmejse, Almindelig 233.
 —, Nordisk 233.
 Stenvender 78.
 Steppehøg 178.
 Steppehøne 196.
 Steppevaage 164.
 Stillits 306.
 Stokand 7.
 —, Nordøstlig 7.
 Stork 150.
 —, Sort 151.
 Storkjove 133.
 Stormfugl 57.
 Stormmaage 113.
 Stormsval, Kløfthalet 53.
 —, Lille 52.
 Storskarv 152.
 Storskraape 56.
 Storspove 83.
 Stortrappe 66.
 Strandhøjle 72.
 Strandskade 79.
 Stylteløber 95.
 Stær 238.
 Sule 156.
 Sumpmejse 248.
 Svaleklire 89.
 Svanegaas 29.
 Svartbag 116.
 Svenske 308.

- Sædgaas 30.
 Søkonge 137.
 Sølvmaage 114.
 —, Gulbenet 114.
- Taarnfalk 157.
 —, Amerikansk 158.
- Taffeland 16.
 Tejste 134.
 Terne, Dougall's 124.
 —, Hvidvinget 128.
 Thorshane 106.
 Tinksmød 88.
 Tjur 43.
 Tophejre 141.
 Toplærke 236.
 Topmejse 249.
 Topskarv 153.
 Tornirisk 310.
 Tornsanger 252.
 Tornskade, Rosenbrystet 226.
 —, Rødhovedet 225.
 —, Rødrygget 224.
 —, Stor 227.
- Trane 68.
 Tredækker 109.
 Triel 70.
- Troldand 14.
 Trupial, Gulhovedet 240.
 Træløber 242.
 —, Nordlig 242.
 Turteldue 197.
 —, Østlig 198.
- Urfugl 42.
- Vagtel 40.
 Vandrefalk 162.
 Vandrikse 62.
 Vandsanger 262.
 Vandstær 243.
 Vendehals 209.
 Vibe 71.
 Vindrossel 278.
 Vintermusevaage 166.
 Vipstjert, Gul 275.
 —, Gulhovedet 275.
 —, Hvid 277
 —, Nordlig 275.
 —, Sortrygget 277.
- Ørkenløber 81.
 Ørnevaage 165.

II. LATINSKE NAVNE.

- Accentor modularis* 244.
Accipiter nisus 179.
 — — *nisus* (L.) 179.
Acredula caudata 250.
Acrocephalus aquaticus (Gm.) 262.
 — *aquaticus* 262.
 — *arundinaceus* 259.
 — *arundinaceus arundinaceus* (L.) 260.
 — *palustris* 258.
 — — (Bechst.) 258.
 — *phragmitis* 261.
 — *schoenobaenus* (L.) 261.
 — *scirpaceus scirpaceus* (Herm.) 259.
 — *turdinus* 260.
- Actitis hypoleuca* 87.
 — — (L.) 87.
- Aegialites alexandrinus alexandrinus* (L.) 77.
 — *dubius caronicus* (Gm.) 75.
 — *hiaticula hiaticula* (L.) 76.
 — — *tundrarum* (Lowe) 76.
- Aegialitis caudatus europaeus* (Herm.) 250.
Aegolius funereus funereus (L.) 187.
Aegyptius monachus (L.) 184.
- Alauda alpestris* 237.
 — *arborea* 234.
 — *arvensis* 235.
 — — *arvensis* (L.) 235.
- Alauda cristata* 236.
Alca impennis 139.
 — — L. 139.
 — *torda* 138.
 — — L. 138.
- Alcedo ispida* 206.
 — *atthis ispida* L. 206.
- Alle alle* (L.) 137.
Ampelis garrula 229.
- Anas acuta* 6.
 — *boscas* 7.
 — *clypeata* 8.
 — *crecca* 1.
 — *discors* 3.
 — *penelops* 4.
 — *platyrhyncha platyrhyncha* L. 7.
 — — *archiboscas* Brehm 7.
 — *querquedula* 2.
 — *strepera* 5.
- Anser albifrons* 33.
 — — *albifrons* (Scop.) 33.
 — *anser anser* (L.) 35.
 — *brachyrhynchus* 31.
 — *brachyrhynchus* Baill. 31.
 — *cinereus* 35.
 — *cygnoides* 29.
 — *erythropus* 34.
 — — (L.) 34.
 — *fabalis fabalis* (Lath.) 30.

- Anser indicus* 36.
 — — (Lath.) 36.
 — *leucopsis* 39.
 — *neglectus* 32.
 — — Sushk. 32.
 — *ruficollis* 37.
 — *segetum* 30.
 — *torquatus* 38.
Anthropoides virgo (L.) 69.
Anthus aquaticus 272.
 — *arboreus* 274.
 — *campestris* 273.
 — — (L.) 273.
 — *pratensis* 271.
 — — (L.) 271.
 — *spinoletta littoralis* Brehm 272.
 — *trivialis trivialis* (L.) 274.
Apus apus apus (L.) 202.
 — *melba melba* (L.) 203.
Aquila chrysaëtus (L.) 169.
 — *clanga* Pall. 168.
 — *pomarina pomarina* Brehm 167.
Aquila clanga 168.
 — *fulva* 169.
 — *nævia* 167.
Ardea bubuleus 132.
 — *cinerea* 143.
 — — *cinerea* L. 143.
 — *comata* 141.
 — *purpurea* 144.
 — — *purpurea* L. 144.
Ardeola ibis ibis (L.) 142.
 — *ralloides ralloides* (Scop.) 141.
Ardetta minuta 145.
Arenaria interpres interpres (L.) 78.
Asio flammeus flammeus (Pontopp.) 191.
 — *otus otus* (L.) 192.
Astur gentilis buteoides Menzbier 180.
 — — *dubius Sparrman* 180.
 — — *gentilis* (L.) 180.
 — *palumbarius* 180.
Athene noctua 186.
 — — *noctua* (Scop.) 186.

Bartramia longicauda 93.
 — — (Bechst.) 93.
Bombycilla garrulus (L.) 229.
Botaurus stellaris 146.
 — — *stellaris* (L.) 146.
Branta bernicla bernicla (L.) 38.
 — — *hrota* (O. F. Müller) 38.
 — *leucopsis* (Bechst.) 39.
 — *ruficollis* (Pall.) 37.
Bubo maximus 193.
 — *bubo bubo* (L.) 193.
Bucephala clangula clangula (L.) 19.
Burhinus oedicephalus oedicephalus (L.) 70.
Buteo buteo buteo (L.) 164.
 — — *intermedius* Menzbier 164.
 — — *vulpinus* Gloger 164.

Buteo ferox 165.
 — — *ferox* (Gm.) 165.
 — *lagopus* 166.
 — — *lagopus* (Brünn.) 166.
 — *vulgaris* 164.

Calcarius lapponicus lapponicus (L.) 324.
Calidris arenaria 104.
Cannabina exilipes 313.
 — *flavirostris* 311.
 — *linaria* 312.
 — *linota* 310.
Capella gallinago gallinago (L.) 108.
 — *media* (Lath.) 109.
Caprimulgus europæus 201.
 — *europæus europæus* L. 201.
Carduelis cannabina cannabina (L.) 310.
 — *carduelis carduelis* (L.) 306.
 — *elegans* 306.
 — *flavirostris flavirostris* (L.) 311.
 — *hornemanni exilipes* (Coues) 313.
 — *linaria linaria* (L.) 312.
 — — *holboellii* (Brehm.) 312.
 — *spinus* (L.) 305.
Carpodacus erythrinus erythrinus (Pall.) 315.
Casarca ferruginea (Pall.) 10.
Cephus grylle 134.
Certhia familiaris 242.
 — — *familiaris* L. 242.
 — — *macroactyla* Brehm 242.
Charadrius apricarius apricarius (L.) 73.
 — — *oreophilus* A. C. Meinertzhagen 73.
 — *pluvialis* 73.
 — *squatarola* 72.
Chauleasmus streperus (L.) 5.
Chlamydotis undulata macqueenii (Gray) 67.
Chlidonias leucoptera (Temm.) 128.
 — *nigra nigra* (L.) 129.
Chloris chloris chloris (L.) 308.
 — *sinica sinica* (L.) 307.
Chrysomitris spinus 305.
Ciconia alba 150.
 — *ciconia ciconia* (L.) 150.
 — *nigra* 151.
 — — L. 151.
Cinclus aquaticus 243.
 — *cinclus cinclus* (L.) 243.
Circæus gallicus 171.
 — — (Gm.) 171.
Circus aeruginosus aeruginosus (L.) 175.
 — *cineraceus* 176.
 — *cyaneus* 177.
 — — *cyaneus* (L.) 177.
 — *macrourus* (Gm.) 178.
 — *pallidus* 178.
 — *pygargus* (L.) 176.
 — *aeruginosus* 175.
Clamator glandarius 207

- Clamator glandarius* (L.) 207.
Clangula hyemalis (L.) 20.
Coccothraustes vulgaris 304.
 — *coccothraustes coccothraustes* (L.) 304.
Coloeus monedula collaris (Drummond) 220.
 — — *monedula* (L.) 220.
 — — *spermologus* (Vieill.) 220.
Columba oenas 199.
 — — *oenas* L. 199.
 — *palumbus* 200.
 — — *palumbus* L. 200.
Colymbus arcticus 49.
 — — *arcticus* L. 49.
 — *glacialis* 50.
 — *immer adamsii* Gray 50.
 — — *immer* Brünn. 50.
 — *septentrionalis* 51.
 — *stellatus* Pontopp. 51.
Coracias garrulus 204.
 — — *garrulus* L. 204.
Corvus corax 223.
 — — *corax* L. 223.
 — *cornix* 222.
 — — *cornix* L. 222.
 — — *corone* L. 222.
 — *frugilegus* 221.
 — — *frugilegus* L. 221.
 — *monedula* 220.
Coturnix communis 40.
 — *coturnix coturnix* (L.) 40.
Crex crex (L.) 58.
 — *pratensis* 58.
Crocethia alba (Pall.) 104.
Cuculus canorus 208.
 — — *canorus* L. 208.
Cursorius cursor cursor (Lath.) 81.
 — *gallicus* 81.
Cyanecula suecica 293.
Cygnopsis cygnoides (L.) 29.
Cygnus bewickii bewickii Yarr. 12.
 — — *islandicus* Brehm 13.
 — *minor* 12.
 — *musicus* 13.
 — *olor* 11.
 — — (Gm.) 11.
Cypselus apus 202.
 — *melba* 203.

Dasila acuta acuta (L.) 6.
Delichon urbica urbica (L.) 231.
Dendrocopos major 214.
 — *medius* 213.
 — *minor* 212.
Dryobates major major (L.) 214.
 — — *pinetorum* (Brehm) 214.
 — *medius medius* (L.) 213.
 — *minor minor* (L.) 212.
Dryocopus martius martius (L.) 215.

Emberiza calandra calandra L. 323.
 — *citrinella* 322.
 — — *citrinella* L. 322.
 — *hortulana* 321.
 — — L. 321.
 — *lapponica* 324.
 — *miliaria* 323.
 — *nivalis* 325.
 — *schoeniclus* 320.
 — — *schoeniclus* (L.) 320.
Eremophila alpestris flava (Gm.) 237.
Erithacus rubecula 292.
 — — *melophilus* Hart. 292.
 — — *rubecula* (L.) 292.
Erolia alpina alpina (L.) 101.
 — — *schinzii* Brehm 101.
 — *canutus canutus* (L.) 100.
 — *ferruginea* (Brünn.) 102.
 — *maritima maritima* (Brünn.) 99.
 — *minuta* (Leisl.) 97.
 — *temminekii* (Leisl.) 98.
Eudromias morinellus 74.
 — — L. 74.

Falco columbarius aesalon Tunst. 160.
 — *gyrfalco* 163.
 — *peregrinus* 162.
 — — *peregrinus* Tunst. 162.
 — *rusticolus rusticolus* L. 163.
 — *sparverius* 158.
 — — *sparverius* L. 158.
 — *subbuteo* 161.
 — — *subbuteo* L. 161.
 — *tinnunculus* 157.
 — — *tinnunculus* L. 157.
 — *vespertinus* 159.
 — — *vesperfinus* L. 159.
 — *cesalon* 160.
Ficedula albicollis Temm. 298.
 — *hypoleuca hypoleuca* (Pall.) 297.
Fratercula arctica 140.
 — — *arctica* (L.) 140.
 — — *grabae* (Brehm) 140.
Fringilla coelebs 302.
 — — *coelebs* L. 302.
 — *montifringilla* 303.
 — — L. 303.
Fulica atra 64.
 — *atra atra* L. 64.
Fuligula cristata 14.
 — *ferina* 16.
 — *fuligula* (L.) 14.
 — *marila* 15.
 — — *marila* (L.) 15.
 — *nyroca* 17.
 — *ruftna* 18.
Fulmarus glacialis 57.
 — — *glacialis* (L.) 57.

- Galerida cristata cristata* (L.) 236.
Gallinago major 109.
 — *scolopacina* 108.
Gallinula chloropus 63.
 — — *chloropus* (L.) 63.
Garrulus glandarius 217.
 — — *glandarius* (L.) 217.
Gecinus canus 210.
 — *viridis* 211.
Gelochelidon nilotica nilotica (Gm.) 127.
Glareola praticola 80.
 — *pratincola pratincola* (L.) 80.
Glaucidium passerinum 185.
 — — *passerinum* (L.) 185.
Glaucion clangula 19.
Grus cinerea 68.
 — *virgo* 69.
Gyps fulvus 183.
 — — *fulvus* (Habl.) 183.
- Haematopus ostralegus ostralegus* L. 79.
Haliaeetus albicilla 170.
 — — *albicilla* (L.) 170.
Himantopus candidus 95.
 — *himantopus himantopus* L. 95.
Hirundo riparia 230.
 — *rustica* 232.
 — — *rustica* L. 232.
 — *urbica* 231.
Hydrobates pelagicus (L.) 52.
Hydroprogne tschegrava tschegrava
 (Lep.) 126.
Hypolais icterina 257.
 — — (Vieill.) 257.
Hæmatopus ostreologus 79.
- Ixobrychus minutus minutus* (L.) 145.
Iynx torquilla torquilla L. 209.
 — *torquilla* 209.
- Lanius collurio collurio* L. 224.
 — *collyrio* 224.
 — *excubitor* 227.
 — — *excubitor* L. 227.
 — *minor* 226.
 — — Gm. 226.
 — *senator* 225.
 — — *senator* L. 225.
- Larus argentatus* 114.
 — — *argentatus* Pontopp. 114.
 — — *cachinnans* Pall. 114.
 — *canus* 113.
 — — *canus* L. 113.
 — *eburneus* 120.
 — *fuscus* 115.
 — — *affinis* Reinh. 115.
 — — *fuscus* L. 115.
 — — *intermedius* Schiøler 115.
 — *glaucoides* Meyer 117.
 — *glaucus* 118.
- Larus hyperboreus* Gunn. 118.
 — *leucopterus* 117.
 — *marinus* 116.
 — — L. 116.
 — *minutus* 111.
 — — Pall. 111.
 — *ridibundus* 112.
 — — *ridibundus* L. 112.
 — *tridactylus* 119.
Lestris catarrhactes 133.
 — *longicauda* 131.
 — *parasitica* 130.
 — *pomatorhina* 132.
Ligurinus chloris 308.
 — *sinicus* 307.
Limicola pygmaea 103.
 — *falcinellus falcinellus* (Pontopp.)
 103.
Limnocryptes gallinula 107.
 — *minimus* (Brünn.) 107.
- Limosa lapponica* 84.
 — — *lapponica* (L.) 84.
 — *limosa limosa* (L.) 85.
 — *ægocephala* 85.
Locustella fluviatilis 264.
 — — (Wolf) 264.
 — *naevia naevia* (Bodd.) 263.
 — *naevia* 263.
Loxia curvirostra 318.
 — — *curvirostra* L. 318.
 — *leucoptera* 317.
 — — *bifasciata* (Brehm) 317.
 — *pityopsittacus* 319.
 — — Borkh. 319.
- Lullula arborea arborea* (L.) 234.
Luscinia luscinia (L.) 295.
 — *megarhyncha megarhyncha* Brehm
 294.
 — *philomela* 295.
 — *suecica cyanecula* (Wolf) 293.
 — — *gaetkei* (Kleinsch.) 293.
 — — *suecica* (L.) 293.
 — *vera* 294.
- Lyrurus tetrix britannicus* (With. &
 Lonnberg) 42.
- Machetes pugnax* 94.
Macrorhamphus griseus 86.
 — — *scolopaceus* (Say) 86.
Mareca penelops (L.) 4.
Megalornis grus grus (L.) 68.
Mergulus alle 137.
Mergus albellus 26.
 — — L. 26.
 — *merganser* 27.
 — — *merganser* L. 27.
 — *serrator* 28.
 — — L. 28.
Merops apiaster 205.
 — — (L.) 205.

- Milvus iclinus* 174.
 — *migrans* 173.
 — — *migrans* (Bodd.) 173.
 — *milvus milvus* (L.) 174.
Motacilla alba 277.
 — — *alba* L. 277.
 — — *yarrellii* Gould 277.
 — *cinerea cinerea* Tunst. 276.
 — *flava* 275.
 — — *flava* L. 275.
 — — *rayi* (Bp.) 275.
 — — *thunbergi* Billberg 275.
 — *melanope* 276.
Muscicapa albicollis 298.
 — *atricapilla* 297.
 — *grisola* 299.
 — *parva* 296.
 — *striata striata* (Pall.) 299.

Neophron percnopterus 182.
 — — *percnopterus* (L.) 182.
Netta rufina (Pall.) 18.
Nettion crecca crecca (L.) 1.
Nucifraga caryocatactes 218.
 — — *caryocatactes* (L.) 218.
 — — *macrorhynchus* (Brehm) 218.
Numenius arquata arquata (L.) 83.
 — *arquatus* 83.
 — *phaeopus phaeopus* (L.) 82.
 — *phaeopus* 82.
Nyctale funerea 187.
Nyctea nivea 194.
 — *nyctea* (L.) 194.
Nycticorax griseus 147.
 — *nycticorax nycticorax* (L.) 147.
Nyroca ferina (L.) 16.
 — *nyroca nyroca* (Güld.) 17.

Oceanodroma leucorhoa leucorhoa
 (Vieill.) 53.
Oedemia fusca 22.
 — *nigra* 21.
Oedichnemus crepitans 70.
Oenanthe oenanthe leucorhoa (Gm.)
 287
 — — *oenanthe* (L.) 287.
Oidemia fusca fusca (L.) 22.
 — *nigra nigra* (L.) 21.
Oriolus galbula 228.
 — *oriolus oriolus* (L.) 228.
Otis tarda 66.
 — — *tarda* L. 66.
 — *tetrax* 65.
 — — *tetrax* L. 65.
 — *undulata macqueenii* 67.
Otus brachyotus 191.
 — *scops scops* (L.) 190.
 — *vulgaris* 192.

Pagonetta glacialis 20.
Pagophila eburnea (Phipps) 120.
Pandion haliaëtus 181.
 — — *haliaëtus* (L.) 181.
Panurus biarmicus 251.
 — — *biarmicus* (L.) 251.
Parus ater 247.
 — — *ater* L. 247.
 — — *britannicus* Sharpe & Dresser
 247.
 — *coeruleus* 246.
 — — *coeruleus* L. 246.
 — *cristatus* 249.
 — — *mitrotus* Brehm 249.
 — *major* 245.
 — — *major* L. 245.
 — *palustris* 248.
 — — *palustris* L. 248.
Passer domesticus 300.
 — — *domesticus* (L.) 300.
 — *montanus* 301.
 — — *montanus* 301.
Pastor roseus 239.
 — — (L.) 239.
Pelecanus crispus 155.
 — — *Bruch* 155.
Perdix cinerea 41.
 — *perdix perdix* (L.) 41.
Pernis apivorus 172.
 — — *apivorus* (L.) 172.
Phalacrocorax aristotelis aristotelis (L.)
 153.
 — *carbo* 152.
 — — *carbo* (L.) 152.
 — — *subcormoranus* (Brehm) 152.
 — *graculus* 153.
 — *pygmaeus* (Pall.) 154.
 — *pygmaeus* 154.
Phalaropus fulicarius 106.
 — — (L.) 106.
 — *hyperboreus* 105.
 — *lobatus* (L.) 105.
Philomachus pugnax (L.) 94.
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus
 (L.) 290.
 — *ochrurus gibraltariensis* (Gm.) 291.
Phyllopeustes rufus 266.
 — *sibilatrix* 267.
 — *superciliosus* 268.
 — *trochilus* 265
Phylloscopus collybita abietina (Nilss.)
 266.
 — — *collybita* (Vieill.) 266.
 — *humei praemium* Math. & Ire 268.
 — *sibilatrix sibilatrix* (Bechst.) 267.
 — *trochilus eversmanni* (Bp.) 265.
 — — *trochilus* (L.) 265.
Pica caudata 219.
 — *pica pica* (L.) 219.
Picus canus canus Gm. 210.

- Picus martius* 215.
 — *viridis virescens* (Brehm) 211.
 — — *viridis* L. 211.
Pinicola enucleator 316.
 — — *enucleator* (L.) 316.
Platalea leucorodia 149.
 — *leucorodia leucorodia* L. 149.
Plectophenax nivalis (L.) 325.
Plegadis falcinellus 148.
 — — *falcinellus* (L.) 148.
Podiceps auritus 45.
 — — (L.) 45.
 — — *cristatus* 48.
 — — *cristatus* (L.) 48.
 — — *griseigena* 47.
 — — *griseigena* (Bodd.) 47.
 — — *nigricollis* 46.
 — — *nigricollis* Brehm 46.
 — — *ruficollis ruficollis* (Pall.) 44.
Polysticta stelleri (Pall.) 23.
Porzana maruetta 61.
 — — *minuta* 59.
 — — *parva* (Scop.) 59.
 — — *porzana* (L.) 61.
 — — *pusilla intermedia* (Herm.) 60.
 — — *pygmæa* 60.
Praticola rubetra 288.
 — — *rubicola* 289.
Procellaria leucorrhœa 53.
 — — *pelagica* 52.
Prunella modularis modularis (L.) 244.
Puffinus anglorum 54.
 — — *gravis* 56.
 — — (O'Reilly) 56.
 — — *griseus* 55.
 — — (Gm.) 55.
 — — *puffinus mauretanicus* Lowe 54.
 — — *puffinus* (Brünn.) 54.
Pyrrhula erythrina 315.
 — — *pyrrhula pyrrhula* (L.) 314.
 — — *vulgaris* 314.
Querquedula discors (L.) 3.
 — — *querquedula* (L.) 2.
Rallus aquaticus aquaticus L. 62.
 — — *aquaticus* 62.
Recurvirostra avocetta 96.
 — — *avocetta* L. 96.
Regulus cristatus 269.
 — — *ignicapillus* 270.
 — — *ignicapillus* (Temm.) 270.
 — — *regulus regulus* L. 269.
Riparia riparia riparia (L.) 230.
Rissa tridactyla tridactyla (L.) 119.
Ruticilla phoenicura 290.
 — — *titys* 291.
Saxicola oenanthe 287.
 — — *rubetra rubetra* (L.) 288.
Saxicola torquata rubicola (L.) 289.
Scolopax rusticula 110.
 — — *rusticula* L. 110.
Scops giu 190.
Serinus canaria serinus (L.) 309.
 — — *hortulanus* 309.
Siphia parva parva Bechst. 296.
Sitta europæa caesia Wolf. 233.
 — — *europæa* L. 233.
 — — *homeyeri* Hart. 233.
 — — *europæa* 233.
Somateria dispar 23.
 — — *mollissima* 24.
 — — *mollissima* L. 24.
 — — *spectabilis* 25.
 — — (L.) 25.
Spatula clypeata (L.) 8.
Squatarola squatarola squatarola (L.) 72.
Stercorarius longicaudus Vieill. 131.
 — — *parasiticus parasiticus* (L.) 130.
 — — *pomarinus* (Temm.) 132.
 — — *skua skua* (Brünn.) 133.
Sterna albifrons albifrons Pall. 121.
 — — *anglica* 127.
 — — *cantiaca* 125.
 — — *caspia* 126.
 — — *dougallii dougallii* Mont. 124.
 — — *hirundo* 122.
 — — *hirundo* L. 122.
 — — *leucoptera* 128.
 — — *macroura* Naum. 123.
 — — *macrura* 123.
 — — *minuta* 121.
 — — *nigra* 129.
 — — *paradisea* 124.
 — — *sandvicensis sandvicensis* Lath. 125.
Streptopelia interpres 78.
Streptopelia orientalis orientalis (Lath.) 198.
 — — *turtur turtur* (L.) 197.
Strix aluco aluco L. 189.
 — — *sylvatica* Shaw. 189.
 — — *flammea* 195.
Sturnus vulgaris 238.
 — — *vulgaris* L. 238.
Sula bassana 156.
 — — *bassana* (L.) 156.
Surnia ulula 188.
 — — *ulula* (L.) 188.
Sylvia atricapilla 254.
 — — *atricapilla* (L.) 254.
 — — *borin* (Bodd.) 255.
 — — *cinerea* 252.
 — — *communis communis* Lath. 252.
 — — *curruca* 253.
 — — *curruca* (L.) 253.
 — — *hortensis* 255.
 — — *nisoria* 256.
 — — *nisoria* (Bechst.) 256.

- Syrnium aluco* 189.
Syrrhaptes paradoxus 196.
 — — (Pall.) 196.
- Tachybaptus minor* 44.
Tadorna casarca 10.
 — *cornuta* 9.
 — *tadorna* (L.) 9.
- Tetrao tetrix* 42.
 — *urogallus* 43.
 — — *urogallus* (L.) 43.
- Totanus calidris* 90.
 — *fuscus* 91.
 — *glareola* 88
 — *glottis* 92.
 — *ochropus* 89.
- Tringa alpina* 101.
 — *canutus* 100.
 — *erythropus* (Pall.) 91.
 — *glareola* L. 88.
 — *maritima* 99.
 — *minuta* 97.
 — *nebularia* (Gunn.) 92.
 — *ochropus* L. 89.
 — *subarqvata* 102.
 — *temminckii* 98.
 — *totanus totanus* (L.) 90.
- Troglodytes parvulus* 241.
 — *troglodytes troglodytes* (L.) 241.
- Turdus atrigularis* 282.
 — *dauma aureus* Hol 279.
 — *ericetorum ericetorum* Turton 280.
 — — *philomelus* Brehm 280.
 — *eunomus* Temm. 283.
 — *fuscatus* 283.
 — *iliacus* 278.
- Turdus merula* 286.
 — — *merula* L. 286.
 — *musicus* 280.
 — — L. 278.
 — *pilaris* 284.
 — — L. 284.
 — *ruficollis atrogularis* Temm. 282.
 — *torquatus* L. 285.
 — *torqvatus* 285.
 — *varius* 279.
 — *viscivorus* 281.
 — — *viscivorus* L. 281.
- Turtur auritus* 197.
 — *orientalis* 198.
- Tyto alba guttata* (Brehm) 195.
- Upupa epops* 216.
 — — *epops* L. 216.
- Uria aalge aalge* (Pontopp.) 135.
 — — *albionis* With. 135.
 — *arra* 136.
 — *grylle grylle* (L.) 134.
 — *lomvia lomvia* (L.) 136.
 — *troile* 135.
- Vanellus cristatus* 71.
 — — (L.) 71.
- Vultur monachus* 184.
- Xanthocephalus icterocephalus* 240.
 — *xanthocephalus* Bp. 240.
- Ægialitis cantiana* 77.
 — *hiaticula* 76.
 — *minor* 75.