

## MEJSER VED VINTERTID

AF


S. RASMUSSEN

I den strenge og langvarige Vinter 1923—24 morede jeg mig med at fodre mine smaa Venner, Mejserne, idet jeg ophængte Kødben og navnlig Fedtflommer, hvilket sidste de jo ynder fremfor alt andet. De friske Fedtflommer spaltede jeg paa langs i tre Strimler, som jeg dernæst gennemborede med nogle tynde Træpinde, dels for at holde Strimlerne sammen, saa de ikke skulde svinge for voldsomt i Blæsten, dels for at give Mejserne nogle bekvemme Siddepladser, en Foranstaltning, som de var meget glade for.

Resultatet lod ikke vente længe paa sig. Omtrent en halv Time efter, at Fedtet var ophængt i et Blommetræ, der staar ca. 3 m fra mit Køkkenvindue, kom den første Musvit; den blev hurtigt efterfulgt af en anden, og i Løbet af ganske kort Tid var Meddelelsen spredt, og nu gik der et ustandseligt Træk af forskellige Mejsearter fra og til Fedtet fra Solopgang til Solnedgang i omtrent 2 Maaneder.

Det var en Fryd at betragte det Liv, disse smaa Fyre udfoldede. Aldrig var de i Ro, men stedse i Bevægelse, kravlende rundt paa Fedtet, flagrende i Luften, og ofte i Slagsmaal med hverandre. Flere forskellige Arter havde jeg Fornøjelsen at se. Hovedmængden var Musvitter, *Parus major*, men ogsaa Blaamejse, *Parus coeruleus*, kom hyppigt. Et Par Gange havde jeg Besøg af Sumpmejse, *Parus palustris*, og Spætmejse, *Sitta europæa*. Sidstnævnte skulde selvfølgelig som den Akrobat, den er, kravle hen paa Undersiden af en Gren og med Ryggen nedad bøje Nakken bagover og i denne saa pudsige Stilling støde Næbbet ind i Fedtet. Sortmejse og Topmejse kom aldrig, hvorimod Graaspurv, Skovspurv, Bogfinke og Stær undertiden aflagde nogle kortvarige Besøg, der dog aldrig blev til ret meget.

Da jeg havde set paa dette Liv i nogle Dage, opstillede jeg i omtrent 1 m<sup>s</sup> Afstand fra Fedtet et Kamera, forsynet med en Fjernudløser i Forbindelse med en lang Seglgarnssnor, som førtes gennem et aabent Vindue ind i min Kælder; her kunde jeg saa i Ro og Mag sidde og passe det belejlige Øjeblik til at trække i Snoren. Af Resultaterne gengives her et Billede, som viser 4 Musvitter og en Blaamejse; der kunde saaledes samtidig sidde adskillige Mejsere paa Fedtet; dog gik jeg Glip af mange smukke Situationer, idet jeg flere Gange iagttog ikke mindre end 10 Stykker samtidig paa Fedtet; det hele varede imidlertid kun et Nu, saa var Kampen i fuld Gang, og en Del



blev fordrevet til Grenene i Træet, hvor de, ikke uden højlydt Protest, maatte vente, til de andre var mætte. I Løbet af nogle faa Dage kunde Mejserne pille Flommerne saa rene, at der kun hang nogle silkepapirtynde Hinder og flagrede. Saa blev der hængt noget nyt op, og Forestillingen begyndte forfra.

Da Vejret henimod Slutningen af Frostperioden mildnedes, tog Besøget lidt efter lidt af for til Slut helt at ophøre; Foraaret meldte sig da og overførte Mejsernes Virketrang og Interesse paa andre Omraader.