

OM DEN ISLANDSKE KOBBERSNEPPE, *LIMOSA* *LIMOSA ISLANDICA* BR.

AF

E. LEHN SCHIØLER

I 1831 beskrev Brehm i sin »Handb. der Naturgesch. aller Vögel Deutschlands« den islandske Kobbersneppe under Navnet *Limosa islandica* som Nr. 1, medens han som Nr. 2 omtaler »der schwarzschwänzige Sumpfläufer«, *Limosa melanura*; Leisl., der er den samme som Linnés *Scolopax Limosa*. Forskellen imellem de to skulde være, at Linnés Kobbersneppe, d. v. s. den typiske, skulde være mindre end den islandske og have en anden Hovedform.

Det har nu imidlertid vist sig, at den islandske Kobbersneppe snarest er en Ubetydelighed mindre end den typiske, og dette gælder navnlig Næbbet, og desuden er den islandske Kobbersneppe, hvad Brehm ikke omtaler, meget kraftigere i den røde Farve paa Hoved, Hals, Forbryst og Ryg end den her i Landet ynglende Kobbersneppe. Til Sammenligning har foreligget en Række af 17 Hanner og 16 Hunner, alle gamle Fugle af den typiske Form, stammende her fra Landet med Undtagelse af to Hunner, begge Foraarsfugle, der findes paa Zoologisk Museum og ere fra Wöldikes Samling, samt 8 islandske Fugle, hvoraf dog 1 er skudt paa Nolsø, Færøerne, 25. Maj 1899. Blandt de sidstnævnte 8 Fugle findes to, der stamme fra Fabers Samling, og disse ere, skønt 100 Aar gamle, lige saa kraftigt farvede som de andre, der foreligge paa Zoologisk Museum, samlede af Viceinspector Hørring i 1905. I min egen Samling foreligge to Stykker i Yngledragt fra Syd-Island. Maalene for den typiske Kobbersneppe stille sig saaledes:

	Vinge	Næb	Mellemfod	Mellemtaa
17 Hanner, Gennemsnit....	205 mm	91 mm	71 mm	45 mm
Største Maal	215 »	99 »	79 »	48 »
Mindste Maal.....	199 »	83 »	66 »	42 »
16 Hunner, Gennemsnit....	216 »	110 »	81 »	49 »
Største Maal	225 »	121 »	87 »	54 »
Mindste Maal.....	209 »	101 »	72 »	45 »

Maalene for islandske Kobbersnepper ere gennemsnitlig:

	Vinge	Næb	Mellemfod	Mellemtaa
5 Hanner	207 mm	82 mm	70 mm	45 mm
Største Maal	213 »	85 »	75 »	47 »
Mindste Maal	199 »	76 »	66 »	42 »
3 Hunner	216 »	91 »	79 »	48 »
Største Maal	228 »	100 »	82 »	50 »
Mindste Maal	210 »	89 »	77 »	43 »

Det vil saaledes ses, at en nævneværdig Størrelsesforskel kun kommer til Udtryk i Næbbet, som hos den typiske Fugl er paa det nærmeste en Centimeter længere hos Hanner og næsten to Centimeter længere hos Hunner.

Derimod er Farveforskellen meget paafaldende, og dette gælder saavel Fugle, der bære Pragtdragten første Gang som anden Gang, og desuden ses det, at Pragtdragten hos de islandske Stykker gennemgaaende bliver mere fuldendt end hos de typiske, saaledes at der mellem disse to Racer ses en lignende Forskel som mellem den nordlige, det vil sige den typiske Hjejle og dennes skotsk-dansk-mellemeuropæiske Form, *Charadrius apricarius oreophilus*, A. C. Meinertzhagen. Hos helt udfarvede, islandske Stykker er den røde Farve paa Brystet og Hovedet af saa godt som samme Styrke som hos den rødbrune Kobbersneppe *Limosa lapponica lapponica* (L.), og desuden er Baghalsen hos de foreliggende Stykker uplettet, ikke som hos den typiske tegnet med en Række fine, sorte Streger.

For den islandske Race af den sorthalede Kobbersneppe vil det da være rigtigt at bringe Brehms Navn, *Limosa limosa islandica* Br., i Anvendelse.