

FRA FUGLEMÆRKNINGSSTATIONEN I VIBORG.
(H. CHR. C. MORTENSEN †.)

MÆRKEDE HEJRER.

(*ARDEA CINEREA*.)

VED

SYLV. MATTHIAS SAXTORPH.

MED INDLEDENDE BEMÆRKNINGER AF H. CHR. C. MORTENSEN¹.

Som Barn kom jeg jævnlig ud til »Hejrebakken« i Lille Hareskov ved Sydøstenden af Søndersø. Det var længe, før Vandværket, som Københavns Kommune nu har anlagt der i Nærheden, blev bygget; der kom i de Aar ikke mange Mennesker paa det Sted, saa der var idyllisk Fred og Ro under de mægtige Bøge paa Bakkens Top. Der boede den Gang en Koloni af Hejrer i Træerne, og vi Drengene nærmede os altid saa stille, som vi kunde, den interessante Plads for om muligt at faa nogle af Fuglene at se. Allerede i nogen Afstand kunde man høre en besynderlig, ivrig Snakken eller som et rapt Skænderi af klaprende og skrattende Smækkelyde oppe i de nøgne Trætoppe — Hejrerne havde jo baade Æg og Unger, længe før Bøgen sprang ud — men den hørte op efterhaanden, som vi kom listende, og naar vi var naaet hen under Træerne, fløj der altid en Del Hejrer op, hvad enten de nu havde siddet paa Grenene, eller de blev jaget af Rederne. Med den lange, tynde Hals strakt lige til Vejrs for de op, men de var ikke kommet ret højt op over Træernes Kroner, før de lagde Halsen dobbelt og arbejdede sig bort med tunge Vingeslag, gerne i Retning af Søen. Undertiden kunde vi finde vidunderlig blaa Æggeskaller i det korte, visne Græs mellem Træerne, og der kunde være stærkt overkalket af Ekskrementer oppe om Rederne.

Med Forbavselse og Beundring hørte jeg, at et ungt Menneske fra det nærliggende Jonstrup Seminarium en Gang var klatret op til en af Hejrerederne; man kunde næsten ikke tro det muligt, for der var ingen Grene før højt, højt oppe, og de haarde, glatte Stammer var saa vældige, at en Mand ikke kunde favne

¹ Blandt Mortensens efterladte Arbejder fandtes følgende Indledning til det paatænkte Arbejde om mærkede Hejrer; den gengives her efter Manuskriptet.

om dem; ja, hvis man lagde sin Haand paa dem, kunde man knap mærke, at de rørte sig, selv om Rederne oppe i Topgrenene svajede i Vinden. Turde man overhovedet krybe op ad saadan en tynd Gren? Og var man endelig kommet op under Reden,



Hejre ved Reden, Store Lyngby Skov, 5. Maj 1912. H. Weis fot.

hvordan skulde man saa komme ud til dens Rand og op til Oversiden af den? Mulig var der Unger; vilde de saa ikke hugge, eller maaske sprøjte deres Skarn lige i Ansigtet af en?

Nej, det er aabenbart ingen let Sag at komme op i en Hejrede, i Almindelighed da, navnlig fordi Hejrerne ikke ynder skyggende Bladhang over Reden, men vil have den saa aabent som muligt ud mod Lyset, saaledes at den i Reglen anlægges i de øverste Grene af Træet.

Det var derfor med ikke ringe Spænding, at jeg i Foraaret

1910 modtog Tilbud fra to ivrige Fuglevenner, daværende Stud. med. G. Rendtorff og Gymnasiast Sylvester Saxtorph om at mærke et Parti Hejreunger for mig. Saxtorph havde allerede i flere Aar kendt Kolonien i Store Lyngby Skov ved Arresø og gjort Iagttagelser der; Rendtorff havde navnlig i Sommeren 1909 hjulpet mig med at mærke Storke, og han var altsaa vant til at omgaas baade Værktøj, Ringe, Fuglefødder og Mærkesedler med Optegnelser om Mærkningen (den Del af Mærkningsarbejdet, som interesserer de unge mindst, og som det undertiden kniber med at faa udført fuldt ud tilfredsstillende), og han skulde derfor i Begyndelsen lede Arbejdet. Saxtorph erhvervede altsaa Skovriderens, Jagtjunker Heilmanns, Tilladelse til Foretagendet, Stud. med. G. Begtrup tilsagde sin Hjælp, og den 16. og 17. Maj 1910 drog de unge om i Skoven med en Brandstige og arbejdede i deres Ansigts Sved, saaledes som det er fortalt af G. Rendtorff i D. o. F.s T., Bind 5, S. 120, medens jeg gik herovre i Viborg og ikke var rigtig rolig i Sindet — en af de unge kunde jo ved et Uheld falde ned og komme galt af Sted!

Men heldigvis gik det godt, baade i 1910, da 55 Hejreunger blev mærket, og i de to paafølgende Aar, 1911 og 1912, hvor Sylv. Saxtorph, Stud. mag. P. Jespersen, Stud. med. G. Begtrup og Gymnasiast A. Jacobsen deltog i Arbejdet. Det friske Liv i Skoven betog som sædvanlig de unge, saaledes at jeg — foruden at faa endnu 72 + 59 Hejrer sendt ud i Verden med min Adresse paa — havde den Tilfredsstillelse at modtage Breve fra flere af Deltagerne i Mærkningsarbejdet, hvori de udtaler deres Glæde over at have været med; en skriver, at det var »en overmaade interessant og fornøjelig Beskæftigelse«, en anden endog til Slut: »Saa takker jeg altsaa paa alle fires Vegne for Fornøjelsen, vi har haft igen i Aar«.

Som jeg en Gang tidligere¹ har skrevet, er Mærkningsarbejdet tredobbelt. Den første Del af det, Arbejdet i det fri, er den fornøjeligste, den anden Del, Brevvekslingen med dem, der har skudt de mærkede Fugle, kan blive lidt ensformig og trættende, fordi det stadig er de samme Spørgsmaal, man skal have besvaret, hvad enten det nu er paa Dansk eller paa et fremmed Tungemaal. Den tredie Del af Arbejdet, Sammenstillingen af de indvundne Resultater, kan det knibe med at skaffe Tid til, navnlig naar der er andre Ting i Verden, der først skal udføres,

¹ D. o. F.s Tidsskrift, Bind 5, 1910—11, S. 116.

og saaledes er det da gaaet til, at denne lille Redegørelse er blevet saa forsinket, som den er.

Men nu aflægger jeg altsaa min bedste Tak til de behændige og udholdende unge Mennesker, der klatrede op i Træerne og — tit under vanskelige Forhold — fik Hejrerne mærket, og til de Jægere, der har været saa elskværdige at sende mig Bud om de nedlagte Ringhejrer (desværre har det vist sig, at det ikke er alle, der gør det).

H. CHR. C. MORTENSEN.

Det lykkedes ikke Overlærer Mortensen inden hans Død at faa redegjort for alle Resultaterne af hans store Ringmærkningsarbejde. Trods et svagt Helbred i de sidste Aar syslede han dog med stor Interesse med disse Arbejder, og det var hans stadige Haab selv at kunne naa at faa dem gjort færdige. Efter hans Død er Materialet for Hejrerens Vedkommende overgivet mig til Bearbejdelse og Offentliggørelse, og Resultaterne skal meddeles i det følgende. Jeg har med Vilje ikke føjet stort til, hvad der allerede forelaa igennem de forskellige Meddelesers Breve og Beretninger til Mortensen, men blot søgt at samle Materialet i forskellige Afsnit for en lettere Orienterings Skyld. Jeg er mig bevidst, at Mortensen selv vilde have kunnet faa langt mere ud af Materialet; han evnede paa en underholdende og lærerig Maade at fortælle om Oplevelser og Iagttagelser, som kun faa andre har kunnet det. Derfor synes jeg ikke, at efterfølgende, som dog først og fremmest er hans Værk, skulde paa stemples nogen andens personlige Præg.

I følgende er der brugt nogle Forkortelser paa Personnavne; de er følgende: G. R. (Læge G. Rendtorff), P. J. (Mag. scient. Poul Jespersen), A. J. (Ingeniør, cand. polyt. A. Jacobsen), G. B. (afdøde Landbrugskandidat G. Begtrup), A. S. (Fru Aslaug Saxtorph) og S. M. S. (Læge S. M. Saxtorph).

Der blev i alt mærket 186 Hejrer. I 1910 55 Stkr., 16. og 17. Maj, i 1911 72 Stkr., 13. og 25. Maj og i 1912 59 Stkr., 16. Maj. Der er kommet Meddelelser tilbage om 70 omkomne Fugle; det er omtrent 38 % af samtlige, hvilket vel nok maa siges at være et meget højt Tal. De 70 Meddelelser er kommet fra følgende Lande: Danmark 29, Tyskland 12, Holland 6, Frankrig 7, England 3, Skotland 1, Spanien 4, Portugal 5, Algier 1, Ungarn 1 og Sverige 1.

HEJRER OMKOMMET I DANMARK.

I. UNGE HEJRER OMKOMMET KORT TID EFTER MÆRKNINGEN.

400. Mærket 16. Maj 1910 af G. B. Skudt 5. Juli 1910 ved en lille Sø ved Bognæs ved Roskilde Fjord. Meddeleren, Skovfoged Jensen, Bognæs, beretter, at der meget hyppigt ses trækende Hejrer, naar først Ungerne er blevet store.

Dræbt inden 2 Maaneder efter Mærkning.

651. Mærket 25. Maj 1911 af S. M. S. Fundet død tæt Syd for Hillerød 19. Juli af Husejer P. Larsen, Karlebo Overdrev. Blev fundet, nylig død, under Telegrafledningerne ved Jernbanen; maa formodes at være fløjet derimod.

Dræbt inden 2 Maaneder efter Mærkning.

650. Mærket 25. Maj 1911 af S. M. S. Skudt 20. Juli 1911 ca. 8 km Vest for Hillerød af Bestyrer Hansen, Strødam.

Dræbt inden 2 Maaneder efter Mærkning.

623. Mærket 25. Maj 1911 af G. B. Skudt 16. Juli 1911 ved en Ørreddam ved Søholt, 1 Mil Nord for Ebeltoft. Meddeleren, Proprietær Fensmark, Søholt pr. Tirstrup, fortæller, at der efter Yngletidens Ophør, i Juli Maaned hvert Aar ses en Del Hejrer ved Dammene.

Dræbt inden 2 Maaneder efter Mærkning.

614. Mærket 13. Maj 1911 af S. M. S. Skudt 19. Juli 1911 ved Lem af M. C. Nygaard, Dejbjerg pr. Lem. Hejrerne er aabenbart ikke almindelige der paa Egnen, da Meddeleren udtaler sin Forbavselse over, at Fuglen yngler her i Landet.

Dræbt godt 2 Maaneder efter Mærkning.

604. Mærket 13. Maj 1911 af S. M. S. Skudt 21. Juli 1911 ved Skagesø paa Agersø pr. Skelskør af Lærer N. O. Christiansen. Der meddeles, at Hejrerne træffes almindeligt i Egnen navnlig i Juli, August og første Halvdel af September, og der skrives endvidere: »Hejretrækket er særlig stort i Aar her paa Agersø; de trækker ind til Søen om Aftenen ved 10-Tiden og atter ud om Morgenens ved 5-Tiden. Resten af Dagen opholder de sig paa en lavvandet Grund, der strækker sig ud i Agersø-sund i østlig Retning.«

Dræbt godt 2 Maaneder efter Mærkning.

380. Mærket 16. Maj 1910 af G. R. Benet med paasiddende

Ring blev fundet paa Nyeng ved Ho Bugt (Hjerting Fjord). Fuglen er ganske sikkert skudt 28. Juli 1910 af Kjøbmand S. Madsen, Ho pr. Oxbøl, som meddeler, at der om Sommeren ses mange Hejrer ved Hjerting Fjord.

Dræbt godt 2 Maaneder efter Mærkning.

661. Mærket 25. Maj 1911 af G. B. Skudt 13. August 1911 ved Borrevejle Fjord (Roskilde Fjord) af Lærer Kristensen, Lyndby Skole pr. Roskilde. Paa Spørgsmaal, om der yngler Hejrer i Nærheden, svares: »I Bogenæs Skov yngler der vistnok Hejrer endnu, men for 20 Aar siden var der en lille Skov ved Herregaarden Lindholm, der ligger ved Enden af Lyndby Fjord, hvor der var over 50 Reder hver Sommer. Skoven kaldes ogsaa Hejreholm, men er nu delvis ryddet, men paa Spidsen af Bogenæs Pynt i den saakaldte Vesterskov yngler der Hejrer endnu.«

Dræbt knap 3 Maaneder efter Mærkning.

816. Mærket 16. Maj 1912 af A. J. Skudt 16. August 1912 af stud. jur. O. Bøe Jørgensen, Baroniet Stampenborg pr. Præstø. I en Skov lige Nord for Gaarden Kristinelund findes en Koloni paa 20 Reder. Hejrerne Tilbøjelighed til med Mellemrum at skifte Redetræer omtaler Meddelelsen ogsaa. »De Graner, Hejrerne yngler i for Øjeblikket, er iblandet med Bøgetræer, og for ca. 10 Aar siden ynglede Hejrerne i de høje Bøge; men saa skete det mærkelige, at Hejrerne pludseligt gik fra Bøgene, og nu yngler de udelukkende i ca. 40-aarige Graner.«

Dræbt 3 Maaneder efter Mærkning.

611. Mærket 13. Maj 1911 af A. J. Skudt 17. August 1911 af Skovfoged Jeppesen, Øllingsø, Søllested St., ved en lille Sø i Øllingsøgaard Skov, Græshave Sogn, Laaland. Der skal i August Maaned almindeligt træffes Hejrer der paa Egnen. De skal have ynglet der for ca. 50 Aar siden, men gør det ikke mere.

Dræbt godt 3 Maaneder efter Mærkning.

666. Mærket 16. Maj 1912 af A. J. Skudt 22. August 1912 i Lille Brøndum Kær (2 km N. Ø. for Bælum St.). Meddelt af Lærer Juul-Sørensen, Bælum Højskole. Fuglen blev skudt lige ved Kanten af Lille Vildmose 7—8 km fra Kattegat. Der meddeles, at Hejrer kun ses ret sjældent der paa Egnen.

Dræbt godt 3 Maaneder efter Mærkning.

649. Mærket 25. Maj 1911 af S. M. S. Fundet død i Be-

gyndelsen af November i Fiskebæk Skov ved Stavreby, Sydfalster af Husejer N. P. Hansens Hustru sammesteds.

Omkommet godt 5 Maaneder efter Mærkning.

Der er omkommet 12 Hejrer her i Landet kort Tid efter Mærkningen; 7 omkring 2 Maaneder efter, 4 ca. 3 Maaneder efter og 1 efter 5 Maaneders Forløb. De er skudt i de forskellige Egne af Landet. De 4 er skudt ret nær Ynglestedet nemlig 400, 651, 650 og 661. Fra Jylland haves 4, 623, 614, 380 og 666. Fra Sydsjælland 2, 604 og 816, fra Laaland 611 og fra Falster 649. Dette viser saa tydeligt det iøvrigt velkendte Fænomen, at Hejrerne, naar Yngletiden er forbi, færdes meget spredt over Landet og strejfer langt omkring Sommeren og Efteraaret igennem. Fra mange Steder iagttages ganske regelmæssigt hvert Aar, at Hejrer, unge og gamle, ses paa bestemte Egne fra Juli-August og hele Efteraaret ud. Der synes at være noget uregelmæssigt, næsten tilfældigt over disse Fugles Trækforhold, thi medens øjensynligt et stort Antal bliver her i Landet mange Maaneder efter, at de er fløjet fra Rederne, trækker en Del ogsaa straks bort, hvad der vil ses af de følgende Meddelelser. Der synes ikke at være nogen bestemt, paaviselig Aarsag til, at de trækker bort saa tidligt. Det er f. Eks. næppe Ernæringsspørgsmaalet eller Kulde; der saa hurtigt driver Hejrer bort, at nogle skydes i Spanien i August, medens andre bliver her hele Vinteren igennem.

II. UNGE HEJRER OMKOMMET OM VINTEREN.

699. Mærket 16. Maj 1912 af P. J. Skudt 17. Januar 1913 af H. Hansen, Baagø pr. Assens, paa en lille Holm, Ægholm, N. for Baagø. Fuglen var alene. I milde Vintre træffes Hejrerne af og til der paa Eggen, meddeles der.

Dræbt 8 Maaneder efter Mærkning.

671. Mærket 16. Maj 1912 af S. M. S. Skudt 26. Januar 1913 af Proprietær L. Lange, Løjtvedgaard pr. Svebølle. Der meddeles, at Hejrerne i Reglen træffes overvintrende. Denne Fugl blev skudt, da den fløj op fra en lille Grøft, en Lokalitet som Hejrerne om Vinteren meget ynder at opholde sig ved.

Dræbt godt 8 Maaneder efter Mærkning.

670. Mærket 16. Maj 1912 af S. M. S. Skudt 3. Februar 1913

i Aalholm Hestehave pr. Nysted af Skytte Hansen, Aalholm. Der var 3 sammen, foruden den mærkede en gammel og en ung Fugl. Alle 3 blev skudt og indsendt til Konservator H. P. Rasmussen, Kjøbenhavn, som bl. a. meddelte, at Dyrenes Maveindhold udelukkende bestod af Mus. I Brevet hedder det endvidere, at der hyppigt ses Hejrer om Vinteren. I Aalholm Hestehave opgives at yngle ca. 10 Par, men i den nærliggende Ugleholt Skov findes en større Koloni.

Dræbt godt 8 Maaneder efter Mærkning.

381. Mærket 16. Maj 1910 af G. R. Skudt 9. Februar 1911 paa Tjokholm N. f. Korsør af Forpagter Berg, Næsbygaard. Fuglen var alene, og der var ikke i nærmeste Tid deromkring set andre Hejrer.

Dræbt 8 Maaneder efter Mærkning.

608. Mærket 13. Maj 1911 af A. J. Dræbt først i Februar 1912 af A. Petersen, Hejsager Strand i Haderslev Amt. Der foreligger ingen nærmere Oplysninger.

Dræbt 9 Maaneder efter Mærkning.

5 unge Hejrer er omkommet her i Landet ved Vintertid. De er alle dræbte enten i Januar eller først i Februar. Jeg mener ganske bestemt, at disse Fugle maa betragtes som overvintrende. Jeg har Oplysninger fra en hel Aarrække om Hejrerens Ankomst til Eggen om Kolonien ved St. Lyngby Skov; de kom aldrig før sidst i Februar. Adskillige af Meddelerne beretter da ogsaa, at i milde Vintre træffes Fuglene ret almindeligt, hvad jeg ogsaa af egen Erfaring kan bekræfte. Hejrer taaler øjensynligt godt et ret haardt Klima, naar blot ikke alle Vandløb fryser helt til.

De 5 Fugle er dræbt paa Sjælland, Laaland, Fyn og i Jylland.

III. HEJRER SOM ER OMKOMMET LÆNGERE TID EFTER MÆRKNING.

805. Mærket 16. Maj 1912 af P. J. Skudt 1. August 1913 ved Saltbæk Vig ved Kalundborg af Overretssagfører C. Becker, Kjøbenhavn. Den kom sammen med en anden trækkende højt over nogle Karpedamme.

Dræbt godt 14 Maaneder efter Mærkning.

430. Mærket 17. Maj 1910 af S. M. S. Skudt 12. April 1912

paa Avedøre Holme, Syd for Kjøbenhavn af Murer C. Steffens, Kjøbenhavn. Jægeren bragte Fuglen til Konservator Manniche og derfra kom den i Vekselerer Schiølers Samling. Vekselerer Schiøler skriver følgende: »Hejrens Dragt er ikke videre smuk; den har ret korte Nakkefjer; om Næbbet er den snavset, som om den havde fodret Unger. Jeg har undersøgt dens Kønsorganer; det er en ♀. Æglægningen er aabenbart tilendebragt for nogle Uger siden. Æggeleden, der har været mægtig udvidet og opsvulmet, er ved at gaa »i Ro« igen. Æggestokken er arret. Skelettet er ogsaa undersøgt og i min Besiddelse; jeg har kun undersøgt faa Hejrer og kan derfor intet sige med Sikkerhed; jeg vilde formode, at Dyret, da der endnu i Brystbenet findes noget Blod, højst er 2 Aar gammelt, maaske fra ifjor. Til Oplysning af Spørgsmaalet om, hvor gammel en Hejre skal være for at være kønsmoden, kan altsaa dette Stykke give et Vink. Det ligger nær at tro, at den er hjemmehørende i Jonstrup Vang Kolonien i Aar. Smaa Hejreunger og stærkt rugede, tildels »spraaede« Æg er set for allerede 8 Dage siden her i Omegnen af Student Weis.«

Dræbt omtrent 2 Aar efter Mærkning.

668. Mærket 16. Maj 1912 af A. J. Skudt 17. Juli 1914 ved Boller Skov ved Horsens Fjord af Fisker C. Nielsen, Horsens. Den kom flyvende sammen med flere andre Hejrer ud fra Skoven. Meddelelsen opgiver, at der yngler Hejrer i Skovene til Jensgaard, Tyrrestrup og Serridslevgaard.

Dræbt godt 2 Aar efter Mærkning.

431. Mærket 17. Maj 1910 af G. R. Skudt 22. Marts 1913 paa Alsønderup Enge (nær Arresø) af Hjulmand N. Nielsen, Alsønderup pr. Hillerød. Man skal sikkert være meget varsom med helt at stole paa de tilsendte Oplysninger; saaledes meddeles her, at Hejrerne ikke yngler i Nærheden trods det, at der er 2 Kolonier lige ved Arresø, nemlig den i Store Lyngby Skov og en i Nejede Vesterskov.

Dræbt næsten 3 Aar efter Mærkning.

820. Mærket 16. Maj 1912 af P. J. Skudt 29. Marts 1915 ved Roskilde Fjord nær Frederikssund af Tandlæge H. Bobjærg, Frederikssund. Fuglen blev sendt til Udstopning hos Konservator

Hansen, Herning, som meddeler, at det var en gammel, udfarvet Han.

Dræbt næsten 3 Aar efter Mærkning.

610. Mærket 13. Maj 1911 af A. J. Skudt 9. Juni 1914 i Store Lyngby Skov i den gamle Koloni af Proprietær P. Larsen, Søgaard, Brederød pr. Frederiksværk. Der foreligger desværre ikke nærmere Oplysninger.

Dræbt 3 Aar efter Mærkning.

654. Mærket 25. Maj 1911 af S. M. S. Fundet som nylig dræbt 18. Juni 1916 ved Jægerspris (Hornsherred) af Prokurist N. Haf-tas, Kjøbenhavn.

Omkommet 5 Aar efter Mærkning.

812. Mærket 16. Maj 1912 af A. J. Skudt 6. Juni 1918 i Østskov pr. Skibby (Hornsherred) af Forpagter O. Andersen, Eskildsø pr. Skibby.

Dræbt 6 Aar efter Mærkning.

811. Mærket 16. Maj 1912 af S. M. S. Skudt 28. April 1919 i Østskov pr. Skibby (Hornsherred) af Forpagter O. Andersen, Eskildsø pr. Skibby.

Dræbt 7 Aar efter Mærkning.

603. Mærket 13. Maj 1911 af S. M. S. Skudt i Begyndelsen af April 1918 i Nærheden af Hillerød (Cyklesmed Schultz, Hillerød). Nærmere Oplysninger mangler.

Dræbt 7 Aar efter Mærkning.

418. Mærket 17. Maj 1910 af S. M. S. Fanget 15. Juni 1918 i en Oddersaks i Stormose ved Maaløv (Sjælland) af Laurs Jensen, Stormosegaard pr. Maaløv.

Omkommet 8 Aar efter Mærkning.

Der er dræbt 12 Hejrer, som har levet længere end et Aar efter Mærkningen. 654 er skudt efter 5 Aars Forløb, 812 efter 6 Aar, 811 og 603 efter 7 Aar og 418 efter hele 8 Aar. Der er det bemærkelsesværdige ved dette Afsnit, at der findes ingen gamle Fugle, som er dræbt her i Landet om Vinteren. Man kunde fristes til at antage, at det kun var blandt de unge Fugle, at nogle overvintrede, medens de ældre altid trak bort. Man kan imidlertid ikke slutte noget bestemt af disse forholdsvi-

lave Tal; men det synes at passe godt sammen med, at man vistnok hovedsageligt iagttager unge Fugle om Vinteren. De 9 af disse Fugle er omkommet paa et Tidspunkt, som ligger omkring Yngletiden, og de er alle skudt i forholdsvis ringe Afstand fra Moderkolonien; ingen Afstand er i Luftlinien større end ca. 50 km. Det tyder meget stærkt paa, at et stort Antal af Fuglene stadig vender tilbage til enten selve den gamle Koloni eller nærmeste Egn for at yngle der. 610 er saaledes skudt i Kolonien godt 3 Aar efter, at den var blevet mærket. Af Interesse er 417, som viser, at en Hejre er yngledygtig i hvert Fald, naar den er 2 Aar gammel. En Del af disse Hejrer er skudte ved Roskilde Fjord eller i nogle Miles Afstand fra Kolonien; det drejer sig sikkert om Fugle, der har haft Rede i Store Lyngby Skov og blot været ude paa Fourageringstogter. Hele Roskilde Fjord maa betragtes som Spisekammer for Koloniens Beboere. Som en Ejendommelighed maa nævnes, at 811 og 812 blev skudte med 1 Aars Mellemrum paa samme Sted og af samme Jæger.

2 Hejrer er skudte paa Strejftogt om Sommeren (805 og 668), og en (430) er fra November Maaned, sandsynligvis omkommet paa Trækket mod Syd.

HEJRER OMKOMMET I TYSKLAND.

405. Mærket 16. Maj 1910 af G. R. Skudt 26. Juni 1910 ved Vesterwohld bei Nordhastedt i Holsten, lidt ØSØ. for Heide, af Skolediscipel Konrad Lindemann sammesteds. Der meddeles, at Hejrerne kun sjældent overvintrer der paa Egnen; de kommer om Sommeren (405 angives lige at være ankommet!) og trækker bort om Efteraaret for igen at vise sig om Foraaet. Fuglen er udstoppet og findes i Skolens Samling i Heide.

Dræbt godt 1 Maaned efter Mærkning.

404. Mærket 16. Maj 1910 af G. R. Skudt 2. Juli 1910 ved Grevesmühlen i Mecklenburg, ca. 30 km NNV. for Schwerin. Meddelt af Revierförster A. Pries, Everstorf bei Grevesmühlen. En Del Hejrer skal i milde Vintre være at se til Stadighed.


Dræbt $1\frac{1}{2}$ Maaned efter Mærkning.

389. Mærket 16. Maj 1910 af G. R. Skudt 23. Juli 1910 ved Balje, V. for Freiburg, nær Elben i Hannover. Stedet er lige

overfor Nord-Østersøkanalens vestlige Munding. Meddelt af Postmester Hans Hansen, sammesteds.

Dræbt 2 Maaneder efter Mærkning.

428. Mærket 17. Maj 1910 af G. R. Skudt 6. September 1910 ved en lille Biflod til Elben mellem Hamburg og Harburg. Meddelt af Rudolf Wilkens, Harburg. Hejren gjorde et ual-



Ringmærkede Hejrer (*Ardea cinerea*), omkomne i Udlandet. + Ringmærkningsstedet.

mindelig kraftigt Indtryk og var meget fed. Samme Dag blev 2 andre Hejrer dræbt. Stedet bestaar af 500 Hektar Eng, som gennemstrømmes af flere smaa Arme til Elben, og disse er overalt omgivet af Rørbevoksninger. Der skydes hvert Efteraar 20—30 Stkr. Enkelte overvintrer; men indtræffer Frost, saa Vandet fryser til, trækker de bort.

Dræbt 4 Maaneder efter Mærkning.

425. Mærket 17. Maj 1910 af G. R. Fundet 10. September 1910 anskudt og død i en Frugthave i Neuenkirchen ved Horneburg i Hannover. Horneburg ligger ca. 30 km Vest for Harburg ved en lille Biflod til Elben.

Omkommet 4 Maaneder efter Mærkning.

396. Mærket 16. Maj 1910 af S. M. S. Skudt 5. Oktober 1910 ved Warwerort ved Büsum af Købmand G. A. Ernst. Warwerort er en lille Fiskerby ved Ditmarskerbugten imellem Büsum og Meldorf. Det berettes, at Hejrerne kommer ret talrigt i Oktober og ses trækkende over Bugten fra Nord til Syd. Kun enkelte overvintre.

Dræbt 5 Maaneder efter Mærkning.

802. Mærket 16. Maj 1912 af A. J. Skudt 23. November 1912 ved Tönning (Holsten) af Aug. Bruhn, Kleihörn bei Tönning. Der ses ikke noget regelmæssigt Træk; men om Efteraaret er Hejrerne ret almindelige, hvorimod de kun sjældent overvintre.

Dræbt 6 Maaneder efter Mærkning.

640. Mærket 13. Maj 1911 af S. M. S. Skudt 22. Januar 1912 ved Floden Trave paa Godset Wensin nær Segeberg i Holsten. Terrænet er lavt England omkring Floden. Der kommer hvert Efteraar en Del Hejrer, færre om Foraaret. Der angives, at de ikke overvintre, hvilket lyder mærkeligt, da Fuglen er skudt i Januar, og det tilmed paa den Tid var koldt med Is overalt.

Dræbt 8 Maaneder efter Mærkning.

677. Mærket 16. Maj 1912 af S. M. S. Skudt 16. December 1913 ved Elben nær Brunsbüttel, lige hvor Nord-Østersøkanalen munder ud, af August Zipfel, Brunsbüttelkoog. Om Efteraaret ses der »Hundreder« af Hejrer; enkelte overvintre.

Dræbt 1½ Aar efter Mærkning.

397. Mærket 16. Maj 1910 af S. M. S. Skudt 17. Januar 1912 ved Gr. Fredensbeck i Hannover af Jagtinspektør Cl. Wiebusch. Stedet ligger ca. 7 km Sydvest for Stade, ikke langt fra Elben. Fuglen blev skudt ved en lille Aa, som ikke var tilfrossen. Der ses ofte Hejrer hele Vinteren igennem. Naar der træffes Hejrer paa Stedet, er det i Reglen Fugle, som er kommet oppe fra Elben.

Dræbt godt 1½ Aar efter Mærkning.

633. Mærket 13. Maj 1911 af P. J. Skudt 19. Januar 1913 ved Elsdorf, Sydvest for Rendsborg af Hans Storm i Elsdorf. Hejren var alene, og det angives, at Fuglen overhovedet ses sjældent der og ikke overvintre.

Dræbt godt 1½ Aar efter Mærkning.

424. Mærket 17. Maj 1910 af G. R. Skudt 2. Marts 1912 i

Nærheden af Lüneburg (Hannover) af H. Schlaack, Neulockstedt pr. Hamburg. Hejrerne skal ikke ses almindeligt der paa Egnen, men menes mere at komme paa tilfældigt Besøg oppe fra Elben.

Dræbt omtrent 2 Aar efter Mærkning.

676. Mærket 16. Maj 1912 af A. J. Skudt 25. September 1920 ved Rellingen nær Pinneberg, Nordvest for Altona, ikke langt fra Elben. Hejrerne angives at overvintre paa Egnen. Meddelt af Fru Anna Pötschke, Tolk.

Dræbt 8½ Aar efter Mærkning.

13 Hejrer er skudt i Tyskland. De stammer næsten alle fra et ret begrænset Omraade af Nordvesttyskland, væsentlig omkring Elben. Allerede nu viser der sig den sydvestlige Retning, som de fleste af vore Trækfugle synes at benytte sig af. De dræbte Fugle stammer fra følgende Maaneder: 1 fra Juni, 2 fra Juli, 2 fra September, 2 fra Oktober, 1 fra November, 4 fra Januar og 1 fra Marts. De fleste er omkommet i første Leveaar, 3 efter 1½ Aars Forløb, 1 efter omtrent 2 Aar og en sidste efter godt 8 Aars Forløb. Det bemærkes, at i Yngletiden er kun skudt 1 Eksemplar, Nr. 424. Flertallet er skudt i Sommer- eller Efteraarsmaanederne. Efter Oplysningerne at dømme synes Forholdene med Hensyn til Overvintring at være som her i Landet. Flere angiver, at Hejrerne bliver der Vinteren over, naar det blot ikke er altfor koldt; andre meddeler, at de kun ser Fuglene Foraar og Efteraar. Der synes ikke at være mange Ynglepladser for den i de omtalte Egne.

HEJRER OMKOMMET I HOLLAND.

635. Mærket 13. Maj 1911 af G. B. Skudt 21. November 1911 i en lille Skov ved Alfen ved Rijn, beliggende omtrent midt imellem Leyden og Utrecht, af J. Th. L. Withof-Keus, samme-steds. Der meddeles, at man der paa Egnen ser Hejrer hele Aaret, baade Sommer og Vinter; men de findes ikke ynglende. Da Fuglen blev skudt, var den i Selskab med en anden, som ogsaa blev skudt; men den havde intet Mærke.

Dræbt 6 Maaneder efter Mærkning.

691. Mærket 16. Maj 1912 af S. M. S. Fundet død 22. Januar 1913 drivende i Vandet i en Aa 4 km Vest for Dwingeloo i Provinsen Drente. Meddelt af Overlærer E. J. Boneschanscher

i Dwingeloo. Fuglen var yderlig afmagret. Der træffes mange Hejrer baade Foraar, Sommer og Efteraar, og de yngler i høje Graner i en nærliggende Skov. Træffes af og til om Vinteren.

Omkommet ca. 7 Maaneder efter Mærkning.

615. Mærket 13. Maj 1911 af A. J. Fundet død 5. Februar 1912 ved Zuidersøen imellem Elburg og Kampen af Gerrit Berghuis, Oldebroek, Gelderland. Vinteren 1911—12 var som bekendt meget kold, og Meddeleeren fandt Fuglen ihjelfrossen (eller sultet ihjel!) i 20° Kulde. Der blev fundet flere døde Hejrer (der var ikke længere aabent Vand noget Sted). Der skal ses mange Hejrer baade Foraar og Efteraar, ligesom de baade yngler og overvintrer der.

Omkommet ca. 9 Maaneder efter Mærkning.

630. Mærket 13. Maj 1911 af P. J. Fundet død sidst i Januar 1913 ved Staphorst i Provinsen Overijssel af E. Mulder, sammesteds. Efter Opgivelserne skal Hejrer være temmelig sjældne der paa Egnen og menes ikke at overvintre almindeligt.

Omkommet godt 1½ Aar efter Mærkning.

685. Mærket 16. Maj 1912 af P. J. Skudt 23. December 1913 ved Zuiddospe i Provinsen Zeeland nær den belgiske Grænse af Brygmester Eugène Boelens, Lokeren, Belgien.

Der meddeles, at Hejrerne er meget hyppige paa omtalte Egn; der træffes mange baade Foraar og Efteraar, og de baade yngler og overvintrer der.

Dræbt ca. 1½ Aar efter Mærkning.

386. Mærket 16. Maj 1910 af G. R. Fundet nylig død 16. Marts 1912 paa Øen Texel. Nærmere Oplysninger foreligger ikke.

Omkommet næsten 2 Aar efter Mærkning.

I Holland er omkommet 6 Hejrer i Maanederne November, December, Januar, Februar og Marts. Det synes saaledes, som om det her væsentlig drejer sig om overvintrende Fugle. Der er ret mange, som øjensynligt er omkommet paa Grund af strenge meteorologiske Forhold med streng Frost og megen Is. De fleste Meddelere beretter, at Hejrerne ses der hele Vinteren.

HEJRER OMKOMMET I ENGLAND OG SKOTLAND.

403. Mærket 16. Maj 1910 af G. R. Skudt 17. Oktober 1910 ved Amesbury, 8 Miles Nord for Salisbury. Meddelt af Oberst Edmund Antrobus, sammesteds.

Hejren blev skudt paa et Terræn, bestaaende af Enge og Damme, som bliver kunstigt forsynet med Vand fra anlagte Ledninger, og som bliver benyttet til Ørredopdræt og Ørredfiskeri. Meddelelsen er meget vred paa Hejrerne, som efter hans Mening gør overordentlig stor Skade paa Fiskebestanden. De skulde endog dræbe Ørreder paa 1 kg's Vægt; men disse Fisk var saa store, at Hejrerne ikke kunde sluge dem, men blot lod dem ligge efter at have spiddet dem(!). Hejrerne ses der hele Aaret rundt, men yngler ikke, da de bliver saa meget forfulgt.

Dræbt 5 Maaneder efter Mærkning.

622. Mærket 25. Maj 1911 af G. B. Skudt 13. Oktober 1911 ved North Elmham i Norfolk af W. Bales Billingsford, North Elmham. Fuglen blev skudt i en Mose, hvor den var sammen med en anden Hejre. Hejrer skal ikke ses hyppigt, mest om Efteraaret og Vinteren. Meddelelsen ved ikke, om de yngler noget Sted i Nærheden.

Dræbt 5 Maaneder efter Mærkning.

641. Mærket 13. Maj 1911 af S. M. S. Skudt 28. November 1911 i Højlandet nær Sterling, ved Firth of Forth, Skotland, af B. F. Watson, Fintry, Skotland. Nærmere Oplysninger foreligger ikke.

Dræbt 6 Maaneder efter Mærkning.

671. Mærket 25. Maj 1911 af S. M. S. Skudt 24. Januar 1912 ved Uxbridge i Middlesex af T. B. Jarris i Uxbridge. Der blev berettet i »The Field« om Tilfældet, og der meddeles, at da Hejren blev skudt, gylpede den op »a trout of nearly 1/2 lb in weight«. Fisken var levende »though it was slightly scored on the back«. Den blev sat i Vand og kom snart til Kræfter igen(!). Der træffes meget almindeligt Hejrer paa Stedet hele Aaret rundt, og de yngler der ogsaa.

Dræbt 8 Maaneder efter Mærkning.

I England og Skotland er omkommet 4 Fugle i Maanederne Oktober, November og Januar. Det er alle unge Fugle.

Nogen Interesse knytter der sig til 641, som er skudt helt oppe ved Firth of Forth; Stedet ligger noget uden for den ellers almindelig anvendte Trækvej.

HEJRER OMKOMMET I FRANKRIG.

682. Mærket 16. Maj 1912 af P. J. Skudt 21. September 1912 af Landmand Marnet ved Ault, c. 15 km Syd for Udmundingen af Somme. Meddelt af Dr. Louis Rousseau, Joinville le Pont, Seine. Stedet, hvor Fuglen blev skudt, er umiddelbart ud til Kanalen, og Lokaliteten er meget sumpet og gennemfuret af Vandløb, som staar i Forbindelse med Somme. Dr. Rousseau beretter: »Om Efteraaret er Hejrerne lidet talrige paa denne Egn. Om Foraaret, særlig i April og Maj, kommer de i stort Antal, oftest 2 og 2 sammen, næsten aldrig et ulige Antal. Deres Fjerdragt er paa denne Aarstid meget smuk. Hejrerne kommer saa igen sidst i Juni og bliver her hele Juli igennem. De yngler her ikke, da her ikke er passende Ynglesteder; det er i Almindelighed unge Hejrer, man ser. De er her ikke om Vinteren; naar det i November og December er Frost, trækker de forbi lige imod Syd, og det er meget sjældent, at de skydes paa denne Aarstid. Hejrerne trækker i Reglen om Natten, og da udstøder de ofte deres Skrig.«

Dræbt 4 Maaneder efter Mærkning.

698. Mærket 16. Maj 1912 af A. J. Skudt 10. Oktober 1912 ved l'Etang de Salces, Nord for Perpignan af Skræder Pino Joseph. Stedet er ganske nær Middelhavskysten. Meddelt af Institutbestyrer A. Lacoste, St. Laurent-de-la-Salanque, Pyrénées Orientales.

Dræbt 5 Maaneder efter Mærkning.

421. Mærket 17. Maj 1910 af G. R. Skudt 4. November 1910 ved Bourbourg (Dpt. du Nord) af Grosserer Mabilie, Saust-Folquin par Sainte-Mariekerque (Pas de Calais). Fuglen blev skudt nær Floden Aa (ikke langt fra Floden Lys) ved Bredden af en lille Dam. Hejrerne træffes meget talrige der navnlig i September og Oktober. Der oplyses intet om Yngleforhold eller Overvintring.

Dræbt omtrent 8 Maaneder efter Mærkning.

652. Mærket 25. Maj 1911 af S. M. S. Skudt 4. Februar 1912

ved Beauvais, Dpt. de l'Oise (omtrent midt imellem Amiens og Paris). Meddelt af Overkirurg La motte, Beauvais. Fuglen blev skudt ved et lille Vandløb, der endnu ikke var tilfrosset, hvad ellers Moser og Enge var paa det Tidspunkt. Fuglene yngler ikke der paa Egnen, og ses i det hele ikke almindeligt. Er absolut sjældnen om Vinteren.

Dræbt 9 Maaneder efter Mærkning.

402. Mærket 16. Maj 1910 af G. R. Fundet død 12. Februar 1911 imellem Landivisiau og Sizun, Finistère, Bretagne. Meddelt af M. Dubris, Landivisiau.

Paa de Spørgeskemaer, som altid blev udsendt til de forskellige Meddelere, spurgtes altid, om Ringen havde beskadiget Foden paa en eller anden Maade. I alle tidligere Tilfælde er dette Spørgsmaal besvaret benægtende; men denne Hejre blev fundet med »Ringbenet« brækket, og den havde aabenbart døjet meget af Sult, da den var fuldstændig afmagret. Selv om Muligheden ikke kan udelukkes i dette enkelte Tilfælde, at Ringen paa en eller anden Maade har bevirket Benbrudet, synes det dog mere sandsynligt, at Fuglen paa anden Maade er beskadiget, og at det tilfældigvis har ramt det Ben, hvorpaa Ringen sad.

Meddeleren beretter, at Hejrer kun sjældent ses der paa Egnen; de yngler der ikke og overvintrer heller ikke.

Omkommet 9 Maaneder efter Mærkning.

808. Mærket 16. Maj 1912 af S. M. S. Fundet død 15. August 1913 paa Strandbredden ved St. Aubin-sur-Mer, Calvados, af M. Rennes, Boul. St. Germain, Paris. Fuglen havde tilsyneladende ikke lidt nogen Overlast, men var ret medtaget af Insekters Angreb.

Omkommet ca. 15 Maaneder efter Mærkning.

626. Mærket 25. Maj 1911 af G. B. Skudt 5. Marts 1913 i St. Morel i Ardennerne og meddelt af Borgmester Remy Cuif. Nærmere Oplysninger haves ikke.

Dræbt omtrent 2 Aar efter Mærkning.

I Frankrig er omkommet 7 Hejrer i Maanederne August, September, Oktober, November, Februar og Marts. De 5 er unge Fugle, og kun 2 er over 1 Aar gamle. De fleste er omkommet i det nordlige og vestlige Frankrig; kun 698 naaede ned til Middelhavskysten. Efter Meddelelsen at dømme synes Hejrerne

ikke at være almindelige Vintergæster, i hvert Fald ikke i det nordlige af Landet.

HEJRER OMKOMMET I SPANIEN.

393. Mærket 16. Maj 1910 af G. R. Skudt 5. August 1910 ved Villanueva del Rey ved Floden Guadiato (en Biflod til Guadalquivir), Provinsen Cordoba, ($38^{\circ} 13' N. Br.$, $5^{\circ} 8' V. L.$). Meddelt af Eoghan K. Carmichael, Málaga. Stedet er højt beliggende i Sierra Morena. Der var 2 Fugle sammen. Hejrer ses ret sjældent der paa Egnen og altid kun i faa Eksemplarer; de yngler der ikke. Man træffer dem kun i August, September og Oktober, men ikke om Vinteren, da Klimaet oppe i Bjergene er meget barskt. I det hele taget skal Lokaliteten ikke være vel egnet for Vadefugle; der findes ikke Sumpe eller Moser, kun store, strømmende Floder med ringe Fiskebestand og uden Vegetation ved Bredderne.

Dræbt mindre end 3 Maaneder efter Mærkning.

830. Mærket 16. Maj 1912 af A. J. Skudt 29. September 1912 ved Floden Guadiana, nær Guareña ($38^{\circ} 52,7' N. Br.$, $6^{\circ} 2' V. L.$) af Postmester Ricardo Guerrero. Stedet var en Mose, som var omgivet af Græsmarker og dyrkede Enge. Der blev set Hejrer i Tiden baade før og efter 29. September; men de ses aldrig talrige, er hyppigst Foraar og Efteraar. Hejrerne menes at komme fra Nord i Oktober Maaned, og igen i Marts drager de mod Nord. De yngler ikke der paa Egnen.

Dræbt 4 Maaneder efter Mærkning.

667. Mærket 16. Maj 1912 af A. J. Skudt 28. September 1912 ved Albufera (S. for Valencia) af Ricardo Santa Elena. Meddelt af Le Marquis de Ezenarro, Valencia. Fuglen blev skudt paa den smalle Tange imellem Middelhavet og Albuferasøen. Hejrer skal paa dette Sted i Egnen omkring Albufera ses i tusindvis; de kommer i September Maaned og bliver hele Vinteren til hen i Marts. De oversommer ikke og yngler saaledes ikke. Meddelelsen fortæller, at de ikke egentlig efterstræbes; kun naar en Hejre tilfældig kommer inden for Skudvidde, skydes der efter den.

Dræbt godt 4 Maaneder efter Mærkning.

683. Mærket 16. Maj 1912 af P. J. Skudt 14. Oktober 1914

ved Arahál, Sydøst for Sevilla af Fernando Soriano, Arahál. Der meddeles, at Hejrer ses hver Vinter i Provinsen Sevilla.

Dræbt omtrent $2\frac{1}{2}$ Aar efter Mærkning.

I Spanien er omkommet 4 Hejrer i Maanederne August, September og Oktober; de 3 er unge Fugle; 683 er skudt omtrent $2\frac{1}{2}$ Aar efter Mærkning. Det synes mærkeligt, at disse Meddelelser fra Spanien alle er fra de tidlige Efteraarsmaaneder og ikke en fra Vintertiden. Interessant er 393, som er skudt mindre end 3 Maaneder efter Mærkningen og i August Maaned, paa hvilken Tid der her i Landet endnu overalt træffes Hejrer. Der berettes fra flere Steder, at Hejrerne overvintrer talrigt i Spanien, ikke mindst synes dette at være Tilfældet ved Middelhavskysten.

HEJRER OMKOMMET I PORTUGAL.

688. Mærket 16. Maj 1912 af G. B. Skudt 20. September 1912 ved Lagôa d'Obidos (ca. 100 km Nord for Lissabon). Meddelt af flere Herrer, bl. a. en Dansk, Axel Malmer i Lissabon. De nærmere Enkeltheder meddeltes af den danske Konsul i Lissabon, G. Pinto Basto, som ogsaa velvilligst har ydet Hjælp i flere andre Tilfælde.

Dræbt godt 4 Maaneder efter Mærkning.

637. Mærket 13. Maj 1911 af G. B. Skudt 7. Oktober 1911 ved Amarante (Nordøst for Oporto) ved Floden Tamega (Biflod til Douro). Meddelt af Wm. C. Tait, Oporto.

Dræbt omtrent 5 Maaneder efter Mærkning.

632. Mærket 13. Maj 1911 af G. B. Skudt 25. December 1911 ved Obidos af Joas Pedro Soares. Meddelt af Wm. C. Tait i Oporto. Obidos ligger omtrent 100 km Nord for Lissabon. (Se ogsaa 688).

Dræbt 7 Maaneder efter Mærkning.

668. Mærket 25. Maj 1911 af S. M. S. Skudt 15. Oktober 1912 ved Benavente (nær Tejo, c. 40 km NØ. for Lissabon) af Henry Bachofen. Terrænet, hvor Fuglen blev dræbt, er lavtliggende Eng, som om Vinteren er fuldstændig oversvømmet, og der opholder sig da Mængder af Vandfugle. Hejrer træffes hele Aaret og yngler der ogsaa; de er dog talrigst om Vinteren. Med-

deleren fortæller, at i Portugal bruges »Fedtet« af Hejrer i medicinsk Øjemed og skal være særlig godt mod Rheumatisme!

Dræbt ca. 16 Maaneder efter Mærkning.

642. Mærket 13. Maj 1911 af S. M. S. Skudt 21. November 1912 ved San Silvestre i Dalen om Mondego Floden nærved Coimbra af Francisco Serrão i San Silvestre. Ifølge Jægerens Meddelelse forekommer Hejrerne ret ofte der paa Egnen, »en halv Snes Stykker ad Gangen«. De træffes fra September til April og yngler ikke paa Egnen.

Dræbt ca. 16 Maaneder efter Mærkning.

I Portugal er omkommet 5 Hejrer i Maanederne September, Oktober, November og December. De 3 er unge Fugle.

Der meddeles, at de overvintrer talrigt i Landet.

HEJRER OMKOMMET FORSKELLIGE STEDER.

653. Mærket 25. Maj 1911 af S. M. S. Skudt 26. Februar 1914 i Algier ved Djidjelli (36° 50' N. Br., 5° 50' Ø. L.) omtrent lige ved Middelhavet. Meddelelsen, Docteur Girard, fortæller, at der træffes Mængder af Hejrer næsten hele Aaret, men flest Foraar og Efteraar. I Juli og August er Egnen ganske udtørret, og saa ses ingen Hejrer. De vides ikke at yngle noget Sted.

Dræbt godt 2¹/₂ Aar efter Mærkning.

409. Mærket 17. Maj 1910 af G. R. Skudt 28. Marts 1919 i Hartl Skoven ved Kismarton, nær Oedenburg i Ungarn (omtrent lige ved den østrigske Grænse, ikke langt fra Wien). Hejrer træffes meget almindeligt i Søer og Moser, navnlig om Foraaret; men de yngler der ikke.

Dræbt omtrent 9 Aar efter Mærkning.

648. Mærket 25. Maj 1911 af S. M. S. Skudt 17. Juli 1911 ved Tomelilla (mellem Ystad og Cimbrishamn) i Skaane af Gustaf Boysen, samme Sted.

Der skal ikke yngle Hejrer i Nærheden af Tomelilla; de ses i Tiden fra Marts til Oktober; der skydes kun faa Fugle, og 658 var alene, da den blev skudt.

Dræbt knapt 2 Maaneder efter Mærkning.

Hejre 653 er bemærkelsesværdig som den eneste »Afrikahejre«, omkommet lige paa den anden Side af Middelhavet. Der skal

overvintre mange Hejrer i Algier, og det maa sikkert antages, at ogsaa flere af de danske Fugle har naaet saa langt bort, uden at der er hørt fra dem.

Hejre 409 kunde antages at have ynglet i Ungarn og tilhørt en Koloni i Nærheden; den er dræbt midt i Yngletiden og tilsyneladende ganske uden for den sædvanlige sydvestlige Trækvej. Det kunde tænkes, at den 9 Aar gammel maaske havde »glemt« sit Fædreland og helt slaaet sig ned et andet Sted.

658, som er skudt i Skaane ikke 2 Maaneder efter Mærkingen, er et godt Bevis paa det tidligere anførte, at de unge Hejrer efter at have forladt Moderkolonien strejfer vidt omkring paa Sommertogt.

Det Skøn, man kan danne sig, efter de her meddelte Resultater, om Hejrerne Træk, synes saaledes at være det, at disse Fugle følger den af de fleste »Ringfugle« benyttede Trækvej i sydvestlig Retning ned om Vesttyskland, Holland, Belgien, England, Frankrig, Spanien og Portugal. De er hyppigst truffet nær Havet eller ved store Floder, hvilket ogsaa er ganske naturligt efter Fuglens Levevis. Maaske en Del flere Oplysninger kunde fremskaffes ved fortsat Ringmærkning af Hejrer, men i det store og hele vil Resultaterne dog sikkert kun bekræfte, hvad vi nu allerede ved. Der er næppe Tvivl om, at der havde foreligget endnu flere Oplysninger om dræbte Hejrer, hvis ikke Verdenskrigen var kommet og havde sat en Stopper for næsten alt internationalt Samkvem. Man vil have lagt Mærke til, at der ikke er indkommet en eneste Meddelelse om dræbte Hejrer i alle Krigsaarene.

SUMMARY.

During the years 1910, 1911 and 1912 186 heron nestlings (*Ardea cinerea*) have been ringed in the heronry in Store Lyngby Skov in North-Sealand, Denmark. Untill 1922 we have got information of 70 killed birds. The informations have come from the following countries: Denmark 29, Germany 12, Holland 6, France 7, England 3, Scotland 1, Spain 4, Portugal 5, Algeria 1, Hungary 1 and Sweden 1. The heron seems to use the usual south-western passage line. Most of them have been

killed as young birds, yet a few of them several years (even 9 years after being ringed). In Denmark they have been killed during nearly all the months, even in winter time; a few have been killed as breeding birds either in the heronry in Store Lyngby Skov or just near it several years after the ringing. Many have been killed very early in the fall far away from the breeding place as no. 393 in Spain not three months after having left the nest. The herons seem to winter scattered over the western Europe; most often they are found in the moor districts near the ocean or at rivers (very numerous at Elben and at the rivers in Spain and Portugal). One has been killed in the mountains in Spain.

IAGTTAGELSER OVER HØGESANGEREN, *SYLVIA NISORIA* OG TORNSKADEN, *LANIUS COLLYRIO*, PAA YNGLEPLADS.

AF

AXEL KOEFOED.

I Pinsen 1922 tilbragte jeg tre Dage i Gilleleje og fik der Lejlighed til at anstille følgende Iagttagelser angaaende Høgesangeren.

Den 3. Juni om Morgenen kom jeg, hvor jeg boede, ned i Haven, og hørte da Høgesangerens for mig velbekendte Sang; lidt efter saa jeg Fuglen, der sad i Toppen af et Grantræ. Da jeg nærmede mig Stedet, saa jeg ganske tydeligt dens vatrede Bryst; bange var den ikke, skønt jeg kom den ganske nær; sky er Fuglen altsaa ikke i Yngletiden, hvad jeg ogsaa ved flere Lejligheder har iagttaget, men det er en meget urolig Fugl, der stadig er i Bevægelse. Den fløj fra Gren til Gren lige i min Nærhed søgende efter Føde og stadig syngende, det sidste dog mest naar den tog Plads i Toppen af et eller andet Træ. Høgesangeren's Sang minder en Del om Havesangeren's (*Sylvia hortensis*), men er kraftigere; dens ejendommeligt snerrende Varselskrig lød, naar en eller anden Fugl nærmede sig et bestemt Sted i Haven, hvor dens Rede senere viste sig at være, eller den