

lidet de angivne Skelnemærker ere til at lide paa for svenske Sædgæs's Vedkommende.

Det vil efter det foreliggende ikke være let at afgøre, om Sushkins Gaas bør opfattes som en Art eller en Race; i sidste Tilfælde synes det at ligge nærmest at opfatte den som hørende til Sædgæssene; indtil nu er det foreliggende Stof utilstrækkeligt til at dømme om Sagen. Men det staar fast, at denne Form, Art eller Race, har vist sig her i Danmark.

---

## BARTRAMS KLIRE, *BARTRAMIA LONGICAUDA* (BECHST.)

NY FOR DANMARK

AF

E. LEHN SCHIØLER

Den 5te November 1920 fandtes en Bartrams Klire mellem nogle Bekkasiner og Brokfugle hos en Vildthandler her i Byen. Den var indsendt fra Vestjylland, fra Tim, hvor den var skuddt et Par Dage i Forvejen. Den var meget forskuddt men ganske frisk, saa at Benenes gule Farve var tydeligt fremtrædende, og Kønsbestemmelsen kunde lettelig foretages; det var en ung Hun med tynd og ret Ægleder.

Arten er tilforn truffen i Europa, et Par Gange i Italien og paa Malta, desuden 11 Gange i England (siden 1851), i næsten alle Tilfælde sent om Efteraaret ligesom her.

Dens Hjem er i Amerika, hvor den yngler fra det nordvestlige Alaska »southern Mackenzie, central Keewatin, central Wisconsin, southern Michigan, southern Ontario, and southern Maine to southern Oregon, northern Utah, central Oklahoma, southern Missouri, southern Indiana, and northern Virginia; winters on the pampas of South America to Argentina; in migration occurs north to Newfoundland and in Europe; accidental in Australia«. (Check-List of North American Birds. Third Ed. New York 1910).

Arten staar Klirerne nær; ved sin lange Hale minder den om Mudderkliren og dennes amerikanske Slægtning *A. macularia*

(L.); den kan kendes paa de tydelige Tværstriber, der findes paa Svingfjerenes (særlig 1stes) Inderfaner. Dens Skelet minder meget om Klirernes, særlig er Brystbenet temmelig ligt den grønbenede Klires; Dragten ligner en Del de unge Brushøns's.

Det er første Gang, Bartrams Kliren har vist sig i Danmark.

## MÆRKEDE MAAGER

FORELØBIG MEDDELELSE AF H. CHR. C. MORTENSEN

Da jeg sandsynligvis i nogen Tid ikke vil faa Lejlighed til at beskæftige mig med Arkivet til min Maagemærkning, skønt jeg i adskillige Aar har skyldt flere Herrer Regnskab for Resultaterne af den, da de nemlig velvilligst havde tilbudt deres Hjælp og arbejdet for mig, skriver jeg foreløbig disse Linier.

Ringsætningerne er foretaget i Aarene 1910—1914 inkl., hovedsagelig af Direktør Rubow, Overlæge Helms, Adjunkt Ferdinand, samt daværende Stud. med. Saxtorph og Lærer Tåning.

Egholm ligger ud for Skjelskør, Enø ud for Susaaens Udlob, Halvøen Tipperne skyder sig Nord paa i den sydligste Ende af Ringkjøbing Fjord, og Vilsted Sø findes oppe ad Løgstør til.

Fuglenes Findesteder er paa de tre Lister angivet omtrentligt; bag ved hvert af dem er i Parentes sat et Tal, der nogenlunde angiver Maagens Alder, udtrykt i Maaneder, da den blev fundet. Den var ikke udvokset, da den blev mærket.

### HAVMAAGE (*Larus argentatus*).

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Egholm—Agersø Sund (2).                         | d. Egholm—Kolding (8). |
| b. » —Skjelskør (98 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ). | e. » —Assens (5).      |
| c. » —Korsør (3).                                  | f. » —Slien (8).       |

### STORMMAAGE (*Larus canus*).

- |   |  |
|---|--|
| 1. Enø—Næstved (2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ).  | 14. Egholm—Zuidersøen (4).                   |
| 2. Egholm—Kjøge (4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ). | 15. » — — (31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ). |
| 3. » —Ringsted (4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ).  | 16. » —Vestflanderns Kyst                    |
| 4. » —Korsør (2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ).    | (3).   |