

## OM NOGLE FOR GRØNLANDS ØST- OG VESTKYST NYE OG SJÆLDNE ARTER.

AF

O. HELMS OG E. LEHN SCHIØLER.

ØSTKYSTEN (O. HELMS).

Fra Grønlands Østkyst har Kolonibestyrer Johan Petersen, der efter et ca. tyveaarigt Ophold i Angmagsalik vendte hjem i 1915, medbragt forskellige Fugleskind, hvoriblandt adskillige af Arter, der er sjældnere i Grønland, for en eller to's Vedkommende overhovedet ikke trufne før.

Krikand (*Anas crecca* L.). Tidligere er af Kolonibestyrer Petersen nedsendt 4 Skind, der nu er forøget med et femte, af en ung Fugl, skudt 20 Oktober 1914. Antagelig er alle Skindene af den typiske europæiske Race; men da kun Hannen i Pragtdragt, derimod ikke Hunnen og de unge Fugle, adskiller sig fra den amerikanske Race, som er truffet paa Grønlands Vestkyst, er det ikke muligt at afgøre med Sikkerhed, hvilken af Racerne det drejer sig om. — Artens nærmeste Yngleplads er Island, hvor den er almindlig.

Spidsand (*Anas acuta* L.). Fra Østgrønland var Arten, der adskillige Gange er skudt paa Vestkysten, ikke tidligere kendt. Kolonibest. Petersen hjembragte Skindet af en Hun, skudt 13 Maj 1913 ved Sermilik. — Fuglen er antagelig kommen fra Island, hvor Arten yngler almindeligt.

Engsnarre (*Crex pratensis* Bechst.). I Vestgrønland har Arten vist sig nogle Gange, og fra Østkysten har Kolonibest. Petersen tidligere hjemsendt et Skind; der foreligger nu et Skind til af en Fugl, der blev skudt 25 Oktober 1912 ved Stationen Angmagsalik — vistnok en ung Fugl. — Artens nærmeste Ynglepladser er Norge og Storbritanien.

Blishøne (*Fulica atra* L. *typica*). Arten var hidtil ukendt for Østgrønland, medens den enkelte Gange er truffet paa Vestkysten, hvor ogsaa den nærstaaende amerikanske Art eller Race er truffet. Skindet af en gammel Fugl af den typiske europæiske Race blev hjemsendt; Fuglen blev 5 Maj 1914 bragt til Kolonibest. Petersen af en Grønlænder, som et Par Dage iforvejen havde taget den paa Isen, hvor en Ravn gjorde Jagt paa

den. Den var meget mager og havde i Maven kun nogle Smaasten. — Det er en ret lang Rejse, denne daarlige Flyver har gjort for at naa til Østgrønland. Dens nærmeste Yngleplads er de britiske Øer; paa Island træffes den af og til, men yngler ikke.

Storspove (*Numenius arquatus* L.). Medens den lille Spove ret almindelig træffes i Grønland baade paa Vestkysten og særlig paa Østkysten, hvor den i Foraarstiden ses hyppig, var Storspoven hidtil ikke truffet i Grønland; 23 August 1913 skriver Kolonibest. Petersen i sin Dagbog: »Idag skød en af Præstens Sønner en Regnspove her i Nærheden af Husene, den var saa mager, saa jeg tror næppe, den havde levet mange Dage til, hvis den skulde have fortsat sin Tilværelse her i vore Omgivelser. Det hjembragte Skind viste sig at være af en ung Han fra samme Aar. — Artens nærmeste Ynglepladser er Storbritanien og Norge; paa Island træffes den kun sjældent.

Dobbelt Bekkasin, Hørsegøg (*Gallinago scolopacina* Bonap. *typica*). Kolonibest. Petersen har tidligere hjemsendt 3 Skind af denne Art; 2 nye er nu komne til, det ene af en Fugl, skudt 30 April 1913 mellem Stationens Huse; den var meget lidt sky og forholdsvis velnæret; det andet fik P. 15 Maj s. Aar fra Norajik i Angmagsalikfjorden. Fuglen var funden død der i Nærheden et Par Dage iforvejen. — Antagelig stammer begge Fuglene fra Island, hvor Arten er en hyppig Ynglefugl.

Dværgfalk (*Falco aesalon* Tunst.). Om Dværgfalk i Grønland havde man hidtil kun Meddelelsen om det Eksempel, som blev skudt 3 Maj 1875 ved Kap Farvel og af Wiepken sendt til Kumlien; men om Fuglen var skudt i selve Grønland eller paa Havet vidstes ikke. Den første sikre Dværgfalk fra Grønland foreligger nu, idet Kolonibest. Petersen har hjembragt et Skind, hvorom det i hans Dagbog for 8 Juli 1915 hedder: »Jeg modtog fra Angmagsætpladsen i Dagens Løb en Dværgfalk, som var skudt der for nogle Dage siden, antagelig 2 eller 3 Juli«. — Fuglen var et Aar gammel, i de unge Fugles graabrune Dragt; men mellem de stærkt slidte Fjer stak hist og her frem nogle nye, graablaa Fjer, visende, at Fuglen var en ung Han i Færd med at antage den gamle Fugls Fjerklædning. — Dværgfalken yngler ret almindelig paa Island, saa dens Forekomst paa Grønlands Østkyst kan ikke forundre.

Vandrefalk (*Falco peregrinus* Tunst. *typicus*). Medens Arten

yingler ret hyppig paa Vestkysten, er den tidligere kun truffet et Par Gange paa Østkysten; 11 Juni 1911 skriver Kolonibest. Petersen: »Modtog idag fra Angmagsætpladsen en Vandrefalk, som et Par Dage iforvejen var skudt i Tasiusak, N. for selve Angmagsætpladsen, hvor der i flere Aar skal have været en Rugeplads for den. Hunnen til den, jeg modtog, som ligeledes var bleven skudt, var desværre gaaet tabt«. Det hjembragte Eksemplar var en gammel Han; vistnok af den europæiske Race.

VESTKYSTEN. (E. LEHN SCHIØLER).

Bjærgand (*Fuligula marila affinis* Eyt.). Fra Sukkertoppen har Kolonibestyrer Langskov sendt en Bjærgand af Artens lille Race *affinis*; det er en ung Han skudt (vistnok) i Februar 1917. Paa Ryg og Kropsiden ses frembrydende Fjer af første Pragtdragt, saa grovvatrede, at Race-Bestemmelsen jfr. D. O. F. T. 6 Aarg. S. 69—71 ikke volder nogen Vanskelighed; Vingen maaler 205 mm, Næbbet (maalt fra Fjergrensens paa Panden) 39 mm.

Enkelte Gange tilforn har Racen *affinis* vist sig paa Vestkysten jfr. H. Winge: Grønlands Fugle, S. 83.

Fløjlsand (*Oidemia fusca* L. *typica*). Fra Fiskenäset nedsendtes i Sommeren 1916 blandt en Del saltede Fugle en ung Fløjlsand, skudt — vistnok — i Januar eller Februar Maaned samme Aar; den var i ren Ungfugledragt, Kropskellettet og Hovedet i Alkohol findes i min Samling; Fuglen er af Artens europæiske Form.

Storspove (*Numenius arquatus* L.). Ogsaa Vestkysten har haft sit Besøg af Storspoven, jfr. foranstaaende Meddelelse fra Østkysten, idet Hr. Langskov har sendt en Storspove, skudt 16 Novbr. 1915 ved Nanortalik i Julianehaab Distrikt.

Amerikansk Blishøne (*Fulica americana* Gmel.). Fra Sydprøven har Hr. Langskov sendt en Han af den amerikanske Blishøne; »den kom flyvende 5 Novbr. 1915 og faldt ned i Stranden, hvor den fandtes død«.

Har vist sig to Gange paa Vestkysten af Grønland, skriver H. Winge l. c. S. 147.

Vibe (*Vanellus cristatus* Meyer). Fra Nanortalik modtoges i 1916 to Viber, skudte 16 og 17 Novbr. 1915, vist Hun og Han, og fra Sukkertoppen en Han i 1917, skudt 29 Januar samme

Aar. Desuden modtaget 2 Viber fra Bogtrykker Møller i Godthaab, begge ♀, skudte 29 og 30 Januar 1917.

Vibens Besøg i Grønland synes at blive hyppigere.

Kilehalet Maage (*Larus roseus* Macgill). Modtaget gennem Dr. Krabbe fra Bogtrykker Møller et udfarvet Eksempel, skudt 12 Maj 1917 ved Godthaab omtrent midt paa Fjorden udfor Kolonien.

Hættemaage (*Larus ridibundus* L.). Fra Fiskenaeset nedsendtes i Aar en Hættemaage, skudt 29 Januar; ogsaa Krop-skelettet medfulgte. Fuglen er smukt udfarvet i Vinterdragt og mærket Hun.

Hættemaagen har ikke tilforn været truffet i Grønland.

Vindrossel (*Turdus iliacus* L.). En gammel Hun skudt 9 Januar og en ung Han skudt 29 Februar 1916, begge ved Julianehaab, har Hr. Langskov hjemsendt. Artens nærmeste Yngleplads er jo Island, hvorfra rimeligvis de to Stykker stamme.

Vindroslen er et Par Gange set paa Grønlands Vestkyst, skriver H. Winge l. c. S. 283.

Solsort (*Turdus merula* L.). En Solsort fra Sydprøven har Hr. Langskov sendt; det er en ung Fugl i første voksne Dragt, sort med svagt graabrune Kanter paa mange af Fjerene; Næbbet endnu ikke gult.

Det er første Gang, Solsorten nævnes fra Grønland.