

## FUGLELIVET PAA AVEDØRE HOLME VED KØBENHAVN.

AF

H. PEDERSEN.

Da jeg i godt 4 Aar, nemlig i Tiden fra Efteraaret 1910 til Udgangen af 1914, hver Uge har besøgt Avedøre Holme, der ligger ca. 5 km fra Hovedstaden og er omtrent 140 ha store, har jeg haft god Lejlighed til ved alle Aarstider at iagttage Fuglelivet der, og mulig kan denne Fortegnelse have Interesse for »D. o. F.«s Medlemmer.

De mange gunstige Forhold, der er paa Holmene, har bevirket, at et meget stort Antal af mange forskellige Arter Fugle er repræsenteret der, saaledes at jeg har kunnet notere 121 Arter.

Naar man fra Avedørefortet gaar ud til Holmene, kommer man lige udenfor dette til et bredt Bælte af Brakvand, tildels overgroet af Græs og Rør. Paa den anden Side af dette Bælte findes talrige Vandhuller, store Græsmarker, flere Sandbanker og Mosedrag, der tilligemed den flade Strand, der omgiver Holmene ud til Kallebodstrand, afgiver særlig gode Betingelser for en Fuglefaunas Trivsel der. Tæt ved Holmene findes 2 store Tjørnehække, ved Fæstningsgravene og paa Voldene en Del Buske og høje Træer, som giver saavel Opholdssted som Redeplads for en hel Del Smaafugle. Desuden maa der ikke skydes paa Holmene fra 1 April til 16 Juli. Af de der græssende Kreaturer ødelægges selvfølgelig en Del Reder, men da Terrainet er stort, og der findes mange forskellige Skjulesteder, er Yngelen der alligevel ganske antagelig. Af nedenstaaende 121 Arter er 27 ynglende.

Krikand (*Anas crecca*). Almindelig paa For- og Efteraarstræk. Atling (*Anas querquedula*). Et eller muligvis to Par yngler der hvert Aar. Er ret almindelig om Eftersommeren.

Pibeand (*Anas penelope*). Ret almindelig paa Efteraarstræk.

Spidsand (*Anas acuta*). Ses mest om Foraaret, et Par ynglede der i Sommeren 1913 og 1914; efter Sigende skal der tidligere have ynglet flere.

Stokand (*Anas boscas*). Almindelig hele Aaret, nogle Par ynglende.

Skeand (*Anas clypeata*). Ses af og til udenfor Yngletiden næsten altid parvis, mest om Foraaret.

Gravand (*Tadorna cornuta*). Ret hyppig paa Stranden om Foraaret og hele Sommeren.

Sangsvane (*Cygnus musicus*). Ret hyppig hele Vinteren, i mindre Flokke fra 3 til 10 Stkr., siddende paa Isen eller i Vaager.

Taffeland (*Fuligula ferina*). Hyppig hele Vinteren, i Flokke sammen med andre Dykænder.

Havlit (*Pagonetta glacialis*). Færdes undertiden i meget store Flokke paa Kallebodstrand; syge eller anskudte Eksemplarer søger ind til Land og fanges eller skydes der.

Fløjelsand (*Oedemia fusca*). Færdes ligeledes om Vinteren i Flokke og flyver da undertiden ind over Land.

Ederfugl (*Somateria mollissima*). Ligeledes.

Toppet Skallesluger (*Mergus serrator*). Ret hyppig, færdes mest parvis.

Sædgaas (*Anser segetum*). Ses paa Træk i Flokke.

Knortegaas (*Anser torquatus*). Kommer hvert Aar paa Træk, undertiden kaster mindre Flokke sig paa Holmene og søger Næring.

Agerhøne (*Perdix cinerea*). Temmelig hyppig, yngler paa de tilstødende Marker.

Plettet Rørhøne (*Porzana maruetta*). Træffes faatallig hvert Efteraar.

Vandrikse (*Rallus aquaticus*). Enkelte Par yngler der hvert Aar.

Grønbenet Rørhøne (*Gallinula chloropus*). Temmelig hyppig som ynglende, Reden findes stadig i de høje Rør, og hvor Vandet kun er lidt salt.

Blishøne (*Fulica atra*). Yngler i stort Antal, kommer meget tidlig om Foraaret.

Vibe (*Vanellus cristatus*). Yngler meget hyppig og paa alle Lokaliteter, færdes undertiden i store Flokke til Slutningen af November.

Strandbrokfugl (*Charadrius squatarola*). Ret hyppig, flyver ikke sjelden i Flok sammen med Rylere og andre Smaaavadere.

Højle (*Charadrius pluvialis*). Ligeledes.

Præstekrave (*Ægialitis hiaticula*). Meget hyppig som ynglende; Reden findes fornemlig, hvor der er bare Pletter paa Græsmarken. Er set i Februar Maaned paa Isen.

Hvidbrystet Præstekrave (*Ægialitis cantiana*). Nogle enkelte Par yngler der hvert Aar, i 1914 flere end sædvanlig, vistnok 7 Par.

Strandskade (*Hæmatopus ostreologus*). Ret hyppig baade For- og Efteraar, færdes i Reglen i mindre Flokke.

Lille Regnspove (*Numenius phæopus*). Træffes i Reglen hvert Efteraar.

Stor Regnspove (*Numenius arquatus*). Almindelig baade For- og Efteraar, optræder undertiden i store Flokke.

Kobbersnepe (*Limosa lapponica*). Faatallig paa Træk.

Mudderklire (*Actitis hypoleuca*). Almindelig om Efteraaret, Hovedparten dog unge Fugle.

Tinksmed (*Totanus glareola*). Ligeledes.

Svaleklire (*Totanus ochropus*). Ligeledes, dog færre i Antal end de to foregaaende Arter.

Rødben (*Totanus calidris*). Almindelig som ynglende; Reden findes i Reglen godt gemt i store Græstotter.

Sortklire (*Totanus fuscus*). Temmelig sjælden, er kun truffet om Efteraaret.

Hvidklire (*Totanus glottis*). Almindelig om Efteraaret.

Brushane (*Machetes pugnax*). Paa Holmene yngler ca. 10 Par.

Klyde (*Recurvirostra avocetta*). Et Par har ynglet der i flere Aar, men i Yngletiden 1913 blev Hunnen skudt af en Pramjæger i Kallebodstrand. I 1914 har ingen Klyder vist sig paa Holmene, og maa denne ejendommelige Fugl vel dermed betragtes som udryddet.

Dværgryle (*Tringa minuta*). Almindelig hvert Efteraar, undertiden i temmelig store Flokke. Ses undertiden ogsaa om Foraaret.

Temmincks Ryle (*Tringa temminckii*). I Efteraaret 1911 saas 2, 18 August 1912 saas en Flok paa 11, 14 August 1913 saas en Flok paa 6; den kendes let fra Dværgrylen ved sit spæde Trillefløjt.

Sortgraa Ryle (*Tringa maritima*). Nogle ganske enkelte træffes i Reglen hvert Efteraar.

Islandsk Ryle (*Tringa canutus*). Ligeledes.

Alm. Ryle (*Tringa alpina*). Almindelig som ynglende.

Krumnæbbet Ryle (*Tringa subarquata*). Træffes først paa Efteraaret i temmelig stort Antal.

Brednæbbet Kærløber (*Limicola pygmæa*). Faatallig paa

Træk. Den 30 August 1910 saas 2, 13 August 1911 saas ligeledes 2, de holdt sig stadig sammen og var meget tillidsfulde.

Odinshane (*Phalaropus hyperboreus*). Den 3 September 1911 saas en Odinshane, som fløj langs med Stranden i Flok sammen med *Tringa alpina* og *Tr. subarquata*; den 25 August 1912 saas 1, som ganske alene svømmede i et Vandhul paa Holmene ca. 500 m fra Stranden.

Enkelt Bekkasin (*Limnocyptes gallinula*). Almindelig om Efteraaret og først paa Vinteren.

Dobbelt Bekkasin (*Gallinago scolopacina*). Almindelig For- og Efteraar.

Hættemaage (*Larus ridibundus*). Søger Føde langs Stranden.

Stormmaage (*Larus canus*). Ligeledes.

Havmaage (*Larus argentatus*). Ligeledes, dog i mindre Antal.

Svartbag (*Larus marinus*). Ligeledes, betydelig færre og mest unge Fugle.

Tretaaet Maage (*Larus tridactylus*). Sjælden Gæst. En ung Fugl blev truffet 8 December 1911.

Dværgterne (*Sterna minuta*). Ret almindelig. De gamle flyver langs Stranden sammen med de fuldvoksne Unger og søger Føde.

Almindelig Terne (*Sterna hirundo*). Ret almindelig.

Sortterne (*Sterna nigra*). Kommer af og til i enkelte Ekspl.

Grylletejste (*Cepphus grylle*). Undertiden ret almindelig i Kalleboderne og flyver derfra over Holmene.

Lomvie (*Uria troile*). Fundet et Skelet, sandsynligvis Resterne af et Rovfuglemaaltid; af Næb og Fødder kunde det tydelig ses, at det var denne Fugl. Opholder sig i Mængde hver Vinter i Kalleboderne.

Alk (*Alca torda*). Færdes om Vinteren overalt i Kalleboderne og ved Kysten i større og mindre Flokke.

Hejre (*Ardea cinerea*). Furagerer paa Kysten og i Moserne hele Aaret undtagen om Vinteren.

Stork (*Ciconia alba*). En sjælden Gæst paa Avedøre Holme, kun set 2 Gange, den ene Gang fløj den ind over, den anden Gang bærede den Holmene med sin notable Visit og spiste et Par Frøer.

Taarnfalk (*Falco tinnunculus*). Meget almindelig.

Dvergfalk (*Falco aesalon*). Ses ret ofte hastende ind over Markerne.

Vandrefalk (*Falco peregrinus*). Træffes kun sjældent. ♂ blev skudt 5 September 1912.

Musevaage (*Buteo vulgaris*). Ret almindelig.

Vinter-Musevaage (*Buteo lagopus*). Ikke sjælden først paa Vinteren.

Hvepsevaage (*Pernis apivorus*). Ret almindelig om Efteraaret.

Blaa Kærhøg (*Circus cyaneus*). En ung Fugl holdt til der en 14 Dages Tid i Marts Maaned 1913, men den er ikke set der før eller senere.

Spurvehøg (*Accipiter nisus*). Træffes paa alle Tider af Aaret, dog særlig om Efteraaret.

Moseugle (*Otus brachyotus*). Almindelig paa Efteraarstræk. I Oktober 1911 fandtes saavel paa Holmene som paa de tilstødende Marker store Mængder af Moseugler; da der dette Aar var umaadelige Masser af Markmus, var der rigelig Næring til dem.

Ringdue (*Columba palumbus*). Ses af og til flyvende paa sine Vandringer til eller fra Kongelunden, som ligger lige over for.

Natravn (*Caprimulgus europæus*). Enkelte træffes hvert Efteraar og om Eftersommeren.

Mursvale (*Cypselus apus*). Meget almindelig paa Efteraarstræk.

Gøg (*Cuculus canorus*). Ret almindelig særlig i Parringstiden.

Stor Flagspet (*Dendrocopus major*). Er truffet der en Gang (16 Juli 1912), men da der ingen gamle eller hule Træer findes, maa det vel nærmest betragtes som en Tilfældighed.

Skade (*Pica caudata*). Træffes ikke sjældent ved Avedørefortet.

Allike (*Corvus monedula*). Trækker undertiden ind over Holmene uden at tage Ophold, da der ikke findes Betingelser for den der.

Raage (*Corvus frugilegus*). Ligeledes.

Krage (*Corvus cornix*). Enkelte træffes hele Aaret. Om Efteraaret færdes de i store Flokke paa Stranden for at søge Føde.

Sortkrage (*Corvus corone*). To af denne Varietet blev set 5 Oktober 1911, den ene (♂ ad) blev skudt og udstoppet.

Tornskade (*Lanius collyrio*). Et Par yngler hvert Aar i en Tjørnehæk.

Stor Tornskade (*Lanius excubitor typicus*). Enkelte besøger Fortet og Hækkene hver Vinter.

Silkehale (*Ampelis garrula*). Ved det store Træk i Efter-

aaret 1913 saas mange større og mindre Flokke af denne Fugl i Hækkene.

Digesvale (*Hirundo riparia*). Flere Par yngler tæt ved Stranden i et Par Sandbrinker, hvoraf den ene kun er  $\frac{1}{2}$  m høj; om Efteraaret flyver den ved Stranden i umaadelige Skarer sammen med Forstuesvalen.

Forstuesvale (*Hirundo rustica*). 2 à 3 Par har hvert Aar ynglet i et stort Bræddeskur, et Par ynglede i 1912 i et lille Skur, ca. 3 m<sup>2</sup> stort, og saa lavt, at en voksen Mand kunde staa paa Jorden og se i Reden; flyver om Efteraaret langs Stranden i utallig Mængde sammen med den foregaaende Art.

Lærke (*Alda arvensis*). Dens Reder træffes i Mængde paa Græsmarken. Paa Foraarsstræk er den bemærket først i Februar Maaned.

Bjerglærke (*Alda alpestris*). En enkelt set ved Stranden 26 December 1911.

Stær (*Sturnus vulgaris*). En Del opholder sig der om For-aaret, og senere store Flokke af Gamle og nylig udføjne Unger.

Gærdesmutte (*Troglodytes parvulus*). Opholder sig hver Vinter i Tjørnehækkene og de smaa Buske ved Fæstningsgraven.

Jernspurv (*Accentor modularis*). Enkelte overvintrende, holder undertiden til mellem Tjørnehækkene.

Musvit (*Parus major*). Almindelig hele Vinteren i Hækkene.

Blaamejse (*Parus coeruleus*). Ligeledes.

Tornsanger (*Sylvia cinerea*). Almindelig om Eftersommeren i Hækkene.

Gærdesanger (*Sylvia curruca*). Ligeledes.

Havesanger (*Sylvia hortensis*). Ligeledes.

Rørsanger (*Acrocephalus arundinaceus*). Ret almindelig som ynglende i de høje Rør.

Sivsanger (*Acrocephalus phragmitis*). Enkelte Par ynglende i Nærheden af Rørene.

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*). Træffes om Efteraaret i Hækkene. Paa Efteraarstrækket 1914 saas en Del paa Indhegningerne imellem de forskellige Holme.

Fuglekonge (*Regulus cristatus*). Ret almindelig i Hækkene om Efteraaret og henad Vinteren.

Engpiber (*Anthus pratensis*). Almindelig som ynglende, dens Rede findes overalt paa Græsmarken.

Skærpiber (*Anthus obscurus*). Enkelte træffes hvert Aar ved Stranden i September og Oktober Maaned.

Gul Vipstjert (*Motacilla flava*). Almindelig som ynglende, opholder sig der til meget sent paa Efteraaret.

Hvid Vipstjert (*Motacilla alba*). Ikke sjælden Foraar og Efteraar.

Sjagger (*Turdus pilaris*). Kommer ved indtrædende Kulde og Sne, undertiden i store Skarer, og renser da Hækkene for Bær, træffes ogsaa ved Stranden, hvor den søger Næring i den opskyllede Tang.

Solsort (*Turdus merula*). Almindelig som ynglende og træffes hele Aaret.

Stenpikker (*Saxicola oenanthe*). Almindelig om Efteraaret.

Bynkefugl (*Praticola rubetra*). Almindelig som ynglende.

Rødstjert (*Ruticilla phoenicura*). Ikke sjælden paa Efteraarstræk.

Rødkjælk (*Erithacus rubecula*). Almindelig i Hækkene hele Aaret undtagen i Yngletiden.

Graa Fluesnapper (*Muscicapa grisola*). Træffes om Efteraaret ved Fæstningsgraven, dog kun i ringe Antal.

Graaspurv (*Passer domesticus*). Yngler i en stor Tjørnehæk; et Par ynglede i 1911 under Taget paa et stort Bræddeskur.

Skovspurv (*Passer montanus*). Træffes i store Flokke paa Markerne.

Bogfinke (*Fringilla coelebs*). Enkelte træffes ved Hækkene og ved Fortet, særlig om Vinteren.

Kvæker (*Fringilla montifringilla*). I Februar 1912 opholdt en Del sig i Haverne og ved det yderste Fort.

Stillits (*Carduelis elegans*). Udenfor Yngletiden træffes den i temmelig stort Antal paa Græsmarken, særlig afsøgende de store Tidsler.

Svenske (*Ligurinus chloris*). Ses den meste Tid af Aaret, om Efteraaret og Vinteren undertiden i store Flokke, hvor de ved Stranden søger Føde i den opskyllede Tang.

Irisk (*Cannabina linota*). Almindelig som ynglende og træffes overalt.

Bjergirisk (*Cannabina flavirostris*). Meget almindelig hele Vinteren, optræder i større eller mindre Flokke overalt.

Graasisken (*Cannabina linaria*). Var ikke bemærket før 16 November 1913, da en lille Flok havde slaet sig ned i Hækken,

iblandt disse fandtes en omtrent hvid Fugl. Ved Udgangen af November 1914 var endnu ingen bemærket denne Vinter.

Rørspurv (*Emberiza schoeniclus*). Almindelig som ynglende. En Del ses i Rørene hele Vinteren, selv om denne er nok saa barsk.

Gulspurv (*Emberiza citrinella*). Yngler flere Steder ved Buskene og ses og høres hele Aaret.

Bomlærke (*Emberiza miliaria*). Træffes faatallig paa de tørreste Steder og ved Vejen.

Snespurv (*Emberiza nivalis*). Almindelig om Vinteren og træffes i Reglen i store Flokke overalt, dog mest i Nærheden af Stranden.

## EN VILDANDEPARK.

AF

F. MOURIER-PETERSEN.

Udenfor mine Vinduer her i Haven har jeg en lille Dam, der sammen med nogle Thujabusketter er indhegnet med Traadnet. Dammen blev gravet for 6 à 7 Aar siden, da vi havde en ret langvarig og streng Frostperiode. Graaænderne (*Anas boscas*) led paa det Tidspunkt meget. De tyede til Gaarden fra Stranden, der var tillagt i lang Tid, og søgte Mødding og Stakkeplads. Ænderne blev under en Snestorm saa matte, at Beboerne her omkring fangede en Mængde. Selv fangede jeg ogsaa en Snes Par, som blev anbragte i Svinehuset, hvor de straks gav sig til at æde Havre. Da Tøvejret omsider indtraf, slap jeg de fleste ud, men beholdt en 4 à 5 Par, som blev stækkede og sat ud i Dammen. Fra Svenstrup købte jeg 3 Par fra Anderiet der. Resultatet blev godt, jeg fik over 50 Ællinger. Siden den Tid har jeg haft en Bestand af ca. 150 Graaænder her i Haven til uhyre Fornøjelse. Om Foraaret ruge de ude i Skoven og Hegnene, men adskillige Par blive i Indhegningen, og andre møde med Ællingerne og blive lukkede ind. Naar Ællingerne er udvoksede, begynde de straks at trække hver Aften, og senere paa Efteraaret gaa de hver Aften i Stranden og komme saa igen om Morgenen. Stranden her ved Gaarden er Aunøfjord, som meget hurtigt bliver tillagt, og da her ingen rindende Vand er paa Eg-