

MEDDELELSER FRA DE DANSKE ORNITHOLOGISKE STATIONER FOR 1911.

VED

A. HAGERUP.

Meddelelserne fra 1911 er ordnede som dem fra 1910; dog er der medtaget noget mere Stof, som ikke vedrører Trækket; mange vil maaske mene at en Del uden Skade kunde have været udeladt.

Som bekendt har man i en Del Aar i Ungarn søgt at belyse Trækproblemet ved at sammenholde Fuglenes Ankomst om Foraaret med Vejrforholdene. I andre Lande har man fulgt Ungarns Eksempel, og jeg har i nærværende Beretning efter den ungarske Methode for hver Art og Aar (1910 og 1911), hvor der paa mindst 4 Steder var noteret Ankomstdag, beregnet Gennemsnitsdagen for Artens Ankomst om Foraaret, idet jeg skønsmaessigt har udeladt af Beregningen de meget tidlige Dage, der tydede paa Overvintring og de øjensynligt altfor sent noterede Ankomstdage. Ved de paagældende Arter er der i Slutningen angivet først Aarstal, dernæst (i Parenthes) Antal Ankomstdage og sluttelig Gennemsnitsdagen, samt (i Parenthes) tidligste og seneste Ankomstdag.

Ved Stoffets Bearbejdelse har jeg haft en værdifuld Hjælp af Hr. stud. mag. P. Jespersen.

Den vedføjede Vejrberetning fra Nakkebøllefjord skyldes Overlæge O. Helms' Velvillie.

Der er indkommet Skemaer fra:

Thisted ved Konservator Evald Hansen.

Aalborg ved Oberstløjtnant H. A. Hilarius-Kalkau.

Bjerringbro (Viborg) ved Dr. J. Rossen.

Randers ved Bestyrer M. Klinge.

Vedelslund (Aarhus) ved Forstkandidat F. D. Monrad.

Bølling Sø (Silkeborg) ved Forpagter R. Christiani.

Silkeborg ved Skovfoged C. D. Seeger, Naaege.

Kolding ved Arkitekt A. Hagerup.

Nakkebøllefjord (Faaborg) ved Overlæge O. Helms.

Kerteminde ved Kunstmaler Johs. Larsen.

Tranekjær (Langeland) ved Fabricius.

Korsør ved Cand. phil. E. Rendtorff.
 Hillerød ved Gymnasiast Sylv. Saxtorph.
 København og Omegn ved Portner N. Christiansen og
 Docent R. H. Stamm.
 København Ø. (Østre Anlæg) ved Professor, Dr. med. A.
 Fløystrup.
 Storehedinge ved Distriktslæge H. Arctander.
 Faxe ved Forpagter A. Valentiner.
 Arninge (Nakskov) ved Pastor V. Wahl.
 Almindingen (Aakirkeby) v. Skovfoged L. Jenssen-Tusch.
 Desuden er medtaget enkelte Iagttagelser gjorte andre Steder
 af de ovenfor nævnte Herrer.

1. **Anas crecca**, Krikand.

Foraar. — Nakkebøllefjord. Marts: 15de 3, 23de nogle, 31te
 nogle; April: 9de 3, 14de 4, 30te 8; Maj: 5te nogle.

Efteraar. — Bølling Sø. November: 26de 3 (eller *qverqvedula*);
 December: 9de 1 (eller *qverqvedula*). — Kolding. Juli: 31te
 2. — Nakkebøllefjord. Juli: 15de Flokke; November: 5te nogle
 Flokke; 7de c. 30 i Flok.

2. **Anas qverqvedula**, Atling.

Foraar. — Nakkebøllefjord. April: 7de ♂ og ♀, 9de 2, 14de
 et Par, 30te 2; Maj: 5te 2. — Københavns Omegn. Maj: 1ste
 flere i Søborg Mose (N. Christiansen).

Efteraar. — Nakkebøllefjord. Juli: 7de Flokke.

3. **Anas penelops**, Pibeand.

Foraar. — Nakkebøllefjord. Marts: 15de 1 ♂, 23de nogle,
 31te 7—9; April: 2den en enkelt Flok om Aftenen; 9de 8 (4 ♂,
 4 ♀), 14de nogle, 20de Træk om Aftenen, 22de nogle trak om Af-
 tenen, 28de en stor Flok, Træk om Aftenen, 29de Træk, 30te 30.

4. **Anas boscas**, Stokand.

Foraar. — Bølling Sø. Overvintrede. — Kerteminde. April:
 12te, 13de. — Nakkebøllefjord. Februar: 21de i Mængde, 25de do.;
 Marts: 1ste c. 100, 3dje i Mængde, 12te do., 15de i store Flokke,
 23de mange, 31te do.; April: 9de nogle, 14de do., 30te do. —
 Hillerød. Marts: 16de 7^{1/2} Aft. svagt Træk > N. N. O., 19de uhyre
 Mængde Ænder (særlig *boscas*) i Arresø, en Flok paa 5—600, 31te
 8⁴⁰ Aften mange rabbende > O. N. O., 8⁵⁰ ligeledes.

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 8de 1, 29de 4 > Ø., 30te
 2; November: 12te 1, 23de 1, 25de 3, 26de 5, 29de 1; December:

2den 3, 6te 9, 16de 11 > V. — Viborg (Hågerup). December: 24de 500, 25de 500, 26de 200, 27de 5—600, 29de 400, 30te 300, 31te mange. — Kerteminde. November: 6te (Snave); December: 1ste, 4de 1 ♂. — Nakkebøllefjord. Juli: 15de Flokke; November: 5te i hundredevis, 7de Flokke, 14de Flokke; December: 1ste flere Hundrede, 10de i Massevis, 18de ligeledes, 25de i Flokke.

5. *Anas clypeata*, Skeand.

Foraar. — Nakkebøllefjord. April: 28de 3, 30te 4; Maj: 5te 4. — Korsør. April: 18de 2 Par.

6. *Tadorna cornuta*, Gravand.

Foraar. — Kerteminde. Februar: 27de 3. — Nakkebøllefjord. Marts: 7de 2. — Korsør: Marts: 11te 3 Par.

7. *Cygnus olor*, Knopsvane.

Foraar. — Gurre Sø (Saxtorph). Februar: 26de 10. — Københavns Omegn. Marts: 28de et Par i Dammen ved Hjortekærshuset, et Par ved Stampen, et Par ved Raadvad. En Fugl i Søerne ved Eenrum, Vedbæk; 31te 7 i Søborg Mose (N. Christiansen). — Storehedinge. Maj: 7de 2 i Gjorslev Møllesø. — Arninge. Marts: 1ste c. 20; April: 13de—15de omtrent 100 i Rødby Fjord; Maj: 28de Svaner i Fjorden.

8. *Cygnus musicus*, Sangsvane.

Foraar. — Roskilde. Marts: 19de flere i Fjorden ved Bogenæs Skov (N. Christiansen).

Efteraar. — Bølling Sø. November: 11te 1 > S.Ø. — Nakkebøllefjord. November: 4de 1 ad. fløj over.

9. *Fuligula cristata*, Troldand.

Foraar. — Roskilde. April: 23de flere smaa Flokke i Fjorden ved Bogenæs (N. Christiansen).

Efteraar. — Nakkebøllefjord. Oktbr.: 3dje; Decbr.: 10de 2.

10. *Clangula glaucion*, Hvinand.

Foraar. — Nakkebøllefjord. Januar: 8de nogle; Februar: hele Vinteren nogle, 21de 1, 25de 2.

Efteraar. — Snave, Hindsholm (Johs. Larsen). December: 4de 5, 17de, 18de 2 ♀ 1 ♂, 20de. — Nakkebøllefjord. November: 4de første Gang, 24de 2; December: 1ste 2 juv., 8de nogle, 10de en lille Flok, 13de c. 25 i Flok, 25de en Del.

11. *Pagonetta glacialis*, Havlit.

Foraar. — Tranekjær. Maj: 7de »♂ i Sommerdragt, kom den c. 10 Alen nær, mulig anskudt«. — Arninge. April: 17de i Farvandet mellem Lolland og Omø i tusindvis.

Efteraar. — Snave, Hindsholm (Johs. Larsen). December: 17de 4 ♂ 3 ♀, 18de ♂, ♀, 20de.

12. *Oedemia nigra*, Sortand.

Efteraar. — Kolding. Juli: 25de 400 > V. S. V. 1000 Meter højt; 26de 200 (120 + 80) > V. S. V. 100 M. h., 25 > V. S. V., 50 > V. S. V., 31te 350 > V. S. V. 1000 M. h.; August: 1ste 200 > V. S. V. 500 M. h., 5te 50 > V., 10de 350 > V.

Gyvfugl (*Oedemia nigra* eller *O. fusca* — eller begge Arter), Nattræk:

Foraar. — Bjerringbro. April: 17de, 18de stort Træk. — Randers. April: 18de Kl. 10³⁰—11³⁰ stort Træk > N. og N. O., 20de Kl. 10 > N. O., 22de Kl. 11 enkelte > N., 23de Kl. 10³⁰ svagt Træk, 26de Kl. 11—12 stort Træk, 27de Kl. 10—12 overordentlig stort Træk, 28de stort Træk, 29de Kl. 10—12 svagt; Maj: 1ste Kl. 11 faa, 2den Kl. 11 faa, 5te Kl. 11¹⁵ faa, 10de Kl. 11 faa, 26de faa. — Bølling Sø. April: 13de Kl. 9 Træk. — Kolding. Marts: 8de Kl. 10⁵⁰ 2 (klart Maaneskin); April: 19de Kl. 9⁴⁵—10³⁵ næsten uafbrudt Træk (stille, overtrukket), 20de Kl. 10—10³⁰ jævnlig (stille, stjerneklart), 25de Kl. 10—11 vældigt Træk, ogsaa senere (mørkt, overtrukket), 26de Kl. 10—11 en Del (2(?) > V. S. V., fugtigt efter Regn); Maj: 16de Kl. 11 1 (overtrukket), 23de Kl. 11¹⁵—11⁴⁵ flere Gange hørt (stille, overtrukket). — Kerteminde. April: 17de, 23de. — Nakkebøllefjord. April: 2den, 16de enkelte, 19de en Del, 20de ligeledes, 28de nogle. — Hillerød. Marts: 31te Kl. 8³⁰ i anseligt Tal > O. N. O.; April: 18de Kl. 1—1³⁰ > Ø. (klart), 19de Kl. 10 > N. O. (stjerneklart), 20de Kl. 9 en Del > N. O., fra Kl. 9 stadig flokkevis (overtr.), 21de Kl. 9—10 ret stærkt Træk > Ø., 22de Kl. 9³⁰ enkelte > N. O., 23de Kl. 9³⁰ mange > N. O., 24de faa > N. O., 25de Kl. 1 meget stærkt Træk i en Time (ogsaa andre Ænder), »Trækket var som en stor Flok, ikke Fugle enkeltvis«, 26de Kl. 9 enkelte > N. O., Kl. 10 > N. N. O., 27de Kl. 8³⁵ en mindre Flok > Ø., Kl. 9¹⁵ > N. O., 9²⁰ > N. O., 9²⁵ > Ø., 9³⁰ meget stærkt Træk > N. O.; 28de Kl. 2 adskillige, sammen med Gæs > N. O., Trækket begyndte først ud paa Natten (klart), 29de Kl. 9³⁰ mange, kredsede øjensynligt i Lysskæret i alle Retninger; Maj: 1ste Kl. 9³⁰ enkelt Flok > Ø., 2den Kl. 9⁴⁵ faa > Ø., 3dje Kl. 10 faa > N. O. — Arninge. April: 14de Kl. 10¹⁵ en Flok (lyst Graavejr), 20de Kl. 10 enkelte, 21de Kl. 10 over Nakskov. — 1910 (5): $\frac{31}{3}$ ($\frac{8}{3}$ — $\frac{27}{4}$); 1911 (8): $\frac{7}{4}$ ($\frac{8}{3}$ — $\frac{18}{4}$).

Efteraar. — Bjerringbro. September: 29de Træk > S. V. (ogsaa af andre Fugle). — Randers. August: 26de Kl. 11.

13. **Somateria mollissima**, Ederfugl.

Foraar. — Kerteminde. Maj: 28de flere Hundrede N. V. for Sprogø. — Nakkebøllefjord. Marts: 21de nogle.

Efteraar. — Skagen (Johs. Larsen). August: 13de ved Højen en afslaaet Ederfugl i Sommerdragt indenfor Revlerne, 5—6 Stkr. udenfor. — Kolding. August: 12te 38 med en »halv saa stor And« > V.; September: 2den 7 + 1 *Mergus serrator* > S. — Kerteminde, Snave (Johs. Larsen). December: 4de 4, 17de 2, 18de.

14. **Mergus albellus**, Lille Skallesluger.

Efteraar. — Nakkebøllefjord. November: 26de og 27de 1 blandt en stor Flok *Mergus serrator*.

15. **Mergus merganser**, Stor Skallesluger.

Foraar. — Tranekjær. Marts: 18de 1. — Hillerød. Februar: 26de i Buresø; Marts: 19de adskillige i Arresø.

Efteraar. — Viborg (Hagerup). December: 26de 200 ♂, 29de 2 ♀, 30te 60—70 ♂, 31te 100 ♂.

16. **Mergus serrator**, Toppet Skallesluger.

Foraar. — Nakkebøllefjord. Februar: 5te enkelte. — Hillerød. Marts: 19de adskillige i Arresø.

Efteraar. — Kolding. September: 2den 1 + 7 *Som. moll.* > S. — Viborg (Hagerup). (Nogle af dem maaske *Mergus merganser* ♀). December: 24de 200, 25de ligeledes, 26de 300, 28de 20, 29de 1. — Snave, Hindsholm (Johs. Larsen). December: 1ste, 17de ♂, ♀. — Nakkebøllefjord. November: 26de en stor Flok, 27de.

17. **Anser segetum**, Sædgaas.

Foraar. — Kerteminde. Januar: nogle faa. Marts: 1ste 7.

Efteraar. — Kolding. Oktober: 4de 12 (*segetum?*) 1000 M. h. > S. V. — Kerteminde. Oktober: 8de 15—16 > V.

18. **Anser cinereus**, Graagaas¹.

Foraar. — Bjerringbro. April: 1ste Træk flere Gange > N. O. — Randers. Februar: 19de stort Træk, 20de Kl. 9⁵⁰ Fm. 13 > N.; Marts: 5te Kl. 2 5 > N. — Bølling Sø. Marts: 5 (sp.?) > N. O. — Silkeborg. Marts: 7de, Træk. — Kerteminde. Februar: 24de. — Nakkebøllefjord. Februar: 21de 30, 25de c. 30; Marts:

¹ Den store Lighed mellem *Anser segetum* og *A. cinereus* fremkalder vist ofte Forveksling af de to Arter. De fleste Angivelser gælder sidstnævnte.

1ste 50, ligeledes 3dje, 8de, 12te og 15de; 23de faa, 31te 10; April: 9de 11, 14de 2. — Hillerød. April: 23de ved Ynglested. — Roskilde. April: 23de i en lille Sø paa Bogenæs Mark (N. Christiansen). — Faxe. Januar: 18de 1. — Almindingen. Februar: 28de Flokke. — 1910 (6): $\frac{2}{3}$ ($\frac{19}{12}$ — $\frac{23}{3}$); 1911 (7): $\frac{4}{3}$ ($\frac{19}{2}$ — $\frac{1}{4}$).

Efteraar. — Bølling Sø. September: 24de mange Flokke (*cinereus?*) > S. V., 27de 8 (*cin.?*) > N.; Oktober: 6te 1 > N., 7de 75 > S. V., 12te 47 > S. O.; November: 21de 38 > S. V., 22de 6 > S. V.

19. Anser *torqvatus*, Knortegaas.

Foraar. — Aalborg. April: 29de mange paa Torvet; Maj: 13de mange sammesteds, 17de Hundreder sammesteds. — Bjertringbro. Februar: 27de 25 (*torqvatus?*) > S. O. — Kolding. Marts: 26de Kl. 12 Nat Træk > Ø (stjerneklart), 28de Kl. 9²⁵—12⁰⁰ Nat næsten uafbrudt Træk > Ø (graat, fugtig Luft); Maj: 16de Kl. 11—11¹⁵ Nat 3—4 Flokke, Kl. 1 to store Flokke (overtrukket), 23de Kl. 11¹⁵ Nat en stor Flok (stille, overtrukket). — Nakkebøllefjord. Februar: 20de ret store Flokke; Marts: 7de en Del, 21de en Del, 31te jævnlig paa Fjorden; April: 14de c. 300, 17de 100, 27de i Mængde, 30te ligeledes. Maj: 5te 200, 21de 150 > N. O. højt om Eftermiddagen, Kl. 10 Aften Træk. — Hillerød. April: 23de mange paa Arresø. Maj: 13de Kl. 9¹⁰ Aften 2 store Kiler meget højt > N. O. ved Arresø. — Arninge. April: 17de enkelte i Farvandet mellem Lolland og Omø.

Efteraar. — Kolding. Juli: 27de 40 »smaa Gæs« > V. S. V.; September: 18de 18 + 50, 20de Morgen 300 > S. V. 300 M. h., 120 > V. S. V., 180 > S. S. V., 200 > S. V., Aften 100 > S. V., 21de 300 Ø > S. V. 600 M. h., 22de 50 > S. S. V., 25de 45 > V. S. V. 500 M. h., 27de 30 > V. S. V. 400 M. h.; Oktober: 4de Aften 25 > V., 120 > V. S. V. 400 M. h. — Kerteminde. September: store Flokke om Aftenen, 20de 3 paa Rederne. Oktober: 4de og 6te ligeledes. — Nakkebøllefjord. November: 4de 50, 5te, 7de.

20. *Tachybates minor*, Lille Lappedykker.

Foraar. — Københavns Omegn. Maj: 1ste en mindre Flok i Søborg Mose (N. Christiansen).

21. *Podiceps griseigena*, Graastrubet Lappedykker.

Foraar. — Nakkebøllefjord. Marts: 1ste 1, 3dje 4, 8de talrig, en Flok paa 12, 12te talrig, 15de mange, 23de ligeledes, 31te

mindst en Snes Par; April: 9de nogle, 14de nogle; Maj: 5te enkelte. — Almindingen. April: 9de almindelig.

22. *Podiceps cristatus*, Stor Lappedykker.

Foraar. — Roskilde. Marts: 19de 2 i Kattinge Sø (N. Christiansen). — Hillerød. April: 23de mange i Arresø.

Efteraar. — Viborg (Hagerup). December: 26de 3, 27de 1, 29de 2.

23. *Colymbus arcticus*, Sortstrubet Lom.

Foraar. — Nakkebøllefjord. Marts: 21de, en Del, vistnok *arcticus*, fløj over Fjorden.

24. *Colymbus septentrionalis*, Rødstrubet Lom.

Efteraar. — Kolding. November: 20de 60 > V. 600 M. h. — Kerteminde. Oktober: 4de 5 (*sept.?*) > V. højt.

25. *Crex pratensis*, Engsnarre.

Foraar. — Randers. Maj: 12te 1, 17de 1.

26. *Rallus aquaticus*, Vandrixe.

Foraar. — Københavns Omegn. Marts: 7de i Lersøen; Maj: 1ste flere i Søborg Mose (N. Christiansen).

27. *Gallinula chloropus*, Rørhøne.

Foraar. — Thisted. April: 3dje. — Kolding. Februar: 16de (flere skal have overvintret), 20de 1; April: 21de 2. — Nakkebøllefjord. Marts: 2den 1. — Tranekjær. April: 8de første. — Københavns Omegn. Maj: 1ste flere i Søborg Mose (N. Christiansen).

Efteraar. — Kolding. November: 12te, 26te 2; December: 10de 1 ad. — Kerteminde. November: 6te. — Nakkebøllefjord. November: 20de 1. — København. December: 12te 2, tog Vinterophold i Ø. Anlæg. — Arninge. 1 Stk. overvintrede.

28. *Fulica atra*, Blishøne.

Foraar. — April: 13de 6, 14de talrig, 19de Kl. 10^{1/2}—11^{1/2} Aften »naar Stemmer fra Gyvfugle lyder, kalder Blishønen fra Rørbevoksningerne ved Fjorden«, 27de Træk, 28de meget talrig. — Nakkebøllefjord. Marts: 1ste og 2den hørt flyvende om Aftenen; 3dje 2, 8de nogle, 12te talrig, 15de 20, 23de mange, 31te mindst en Snes Par; April: 9de Flok paa 30, 14de 20; Maj: 5te mange. — Tranekjær. April: 7de første. — København. Januar: 22de Fæstningsgraven ved Christianshavn (N. Christiansen). — Storehedinge. Marts: 16de 4 i Gjorslev Sø. — Arninge. Marts:

30te 1; April: 21de flere. — Almindingen. Marts: 12te flere, 31te almindelig. — 1910 (4): $\frac{8}{3}$ ($\frac{27}{2}$ — $\frac{16}{3}$); 1911 (5): $\frac{23}{3}$ ($\frac{3}{3}$ — $\frac{13}{4}$).

Efteraar. — Nakkebøllefjord. November: 8de 10, 20de ligeledes.

29. *Grus cinerea*, Trane.

Foraar. — Hillerød. Maj: 31de 1 skudt i Kassepose ved Arresø, en Flok opholdt sig der fra Midten af Maaneden. — Almindingen. April: 18de flere Flokke, en paa 16, 20de og 21de mange Flokke.

30. *Vanellus cristatus*, Vibe.

Foraar. — Thisted. Februar: 13de enkelte — Aalborg. Marts: 2den og 4de flere, 19de mange; April: 4de 20 + 12 > N. — Bjerringbro. Marts: 9de. — Randers. Februar: 24de 10, 27de 5—6; Marts: 1ste Kl. 9 Fm. 4 > N., 3dje faa, 5te Kl. 9 Fm. 8 > N. V., 9^{30} 2 > N., 9^{50} 2 > N. V., 6te 8^{38} Fm. 1 > N. O., 8^{40} 3 > N., 8^{42} 1 > N., 8^{46} 5 > N. O., 8^{45} 30 > N. V., 8de 7^{50} Fm. 1 > N. O., 23de 8^{25} 1 meget højt > S. O.; April: 8de Morgen 1 > Ø., 9de 10^{25} Fm. 1 > N., 10^{30} 1 > N., 10^{48} 5 > N., 11^{15} 1 højt > N. V. — Aarhus (Wedelslund). Marts: 1ste nogle Par ankommet. — Bølling Sø. Februar: 18de første; Marts: 23de 20 > N. — Silkeborg. Februar: 25de. — Kolding. Februar: 26de 17 > N. N. O. 100 M. h.; Marts: 30te 6 > N. N. O. 70 M. h. Kerteminde. Februar: 20de 10, 24de; April: 5te og 14de. — Nakkebøllefjord. Februar: 21de 3, 25de 50; Marts: 1ste 20, 3dje nogle, 8de ret almindelig, 15de store Flokke, 21de ganske lavt > N. O., dels enkeltvis, dels i Smaaflokke, 23de store Flokke, 31te dels parvis, dels store Flokke; April: 2den enkelte trak, 9de mange, 14de mange, næsten ingen i Flokke. — Tranekjær. Februar: 20de den første; Marts: 17de Træk ankommet; April: 2den 4—6 > N. — Hillerød. Februar: 26de 8 ved Hjørlande; Marts: 5te mange ved Sørup, 6te ved Hillerød, 8de 11, 9de enkelte, 10de Kl. 9^{30} Aften trak skrigende over Byen, 12te almindelig, 19de store Flokke ved Arresø, en Flok > N. O. — Korsør. Marts: 4de, 11te Trækket endt. — Storehedinge. Februar: 28de 1; Marts: 1ste 10. — Faxe. Marts: 2den set flere Steder. — Arninge. Februar: 23de; Marts: 12te 1, 16de mange. — 1910 (10): $\frac{30}{2}$ ($\frac{19}{2}$ — $\frac{9}{3}$); 1911 (16): $\frac{25}{2}$ ($\frac{13}{2}$ — $\frac{9}{3}$).

Efteraar. — Randers. August: 13de mange, dels enkeltvis, dels Flokke paa 20—30 ret højt > V. og V. S. V.; Oktober: 1ste Kl. 2 4 > S.; November: 19de Flokke paa 50 à 100 > S. —

Bølling Sø. Oktober: 29de 6 > Ø. — Nakkebøllefjord. Juli: 27de store Flokke; September: 16de Flokke paa et Par Hundrede (Svelmø), 20de store Flokke, 22de nogle Flokke (Svelmø); Oktober: 3dje Flokke paa Hundreder, 6te store Flokke, 29de 50; November: 7de 10, 14de nogle. — Korsør (M. Klinge): Oktober: 6te talrig paa Gennemrejse, Kl. 9³⁰—10³⁰ 5 > S. over Korsør Nor.

31. *Charadrius squatarola*, Strandhjejle.

Efteraar. — Kolding. Juli: 26de 11³⁰ Nat hørt (?). — Nakkebøllefjord. September: 3dje 2 i Sommerdragt (Svelmø), 16de 2 (Svelmø); Oktober: 4de 10 (Svelmø), 7de 1 fløj over, 8de 5 (Svelmø).

32. *Charadrius pluvialis*, Hjejle.

Foraar. — Thisted: overvintret. — Bølling Sø. April: 18de 2 > N.

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 4de Aften Træk, 9de Træk, 11te 30 > S. V., 13de 7 > N., 14de 10 > N., 16de 50 > S. V., 7 > N., 17de 25, 20de 14 > N.; November: 13de 1 > N., 18de 1 > Ø, 21de 100 > O., 22de 7 > S., 25de 11. — Snave, Hinds-holm (Johs. Larsen). December: 10de 2, 16de 1. — Nakkebøllefjord. August: 14de en lille Flok (sp. ?) > V. — Korsør (M. Klinge). Oktober: 6te 20. — Arninge. September: 22de en Flok; November: 20de 1.

33. *Charadrius morinellus*, Pomeransfugl.

Foraar. — Thisted. April: 21de, første.

34. *Ægialitis minor*, Lille Præstekrave.

Foraar. — Kolding. Maj: 2den 1, 20de ynglende.

Efteraar. — Kolding. Juli: 31te 1 juv.; August: 15de hørt, 16de 1 juv.

35. *Ægialitis hiaticula*, Præstekrave.

Foraar. — Thisted. Februar: 26de enkelte, følgende Dage mange. — Aalborg. Marts: 19de 1. — Kolding. Februar: 26de 1; Marts: 9de 1, 24de 1, 30te 6; April: 23de 1; Maj: 2den 1; 7de 1. Kerteminde. — April: 5te, 19de, 20de. — Nakkebøllefjord. Marts: 7de nogle. — Tranekjær. Marts: 31te 1; April: 4de 2—3, 5te 11—12. — Korsør. Marts: 11te 1 Par. — Arninge. Marts: 8de Kl. 11³⁰ Aft. Træk; Maj: 6de en Flok. — 1910 (4): $\frac{7}{3}$ ($\frac{21}{2}$ — $\frac{24}{3}$); 1911 (6): $\frac{6}{3}$ ($\frac{26}{2}$ — $\frac{31}{3}$).

Efteraar. — Kolding. Juni: 15de 1, 21de 1, 30te 1 ad., 8 juv.; Juli: 2den 8, 8de 7 (1 ad., 3 juv.), 1 ad., 1 juv. + 4 *Tr. alp.* + 1 *Aeg. cant.* > V. S. V., 26de Kl. 11¹⁰ Nat nogle, 31te 1 ad., 1 juv.; August: 2den 1 ad., 3 juv., 7de 14, 12te 2 juv.; 14de 13 > S. V., 15de 4 ad., 6 juv., 19de 4 ad., 9 juv., 20de 2 ad., 6 juv., 21de 10 juv.,

2 + 2 *Tr. alp.* > V. S. V., 28de 3 ad., 7 juv., 29de 2 juv., 30te 2 ad., 13 juv.; September: 5te 3 ad., 10 juv., 8 + 6 *Tr. alp.* > V. S. V., 6te 5 juv., 12te 1 juv., 13de 1 juv., 17de 15 juv., 18de 11 juv., 20de 1 ad., 1 juv., 25de 1 + 25 *Tr. alp.* > S. S. V. — Nakkebøllefjord. September: 3dje 5—6 (Svelmø), 16de 10 (do.), 22de 10 (do.).

36. *Ægialitis cantiana*, Hvidbrystet Præstekrave.

Efteraar. — Kolding. Juli: 8de 1 + 4 *Tr. alp.* + 2 *hiat.* > V. S. V.

37. *Strepsilas interpres*, Stenvender.

Efteraar. — Kolding. August: 5te 1 juv., 9de 1 juv., 28de 1 juv. — Nakkebøllefjord. September: 3dje 1 (Svelmø).

38. *Hæmatopus ostreologus*, Strandskade.

Foraar. Nakkebøllefjord. Marts: 7de 4. — Korsør. Marts: 11te 1 Par.

Efteraar. — Kolding. August: 2den 7 > V. S. V. 600 M. h., 7de 2, 28de 23, 29de 2 ad. — Fyns Hoved (Johs. Larsen). Juli: 22de. — Kerteminde. Juli: 30te.

39. *Numenius phæopus*, Smaaspøve.

Foraar. — Bølling Sø. Maj: 15de 1 > Ø., 22de 1 > Ø. — Kolding. Maj: 23de Kl. 11³⁰ Nat 1, Kl. 12³⁰ 1 à 2 (stille, overtr.). — Nakkebøllefjord. Maj: 16de 1 > N. Ø. om Eftmd.

Efteraar. — Kolding. August: 3dje hørt, 8de 15 > V. S. V. 400 M. h. — Nakkebøllefjord. Juli: 28de fløj over om Aftenen; August: 3dje 1 (Svelmø); 9de Aft. Træk; Oktober: 1ste Aft. Træk.

40. *Numenius arquatus*, Storspøve.

Foraar. — Thisted. April: 17de Kl. 11—12 Nat stort Træk over Byen. — Randers. April: 18de Kl. 10⁵⁵ Aft. Flok > Ø., 26de Kl. 11—12 Nat, 27de overordentlig stort Træk. — Bølling Sø. April: 27de 1 > Ø. — Kolding. April: 19de Kl. 9⁴⁵ en Flok (stille overtr.). — Nakkebøllefjord. April: 19de Aft. nogle, 20de Aft. nogle, 29de Aft.; Maj 3dje Kl. 5 Eftermd. 15 trækkende højt. — Hillerød. April: 21de Kl. 1⁵⁰ Nat livligt Træk > N. O., 26de Kl. 10 aft. Træk > N. N. O., 29de Kl. 10 Aft. mange > Ø; Maj: 1ste Kl. 10 Aft. livligt Træk. — 1910 (4): ($\frac{4}{4}$ ($\frac{24}{3}$ — $\frac{13}{4}$); 1911 (6), $\frac{20}{4}$ ($\frac{17}{4}$ — $\frac{27}{4}$).

Efteraar. — Randers. Juni: 29de Kl. 4³⁰ Nat og Kl. 11¹⁵ Frmd. Træk; Juli: 7de Kl. 8³⁰ Aft. 1 > S. V.; August: 9de Kl. 7⁴⁵ Aft. 10 > S. V. — Kolding. Juni: 25de 22 > V. S. V., 26de 5, deraf 2 > S. S. V., 1 > V. S. V.; Juli: 9de hørt, 26de 6 > S. S. V., 27de Kl. 4 Nat en Flok hørt; August: 4de 1, 9de 13

> S. V., 11te hørt, 17de 1, 19de 2, 22de 2. — Fyns Hoved (Johs. Larsen). Juli: 22de. — Nakkebøllefjord. Juli: 23de 4 > V. — Lyngby (R. H. Stamm). Juni: 25de 2 Flokke, hver paa 7—8 Stkr., > S. V. over Lyngby Sø. (Bestemmelsen skyldes A. Ghristiani).

41. **Limosa lapponica**, Kobbersneppe.

Foraar. — Aalborg. Maj: 12te 2 Stkr. hos Vildthandler.

Efteraar. — Kolding. Juli: 31te 2 ad. Kl. 11⁴⁵ Nat og senere hørt Limosaskrig. — Nakkebøllefjord. August: 3dje 2 (Svelmø).

42. **Limosa ægocephala**, Stor Kobbersneppe.

Efteraar. — Kolding. Juli: 31te 1 juv.

43. **Actitis hypoleuca**, Mudderklire.

Foraar. — Thisted. Maj: 11te 3 Stkr. — Kolding. Maj: 26de 5 paa Vandrested; Juni: 1ste 3, hvoraf 2 > Ø.

Efteraar. — Kolding. Juli: 7de 1, 19de 1, 20de 3, 21de 8, 23de 1, 25de 7, 26de, 27de 6, 28de 8, 31te 5; August: 3dje 1, 5te 20, 7de 5, 9de 15, 10de 8, 11te 20, 12te 15, 14de 15, 15de 20, 16de 20, 18de 6, 19de 10, 20de 20, 21de 15, 22de 10, 23de 10, 24de 12, 25de 10, 26de 20, 28de 15, 29de 20, 30te 10; September: 2den 25, 5te 10, 6te 6, 7de 15, 8de 6, 11te 4, 12te 4, 13de 2, 14de 2, 15de 3 + 2, 16de 2, 18de, 20de og 26de 1. — Nakkebøllefjord. August: 19de paa Vandrested; September: 1ste nogle, 3dje 1 (Svelmø).

44. **Totanus glareola**, Tinksmød.

Foraar. — Thisted. April: 22de. — Bølling Sø. April: 26de ankom til Ynglepladserne.

Efteraar. — Kolding. 12te 1, 13de 1. — Nakkebøllefjord. Juli: 30te nogle paa Vandrested.

45. **Totanus ochropus**, Svaleklire.

Foraar. — Bølling Sø. April: 19de hørtes om Aftenen.

Efteraar. — Nakkebøllefjord. August: 8de 2 fløj over.

46. **Totanus calidris**, Rødben.

Foraar. — Thisted. April: 16de. — Randers, April: 23de 1. — Kolding. Maj: 13de hørt, 16de 1 stod og jodlede, Nat 11—11¹⁵ en Flok over. — Kerteminde. April: 14de. — Nakkebøllefjord. Marts: 23de 1, 31te en Del; April: 9de overalt, 14de ret talrig, 30te en Del. — Tranekjær. Marts: 23de 1; April: 6te c. 20. — Hillerød. Marts: 31te Kl. 9 Aft. > O. N. O.; April: 20de Kl. 10 Aft. Træk (Regn), 23de i Mængde ved Arresø. — Korsør. April: 9de. — 1910 (4): $\frac{31}{3}$ ($\frac{11}{3}$ — $\frac{14}{4}$); 1911 (5): $\frac{1}{4}$ ($\frac{23}{3}$ — $\frac{14}{4}$).

Efteraar. — Randers. August: 20de. — Kolding. Juni: 29de 6; Juli: 1ste hørt, 6te 2 ad., 3 juv., 8de 1, 9de 5, 13de 17, 14de 3, 19de 32, 20de 8 > S. V., 22de 20, deraf 3 > S. V., 25de 5 > S. S. V.; August: 2den 6, 4de 9, 9de 1, 10de 7 (deraf 3 juv.), 11te 2, 16de 10, 21de 11²⁵ Nat hørt, 25de 1; September: 2den 6. — Nakkebøllefjord. August: 21de 2; September: 3dje 4 (Svelmø).

47. *Totanus fuscus*, Sortklire.

Foraar. — Kolding. Maj: 23de Kl. 11³⁰ Nat en Flok over (stille, overtr.) — Nakkebøllefjord. Maj: 5te 1.

48. *Totanus glottis*, Hvidklire.

Foraar. — Nakkebøllefjord. April: 30te 2; Maj: 22de hørtes nogle Gange trækkende over > N. Ø., baade Formiddag og Eftermiddag.

Efteraar. — Randers. September: 21de 1. — Kolding. Juni: 21de 1 > V. S. V; August: 7de 1 > S. V., 8de hørt. — Nakkebøllefjord. Juli: 22de Aft. Træk; August: 21de 1 (Svelmø).

49. *Machetes pugnax*, Brushane.

Foraar. — Thisted. April: 24de. — Aalborg. Maj: 15de 6 ♂ hos Vildthandler.

Efteraar. — Kolding. Juli: 12te 6 juv., 14de 5 juv., 19de 1, 20de 4 juv., 21de 2, 22de 2; August: 2den ♂ juv., 15de 1, 19de 1 juv., 23de 1 juv.

50. *Recurvirostra avocetta*, Klyde.

Foraar. — Korsør. April: 9de 3.

51. *Tringa temminckii*, Temminck's Ryle.

Efteraar. — Kolding. August: 15de 1; September: 8de 1 + 1.

52. *Tringa minuta*, Dvergryle.

Efteraar. — Kolding. Juli: 27de 1; August: 24de 1; September: 6te 5, 8de 5, 17de 16, 18de 5, 29de 3.

53. *Tringa canutus*, Islandsk Ryle.

Efteraar. — Nakkebøllefjord. August: 21de 10 juv. (Svelmø); September: 3dje 5—6 (do.), 16de 3 i Sommerdragt (do.).

54. *Tringa alpina*, Ryle.

Foraar. — Thisted. April: 16de. — Aalborg. Maj: 29de 4 Par. — Bølling Sø. Maj: 9de 2. — Silkeborg. Maj: 11te. — Kerteminde. April: 7de 15 (sp.?). — Nakkebøllefjord. April: 14de nogle. — Hillerød. April: 30te mange ved Arresø.

Efteraar. — Randers. September: 6te Nat hørt. — Kolding. Juli: 8de 3 ad., 3 juv., 4 + 1 *Aeg. cant.* + 2 *hiat.* > V. S. V., 19de 80 (deraf 6 juv.), 15 > V. S. V., 10 + 8 *Tr. subq.* > V. S. V., 20de

22 ad., 1 juv., 21de 2 ad., 1 juv., 22de 6 ad. > V. S. V., 28 ad. (deraf 16 + 7 *Tr. subarqv.* > S. S. V.), 23de 20 ad. (deraf 10 > V. S. V.), 24de 3 ad., 26de 4 ad., 27de 40 ad., 28de 3 ad.; August: 2den 2 ad., 1 juv., 7de 2 ad., 11te 1 ad., 1 juv., 14de 2 juv., 1 ad., 15de 1 ad., 2 juv., 19de 10 juv., 20de 2 ad., 20 juv., 21de 12 juv., 2 + 2 *Aeg. hiat.* > V. S. V., 24de 7 juv., 28de 1 juv., 29de 20 juv., 30te 2 juv.; September: 5te 1 ad + 5 juv. + 8 *hiat.* > V. S. V., 6te 9 juv., 8de 20 juv., 12te 6, 13de 3 ad., 60 juv., 17de 80 juv., 18de 1 ad., 100 juv., 19de 20, 20de 1 ad., 14 juv., 21de 1 ad., 5 juv., 25de 1 ad., 24 juv. + 1 *hiat.* > S. S. V., 29de 45. — Nakkebøllefjord. Juli: 23de 40 paa Vandrested. Følgende Optegnelser gælder alle for Svømmø. August: 21de 20; September: 3dje 20—30 (enkelte i Sommerdragt), 16de 40, 22de 50; Oktober 4de 50, 8de 50, 19de 5.

55. *Tringa subarqvata*, Krumnæbet Ryle.

Efteraar. — Kolding. Juli: 19de 8 ad. + 10 *Tr. alp.* > V. S. V., 22de 7 ad. + 16 *Tr. alp.* > S. S. V., 24de 4 ad., 27de 1 ad.; August: 14de 2 ad., 24de 2 juv., 28de 1 juv., September: 8de 10 juv., 17de 1 juv., 18de 1 juv. — Nakkebøllefjord. September: 3dje 3—5 (Svømmø).

56. *Calidris arenaria*, Selning.

Efteraar. — Kolding. September: 7de 1, 8de 1, 13de 3. — Nakkebøllefjord. August: 21de 1 (Svømmø).

57. *Limnocryptes gallinula*, Enkelt Bekkasin.

Foraar. — Thisted. Marts: 30te. — Randers. Januar: 22de 1; Marts: 5te 1; April: 9de 1 (samme Sted). — Storehedinge. Marts: 1ste 1 (overvintrende?).

58. *Gallinago scolopacina*, Hørsegjøg.

Foraar. — Randers. Marts: 4de 2, 12te 1; April: 8de 1, 9de 1, 13de 5. — Bølling Sø. April: 18de mange. — Nakkebøllefjord. Marts: 23de Træk ankommet; April 9de ret talrig, 14de 10. — Tranekjær. April: 1ste 1. — Hillerød. Marts: 19de 10 ved Arresø, 30te mange og April: 23de mange samme Sted. — 1910 (5): $\frac{23}{3}$ ($\frac{6}{3}$ — $\frac{14}{4}$); 1911 (4): $\frac{20}{3}$ ($\frac{4}{3}$ — $\frac{1}{4}$).

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 4de 2, 8de 1, 13de 1, 14de 3, 15de 2, 16de 3, 17de 1, 18de 4, 29de 1; November: 4de 2. — Kolding. August: 5te 2, 15de 6, 18de 7, 19de 6, 25de 2, 28de 10, 29de 10; September: 2den 10, 5te 10, 6te 2, 7de 7, 8de 14, 11te 7, 12te 15, 13de 20, 14de 30, 15de 12, 18de 20, 19de 1, 20de 15, 21de 10, 22de 12, 25de 2—3, 27de 10, 30te 1;

Oktober: 4de 12, 5te 1, 17de 2—3, 18de 9, 22de 2, 25de 3. — Nakkebøllefjord. September: 20de 3—4 (sp.?) ; Oktober: 3dje faa, 6te talrig, 17de 20; November: 5te en Del, 7de 10—15; December: 1ste 8. — Arninge. September: 22de mange.

59. *Gallinago major*, Tredækker.

Foraar. — Københavns Omegn. Maj: 15de Amager Fælled ved Kalveboderne (N. Christiansen).

Efteraar. — Randers. August: 19de 2, 23de stort Træk ank., 27de 3; September: 1ste 6.

60. *Scolopax rusticula*, Skovsneppe.

Foraar. — Thisted. Marts: 9de, 10de 4, 11te 1, 24de 1; April: 12te stort Træk, 13de en Del, 14de mange, 15de enkelte. — Aalborg. Marts: 19de 4 skudt N. for Aalborg, 27de flere hos Vildthandlere, 30te 1; April 14de 1, 15de 6 fra Hals, 8 fra Hjørringegnen, 16de 4, 19de 1. — Bjerringbro. April: 2den, Trækket paa det højeste. — Randers. Februar: 5te 2, 26de 3; Marts: 26de 5, 30te 4; April: 2den 2, 9de 3, 13de 10, 14de enkelte, 17de 4. — Storehedinge. Marts: 14de 1 skudt, 29de mange; April: 1ste talrig. — Faxe. Slutningen af Marts enkelte (indtil 3) hver Dag. — Almindingen. Januar: 16de 1, 18de 2, 24 1, 27de 1. — 1910 (5): $\frac{2}{3}$ ($\frac{23}{1}$ — $\frac{20}{3}$); 1911 (4): $\frac{5}{3}$ ($\frac{5}{2}$ — $\frac{19}{3}$).

Efteraar. Bjerringbro. Oktober: 13de og 29de nogle. — Bølling Sø. Oktober: 29de 1. — Storehedinge. December: 21de.

61. *Larus ridibundus*, Hættemaage.

Foraar. Thisted. Marts: 12te, 15de større Flok > S. V. — Aalborg. Marts: 13de mange. — Randers. Marts: 13de faa, 16de 7 > N. 8³⁰ Fm., 21de 5, 24de 3 > N., 28de og 29de flere, 31te 8²⁵ Fm. 1 > N. O.; April: 2den 3 > N. V., 7de og 13de talrig paa Gennemrejse, 14de 4 > N. V. Kl. 1⁴⁰; 15de 9³⁷ 2 > N., 16de Kl. 11 4 > N., 18de 10, 25de 8³⁰ 2 > V., 27de Kl. 10—12 Nat enkelte høres, 28de talrig. — Bølling Sø. Maj: 22de 3 (sp.?) > N. — Kolding. Januar: 7de 70, 8de 80, 8 juv., 15de 100; Februar: 6te 100 (3 juv., 3 ad.), 8de 100, 19de 70, 21de 80 drog om Aftenen udad, 26de 100; Marts: 5te 200, 17de 400, flest sorthovede, 19de 500 (25 yngre, de allerfleste sorthovede), 26de 500 (11 sorthovede, 10 unge hvidhovede), 31te 100; April: 3dje 500, 9de 500, 22de 100, 23de 50, 24de 20, 25de 10, 27de ingen; Maj; 2den 40, 7de 20, 10de 14, 14de 36, 18de 16, 19de 20, 21de 80, 30te 70. — Kerteminde. Februar: 1ste, 2den, 3dje, 6te, 9de, 15de, 18de, 20de, 21de, 23de. — Nakkebøllefjord. Januar: 8de i Mængde

hver Dag, 31te en Del; Februar: 5te stadig mange, begynder i de sidste Dage at blive sorte paa Hovedet; Marts: 15de ved Ynglepladser, nogle med sort Hætte, langtfra alle.

Efteraar. — Kolding. Juni: 15de 150, 3 > V., 18de 100, 28de 200, 29de 200, deraf 3 juv., 30te 250 ad., 1 juv.; Juli: 1ste 300 ad., 1 juv., 2den 170 ad., 3 juv., 3dje 120 ad., 4 juv., 4de 300 ad., 3 juv., 7de 80 ad., 10 juv., 8de 200 ad., 44 juv., 10de 80 ad., 40 juv., 13de 100 ad., 100 juv., 14de 100 ad., 65 juv., 19de 200 ad., 200 juv., 20de 150 (45 ad., 27 juv.), 21de 100 mest juv., 22de 100 (deraf 1 ad., 22 juv.), 24de 4 ad., 34 juv., (ialt 120), 30te 200, 31te 3 ad., 150 juv.; August: 1ste 3 ad., 80 juv., 8de 300, 15de 500, 19de 500, 20de 500, 21de 250, 22de 4, 26de 150, 29de 200; September: 5te 30, 6te 50, 11te 5, 13de 10, 14de—17de 30, 18de 50, 20de 20, 7 > S., 22de faa, 26de 5, 28de 30, 29de 70; Oktober: 3dje 40, 17de 40, 18de 56, 19de 40, 20de Aft. 50, 21de faa, 26de 200; November: 5te 50, 8de 150, 17de 2, 20de 2 juv., 26de 1 juv., 27de 3, 29de 2 ad.; December: 1ste 25, 2den 20 (4 juv., 3 ad.), 10de 50, 11te 2 juv. — Viborg. (Hagerup). December: 24de 60 (3 ad. for 1 juv.), 25de 60, 26de 150 (4 ad. for 1 juv.), 27de 100, 28de 150, 29de 100 + 200 (sp.?), 30te 100, 31te 10. — Kerteminde. Oktober: 7de.

62. *Larus canus*, Stormmaage.

Foraar. — Randers: overvintrende, ret talrig. Februar: 28de 14 > N. O.; Marts: 1ste 20 juv. ank., 2den ingen unge Fugle, 6te 1 juv. > N., 27de forladt sit Vinterkvarter i Havnen. — Bølling Sø. Maj: 15de 8 > Ø. — Kolding. Februar: 19de 8 juv.; Marts: 19de 17 juv. kom fra N., 20 juv., 1 ad. — Kerteminde. Februar: 1ste, 2den, 3dje, 6te, 9de, derefter daglig.

Efteraar. — Kolding. Juli: 25de 2 ad. > S. V., Aft. 2 ad.; August: 2den 1 ad., 1 juv., 11te 2 ad., 3 juv.; September: 25de 1 juv. > S. V. 100 M. h.; November: 8de 2 juv., 20de 2 ad. — Viborg. (Hagerup). December: 27de 2 ad., 30te 3 juv., 31te 3 juv.

63. *Larus argentatus*, Havmaage.

Foraar. — Kolding. Januar: 5te 1 ad.; Februar: 19de 2 ad., 2 juv., 22de 2 ad., 3 juv. — Kerteminde. Februar: 9de, 12te, 15de, 18de. — Nakkebøllefjord. Marts: 31te ses jævnlig i denne Tid.

Efteraar. — Bølling Sø. November: 8de 2 > V. — Kolding. Juli: 26de 1 ad.

64. *Larus marinus*, Svartbag.

Foraar. — Randers. Marts: 17de 2, 22de 2. — Kolding.

Marts: 5te 1 ad. — Kerteminde. Februar; 1ste, 15de, 21de. — Nakkebøllefjord. Marts: 31te ses jævnlig i denne Tid.

Efteraar. — Viborg. (Hagerup). December: 30te 2 ad. — Kolding. August: 20de 1 ad. — Kerteminde (Snave). September: 15de 1, 19de, 21de; Oktober: 7de (Johs. Larsen). — Nakkebøllefjord. August: 4de 1ste Stk. September: 22de 2 ad. (Svelmø); Oktober: 8de nogle (Svelmø).

65. *Sterna minuta*, Dvergterne.

Foraar. — Nakkebøllefjord. Maj: 5te 2.

Efteraar. — Kolding. Juni: 18de 5, 28de 3; Juli: 4de 6, 8de 5, 21de 10, 24de 1, 27de 1 > V. S. V. — Nakkebøllefjord. August: 3dje 1.

66. *Sterna hirundo*, Terne og

67. *Sterna macroura*, Havterne.

Foraar. — Thisted. Maj: 2den *St. macr.*, 4de *St. hir.* — Kerteminde. April: 15de 2 *St. macr.* — Nakkebøllefjord. April: 22de 2. — Hillerød. April: 30te *St. hir.* ved Arresø. — Roskilde. April: 23de ved Bognæs (N. Christiansen). *Sterna hirundo*: 1911 (4): $27\frac{1}{4}$ ($22\frac{1}{4}$ — $4\frac{1}{5}$).

Efteraar. — Kolding. Juni: 15de 6, 18de 6, 28de 15; Juli: 4de 16, 8de 15, 19de 8 ad., 21de 30, deraf flere Unger, de første, 22de 6 > V., 24de ad. og juv., 25de mange, 27de 1 ad. og 1 juv. > V. S. V., 15 > V. 400 M. h., 1 > S. V., 31te 7 juv. > V. S. V.; August: 2den 6 (ad. et juv.) > V. S. V. 200 M. h., 3dje 10 juv. 200 M. h. > V. S. S., 11 (juv. et ad.) > V. S. V. 200 M. h., 9de 1 ad. 3 juv. > V., 11te 3 juv. > V., (12te—18de ingen), 26de 17 > V. S. V.; September: 3dje 8 > V, 4de 3 > V. S. V., 23 > V. S. V., 5te 5 juv. > S. S. V., 25de 5 > V. S. V. — Nakkebøllefjord (Svelmø). August: 3dje en enkelt, 21de 1.

68. *Sterna cantiaca*, Splitterne.

Foraar. — Kolding. April: 18de 2; Maj: 14de 2 over Fjorden lavt > Ø., 21de 1 Lillebelt, 25de 1 à 2.

Efteraar. — Kolding. August: 4de 1—2, 11te hørt.

69. *Sterna anglica*, Sandterne.

Foraar. — Thisted. Maj: 12te.

70. *Sterna nigra*, Sortterne.

Foraar. — Københavns Omegn. Maj: 1ste Søborg Mose (N. Christiansen). — Arninge. Maj: 28de flere ved Rødby Fjord.

Efteraar. — Kolding. Juni: 29de 2 ad.; Juli: 1ste 1 ad., 22de 2 ad.

71. *Lestris pomatorhina*, Mellemskjøve.

Efteraar. — Skagen (Johs. Larsen). August: 12te 1.

72. *Fratercula arctica*, Lunde.

Foraar. — Thisted. Maj: 18de nogle faa Stk. inddrevet.

73. *Ardea cinerea*, Hejre.

Foraar. — Kolding. Maj: 2den 1 200 M. h. > S. O. — Nakkebøllefjord. Februar: enkelte overvintret, 25de 2 fløj over; Marts: 21de nogle fløj over. — Tranekjær. Marts: 30te 2. — Hillerød. Februar: 5te 2 > V., 19de 1 over Grib Skov, 26de ankommer til Kolonien i St. Lyngby Skov ved Arresø. — Almindingen. April: 25de.

Efteraar. — Bølling Sø. November: 9de 4 > N. V. — Kolding. Juli: 23de 1 > S. V. — Nakkebøllefjord. Juli: 15de 3, 27de 1; September: 22de 14 (Svelmø); Oktober: 4de, 8de 16, 19de 20 (Svelmø); November: 5te 4—5, 14de 10; December: 1ste 12, 10de nogle, 18de 18, 25de 18.

74. *Ciconia alba*, Hvid Stork.

Foraar. — Thisted. April: 27de. — Aalborg. April: 9de 1 > N. O. — Bjerringbro. April: 19de. — Randers. April: 16de 2 > V., 20de 1. — Wedelslund (Aarhus). Marts: 31te 1 > N. — Bølling Sø. April: 21de 1 > N. V., 28de 1 > V.; Maj: 11te 1 > N. — Kolding. Maj: 7de 1, 9de Kl. 8³⁵ Aften 1 lavt > N., 12te 1. — Kerteminde. April: 26de 2; Maj: 25de. — Hillerød. April: 20de ved Hammersholt. — Storehedinge. April: 21de 1. — Faxe. April: 1ste 2, 11de 1 > N., 19de 1 paa Yngleplads Kl. 9 Fm., Kl. 9³⁰ 1 > N.; Maj: 9de 1 Stork stadig paa Ynglepladsen, 12te 1 ♂ kom om Morgenen og Parring fandt straks Sted. — Arninge. April: 11te 1, 19de 1 ved Nakskov. — Almindingen. April: 20de, 21de. — 1910 (6): $10/4$ ($26/8-23/4$); 1911 (12): $16/4$ ($31/8-27/4$).

Efteraar. — Bjerringbro. August: 24de stort Træk sydpaa. — Kolding. August: 27de 1 endnu paa Rede. — Storehedinge. September: 17de Storkene paa Gjorslev rejste med 4 Unger. — Arninge. August: 4de 1, 8de 1.

75. *Falco tinnunculus*, Taarnfalk.

Foraar. — Thisted. Februar: 20de paa Ynglested. — Randers. Marts: 7de 1, 12te 1, 24de 1. — Bølling Sø. Marts: 9de 1; April: 13de 1, 14de 1, 19de 2. — Kolding. April: 19de 1 over. — Kerteminde. Februar: 24de. Maj: 13de, 25de. — Store-

hedinge. Marts: 28de 1. — Arninge. Maj: 8de. — 1911 (5): $\frac{6}{3}$ ($\frac{20}{2}$ — $\frac{28}{3}$).

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 7de 1, 20de 1 > Ø. — Kolding. Oktober: 25de 1 > V. — Kerteminde. November: 18de; December: 17de (Snave). — Storehedinge. September: 16de 1 jævnlig set; December: 10de 1.

76. *Falco aesalon*, Dvergfalk.

Foraar. — Bølling Sø. Overvintrede.

Efteraar. — Bølling Sø. November: 12te 1 (sp.?). — Kolding. November: 24de (sp.?). — Kerteminde. Oktober: 27de. — Amager (N. Christiansen). September 30te 1 juv. — Storehedinge. September: 30te 1. —

77. *Falco subbuteo*, Lærkefalk.

Foraar. — Bølling Sø. Maj: 3dje 1 (sp.?).

78. *Falco peregrinus*, Vandrefalk.

Foraar. — Aalborg. April: 20de 1, 22de 1.

79. *Buteo vulgaris*, Musevaage.

Foraar. — Aalborg. Maj: 24de. — Bjerringbro. Marts: 30te. — Randers. Februar: 26de 1. — Wedelslund (Aarhus): enkelte overvintret. — Bølling Sø. April: 20de 1 > N. — Silkeborg. Marts: 31te. — Nakkebøllefjord. April: 2den 1 trak. — Trane-kjær. April: 18de 6 > N., 20de Træk. — Hillerød. Overvintrende. Februar: 27de 6 Par i St. Dyrehave og Grib Skov; Marts: 5te enkelt paa Træk. — Roskilde (N. Christiansen). Marts: 19de 4 over Bogenæs Skov. — Faxe. Marts: 8de 1 > N.; April: 2den stort Træk (0^o, Snestorm). — Almindingen. Februar: 12te 1, 21de 1, 28de 2; Marts: 1ste flere. — 1910 (4): $\frac{20}{3}$ ($\frac{10}{3}$ — $\frac{1}{4}$); 1911 (7): $\frac{17}{3}$ ($\frac{26}{2}$ — $\frac{2}{4}$).

Efteraar. — Storehedinge. September: 16de Træk; Oktober: 5te 10 > V. — Arninge. September: 7de 1.

80. *Pernis apivorus*, Hvepsevaage¹.

Foraar. — Randers. Maj: 5te 5 »store Rovfugle« kredser 4 Eftm. > N. O. — Kolding. Maj: 28de 1(?) 400 M. h. > N. over Bæltet. — Kerteminde. Maj: 28de 2 + 14—15, 1 > N. O. — Nakkebølle. Maj: 28de over Storebælt 1 + 1 + 4 > N. O. — Korsør. Maj: 28de 2 kredser højt > N. enkeltvis. — Storehe-

¹ Enkelte af de anførte Meddelelser er paa Skemaerne opført som Musvaage, men paa Grund af de sene Data er det sandsynligt, at det har været denne Art.

dinge. Maj: 23de 20 + 60. — Arninge. Maj: 24de 1. — 1911 (6):
27/5 (23/5—28/5).

81. *Milvus iclinus*, Glente.

Foraar. — Silkeborg. Marts: 26de. — Kerteminde. Maj:
27de. — Faxe. Marts: 10de 1 > N.

82. *Circus æruginosus*, Rørhøg.

Foraar. — Tranekjær. April: 14de 1 (sp.?). — Faxe. Marts:
5te 1 > N.

83. *Circus cyaneus*, Blaa Kærhøg.

Foraar. — Bølling Sø. Maj: 2den 1 (sp.?) > N. O.

84. *Accipiter nisus*, Spurvehøg.

Foraar. — Randers. April: 17de 1 > N. O., 28de 1. — Bøl-
ling Sø. Overvintrende. April: 13de 1 > N., 15de 1, 19de 1;
Maj: 5te 1 > N. — Silkeborg. Maj: 9de. — Kolding. Januar:
8de 1; Maj: 4de lavt > S., 7de 1 kredsede sig op. — Kerte-
minde. Maj: 5te. — Arninge. Januar: 30te 1; Februar: 10de
1; Marts: 11te 1.

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 5te 1, 6te 2 > S., 8de
1 > S., 17de 2, 24de 1, 29de 1 > S. O.: November: 1ste 1 >
S. V., 10de 1 > S. V., 11te 1, 13de 1 > V., 16de 1, 22de 1, 24de
2; December: 1ste 1, 2den 2, 6te 1, 10de 1, 15de 1. — Kolding.
August: 19de 1. — Kerteminde. December: 3dje (Snave). —
Korsør (M. Klinge). Oktober: 6te flere > S., 7de Kl. 9³⁰—10³⁰ 5
enkelte > S. over Korsør Nor. — Storehedinge. September: 16de
Træk; December: 19de 2. — Arninge. September: 7de 1, 21de 1.

85. *Astur palumbarius*, Duehøg.

Foraar. — Roskilde (N. Christiansen). Maj: 22de 1 Bogenæs
Skov.

86. *Pandion haliaëtus*, Fiskeørn.

Foraar. — Kerteminde. April: 6te 1 ad. — Roskilde (N.
Christiansen). Februar: 1 skudt i Bogenæs Skov.

87. *Otus brachyotus*, Mose-Hornugle.

Foraar. — Thisted. April: 14de 1.

88. *Otus vulgaris*, Skov-Hornugle.

Foraar. — København K. (N. Christiansen). April: 14de 1.
— Faxe. April: 30te rugende.

89. *Athene noctua*, Kirkeugle.

Foraar. — Kerteminde. I December og Januar nogle faa.

Efteraar. — Kerteminde. Oktober: 9de flere om Aftenen;
December: 16de og 18de 3 (Snave, Hindsholm).

90. *Columba oenas*, Huldue.

Foraar. — Aalborg. April: 16de 1.

91. *Columba palumbus*, Ringdue.

Foraar. — Randers. Januar: 21de 50; Marts: 5te 100, 19de 10, 26de 10; April: 2den 10, 9de 10 + 18, 16de 30, 17de 30. — Wedelslund (Aarhus): Store Flokke overvintrende. — Bølling Sø. Marts: 23de 1 > N., 30te 2 > N. — Silkeborg. Januar: 3dje; April: 1ste. — Kerteminde. April: 12te; Maj: 25de. — Nakkebøllefjord. Januar: 8de ses stadig, 31te nogle. — Storehedinge: overvintrende. — Almindingen. Januar: 18de; April: 9de alm.

Efteraar. — Snave, Hindsholm (Johs. Larsen). December: 2den, 3dje, 16de.

92. *Caprimulgus europæus*, Natravn.

Foraar. — Silkeborg. Maj: 24de.

93. *Cypselus apus*, Mursvale.

Foraar. — Aalborg. Maj: 21de 3. — Randers. Maj: 13de 3, 16de 7, 17de ret talrig, 18de talrig, 28de Kl. 9⁵⁸ Morgen 9 > Ø. — Kolding. Maj: 11te 3, Aften mange, 12te mange, 13de i fuldt Tal(?). — Nakkebøllefjord. Maj: 29de 10 > N. O. lavt over Storebælt. — Tranekjær. Maj: 12te. — Hillerød. Maj: 13de. — København. 1) Maj: 12te 7⁴⁵ Aften 2, Kristiansborg-Langebrog, 13de 7—8 sammesteds Kl. 10 Fm., 14de 6—7 Morgen i større Tal, Frue Kirke, 16de stort Antal, vist paa Træk, 19de og 20de paafaldende faa, 24de, 28de den ynglende Bestand ankommen (R. Stamm); 2) Maj: 14de 2, 15de 2, 16de 4—5, derefter daglig (A. Fløystrup). 3) Maj: 16de flere, Amalienborg Plads (N. Christiansen). — Storehedinge. Maj: 12te 1, 13de 4, 14de 6, 15de omtrent i normalt Antal. — Arninge. Maj: 11te 2, 12te, 13de 2 Par, 14de 10, 18de, 22de, 27de Æg. — 1910 (10): $12/5$ ($26/4 - 21/5$); 1911 (11): $13/5$ ($9/5 - 21/5$).

Efteraar. — Kolding. August: 9de endnu fuldt Tal, 10de Morgen nogle, Aften 4, 11te Morgen 5, 12te 3, 13de 2, 14de ingen, 22de 4. — Nakkebøllefjord. August: 22de 30 fløj over Æftm.; September: 26de 1 Aften. — København Ø. August: 1ste 4, 2den 4, 3dje 3, 4de 3, 5te 2, 6te 3, 7de 3, 8de 4, 10de 1, 23de 8—9, 28de 1. — Storehedinge. August: 23de forsvunden paa enkelte nær. — Arninge. August: 8de, 10de, 11te, 12te ingen.

94. *Alcedo ispida*, Isfugl.

Foraar. — Silkeborg. Marts: 27de 1 Par; Maj: 16de, sikkert ynglende. — Nakkebøllefjord. Marts: 31te 1.

Efteraar. — Kolding. September: 18de 1, 25de 1. — Nakkebøllefjord. Juli: 22de 1; September: 8de 1, 12te daglig, 16de stadig, 27de 2, 28de 2; Oktober: 3dje ses stadig, 4de, 8de, 10de, 12te 2, 17de stadig, 19de, 28de; November: 3dje, 5te, 10de, 14de 2, 24de jævnlig; December: 1ste 1, 10de, 18de, 25de.

95. **Cuculus canorus**, Gøg.

Foraar. — Thisted. Maj: 13de. — Aalborg. Maj: 20de 2, 21de parrede sig. — Wedelslund (Aarhus). Maj: 13de. — Bølling Sø. Maj: 13de. — Silkeborg. Maj: 7de. — Kolding. Maj: 19de hørt, 21de. — Kerteminde. Maj: 15de. — Nakkebøllefjord. Maj: 6te hørt. — Tranekjær. Maj: 9de. — Hillerød. Maj: 6te Kl. 6 Morgen hørt. — Slangstrup. Maj: 7de hørt (R. Stamm). — Amager. Maj: 15de (R. Stamm). — København Ø. Juni: 1ste 1 i Østre Anlæg. — Jonstrup Vang. Maj: 14de hørt (N. Christiansen). — Storehedinge. Maj: 7de. — Faxe. Maj: 10de hørt. — Arninge. Maj: 8de 2, 22de 1, 25de. — Almindingen. Maj: 2den enkelte, 7de almindelig. — 1910 (9): $15/5$ ($12/5$ — $22/5$); 1911 (18): $12/5$ ($2/5$ — $1/6$).

96. **Iyux torqvilla**, Vende-hals.

Foraar. — Aalborg. Maj: 14de hørt, 15de 1, 16de 1, 23de stadig; Juni: 6te yngler her, 10de Unger. — Kerteminde. Maj: 26de.

97. **Gecinus viridis**, Grønspet.

Foraar. — Randers: faatallig overvintrende. — Silkeborg. Februar: 7de.

98. **Garrulus glandarius**, Skovskade.

Foraar. — Aalborg. 2 Stk. overvintrende, forsvandt i Marts. — Randers: ret talrig overvintrende. — Nakkebøllefjord. Januar: 8de en Del, 31te stadig nogle; Marts: 16de forsvunden; April: 19de 11, 30te stadig 11. — Tranekjær: Marts: 22de 4—5; April: 20de. — Almindingen. Marts: 3dje 10.

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 8de 1 > S. V.

99. **Nucifraga caryocatactes**, Nøddekrige.

Efteraar. — Storehedinge. September: 20de 1 skudt Arnøje pr. Storehedinge (var. *macrorh.*), 25de 1 skudt (var. *macrorh.*); Oktober: 4de 1 (var. *macrorh.*) skudt ud af en Flok paa 3—4 Stk., 11te 1 (var. *macrorh.*) skudt paa Gjorslev, 13de 1 (var. *macrorh.*) skudt ved Lillehedinge.

100. **Corvus monedula**, Allike.

Foraar. — Randers: ret talrig overvintrende; Februar: 27de

10, 28de tiltaget i Antal; Marts: 12te c. 25. — Bølling Sø. Marts: 20de 4 > N. O.; April: 2den 2 > N. O., 22de 2 > V., 27de 2 > V.; Maj: 11te 2 > V. — Kerteminde. Februar: 6te, 23de, 24de flere Hundrede, 27de; April: 9de. — Tranekjær. Februar: 21de Træk begyndte, ophørte 13de Marts, 22de, 23de, 24de og 28de til 31te Marts Træk (se under *C. cornix*). — Hillerød. Februar: 26de livligt Træk om Eftm. > Ø. højt. — Storehedinge: overvintrende.

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 5te 5 > S., 9de 7 > S., 10de 50 > S., 14de 100 > S., 15de 11 > S., 17de 8 > S. O., 24de 2 > S., 30te 4 > S. — Kerteminde. November: 7de 8. — Nakkebøllefjord. Oktober: 10de Morg. nogle Flokke > V. N. V., 18de nogle > S. V., 29de store Flokke > N. V. — Korsør (M. Klinge). Oktober: 7de Kl. 9³⁰—9⁴⁰ 2 Flokke > S. over Korsør Nor. — København Ø. November: 18de 1. — Arninge. Oktober: 15de 8—10 Fm. 3 store Flokke > S. V.

101. *Corvus frugilegus*, Raage.

Foraar. — Thisted. Overvintrende. — Randers. Ret talrig overvintrende. — Bølling Sø. Marts: 21de 1 > N.; April: 7de 2 > N., 19de mange sammen med *C. cornix* > N., 27de 4 > N.; Maj: 11te 3 > N., 13de 5 > S. — Nakkebøllefjord. Januar: 8de jævnlig, 28de ved gammel Yngleplads. — Tranekjær. Trækket falder sammen med *C. cornix* Træk, se under denne. — Storehedinge. Overvintrende. — Arninge. Marts: 8de 6—8; April: 16de 10. — Almindingen. Januar: 13de mange.

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 6te 12 > S. — Kolding. November: 5te 20. — Nakkebøllefjord. Oktober: 6te Morgen trak et Par Flokke over ret højt, 18de nogle > S. V., 29de nogle Flokke > N. V.

102. *Corvus cornix*, Krage.

Foraar. — Randers. Talrig overvintrende. Marts: 1ste meget talrig, 6te mange enkeltvis > N. 8³⁰—9 Fm., 10de talrig paa Gennemrejse, 11te faa > N. Kl. 8^{1/2}, 12te faa > N., 18de 8—8³⁰ Fm. enkelte > N., 23de 8²⁵ 1 > N., 8³⁰ 1 meget højt > N.; April: 1ste 8³⁰ Morgen 4 højt > N. O., 8de 8³⁰ 3 > N., 9de og 10de stort Træk 10—12 Fm. > N., 17de 5 > N. 8²⁰, 1 > N. 11¹⁰, 18de 8¹² 6 > Ø., 23de 9⁵⁰ 11 > N. — Bølling Sø. Marts: 31te c. 20 > N.; April: 2den 10 > N., 7de 10 > N. 13de 10 > N., 14de enkelte > N., 18de 8 > N., 19de 200 sammen med *C. frug.* > N., 23de 6 > N. — Kolding. Februar: 23de Kl. 2 Eftm. 5

> N. — Nakkebøllefjord. Januar: 8de store Flokke; Marts: 21de nogle trak; April: 2den Eftm. uafbrudt Træk > N. O., dels enkeltvis, dels i Flokke. — Tranekjær. Februar: 21de. Trækket af *C. cornix*, *frug.* og *moned.* begyndte og holdt op 13de Marts; Marts: 22de Trækket atter begyndt, 23de, 24de, 30te, 31te. »*Corvus*-Træk« Marts: 28de; April: 2den og daglig fra 7de til 21de. »Trækket foregaar > N. og som Regel om Fm. til 11—12 Tiden, om Eftm. fra 2—3 Tiden til Skumringen. Samtidig med Trækket foregaar et Træk af Smaafugle, rimeligvis *Fr. coelebs*«. — Hillerød. Februar: 27de stort Træk ankommen. — København: Kragerne forsvandt ved Midten af April.

Efteraar. — Randers. Oktober: 24de mange > S., ligeledes 25de. — Bølling Sø. Oktober: 6te 50 > S., 7de 50 > S., 8de 12 > S., 9de 200 > S., 10de 10 > S., 14de 1000 > S., 15de 50 > S., 16de 200 > S., 17de 100 > S., 18de 100 > S., 19de 50 > S., 20de 100 > S., 26de mange > S. S. V. — Kolding. Oktober: 7de en Del > S. Kl. 2³⁰; November: 14de 2 højt S. S. V. — Kerteminde. Oktober: 5te flere Flokke højt > V. S. V. — Nakkebøllefjord. Oktober: 9de nogle > S. V., 28de en Del enkeltvis > S. V. hele Dagen, 29de Fm. til Kl. 2 Eftm. ustandselig Træk > S. V., mest enkeltvis, af og til mindre Flokke, snart højt, snart ganske lavt. — København Ø. Indfandt sig midt i Oktober, blev talrigere i November, daglig indtil op imod 100, ligeledes December (lokalt Træk). — Arninge. Oktober: Indvandring i Midten af Maaneden.

103. *Corvus corax*, Ravn.

Foraar. — Silkeborg. Maj: 15de en enkelt. — Hillerød. Januar: 29de ved Ynglested; Marts: 18de Æg. — Roskilde (N. Christiansen). Marts: 19de rugende i Bogenæs Skov. 2 Par opholdt sig der hele Vinteren, det ene forsvandt; April: 23de næsten helt beffjedrede Unger. — Københavns Omegn (N. Christiansen). Maj: 17de hørt ved Ynglested i Dyrehaven.

104. *Lanius collyrio*, Tornskade.

Foraar. — Storehedinge. Maj: 26de 2 ♂ 1 ♀; Juni: 2den flere. — Faxe. Maj: 11te 1. — Arninge. Juni: 19de.

105. *Lanius excubitor*, Stor Tornskade.

Foraar. — Randers. Januar: 20de 1. — Silkeborg. Februar: 24de; Marts: 12te. — Tranekjær. April: 1ste 1. — Hillerød. Marts: 28de 1 Gel Skov. — Storehedinge. Januar: 14de 1. — Almindingen. Januar: 13de 2.

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 18de > S. O. — Storehedinge. Oktober: 10de 1.

106. *Hirundo riparia*, Digesvale.

Foraar. — Aalborg. Maj: 29de. — Randers. Maj: 8de faa. — Bølling Sø. Maj: 9de 1 > N. — Kolding. Maj: 3dje 2, 15de nogle. — Kerteminde. Maj: 22de. — Nakkebøllefjord. April: 27de nogle. — Tranekjær. April: 27de. — Faxe. Maj: 5te 3. — 1910 (6): $\frac{6}{5}$ ($\frac{22}{4}$ — $\frac{16}{5}$); 1911 (7): $\frac{6}{5}$ ($\frac{27}{4}$ — $\frac{22}{5}$).

Efteraar. — Bjerringbro. Oktober: 4de Træk. — Randers. August: 20de samler sig mod Aften i Hundredevis paa Siv i Randers Fjord, 31te 2 Stk., de sidste. — Kolding. August: 26de endnu gaa mange i Rederne. September: 6te nogle, 22de nogle, 30te 2—3. — Nakkebøllefjord. August: 18de flokkes med *rustica*, 24de i Hundredevis, 25de flere Hundrede i Flok; September: 12te mange, 21de et Par Hundrede, 28de talrig; Oktober: 3dje langt over 100, 4de talrig, 6te en Del, 8de i ret stort Tal, 29de 2.

107. *Hirundo urbica*, Bysvale.

Foraar. — Aalborg. Maj: 29de; Juni 4de kun faa. — Wedslund (Aarhus). Maj: 10de 1 Par, 11te 3 Par, 12te 12 Par. — Kolding. April: 30te 1; Maj: 3dje 1, 4de 4, 15de nogle. — Kerteminde. Maj: 22de, 29de, 30te, 31te. — København Ø.: Ingen i Maj. Juni: 9de 1, 12te 1, 20de 2. — Korsør. Maj: 7de. — Storehedinge. Maj: 19de 1, 20de 1, 25de sparsomt tilstede. — Faxe. Maj: 13de nogle, 15de Resten ankommen. — Arninge. Maj: 22de enkelte. — 1910 (5): $\frac{13}{5}$ ($\frac{28}{4}$ — $\frac{21}{5}$); 1911 (8): $\frac{17}{5}$ ($\frac{30}{4}$ — $\frac{9}{6}$).

Efteraar. — Bjerringbro. Oktober: 4de stort Træk. — Kerteminde. Oktober: 2den, 4de, 6te, 7de, 8de. — København Ø. August: 15de en enkelt mellem 30 *rustica*, 16de 2—3, 17de 1—2, 22de 10, 24de 7—8, 25de 6—7, 28de 4—5, 30te 2—3, 31te 1; September: 3dje 1, 4de 1, 5te 2, 9de Kl. 7³⁰ Fm. 100 Svaler, dels *rustica*, dels *urbica*, 10de Morgen og ved Solnedgang 40—50 Svaler, flest *rustica*. — Storehedinge. September: 30te forsvunden.

108. *Hirundo rustica*, Forstuesvale.

Foraar. — Aalborg. Maj: 7de 2, 17de stadig kun 2, 18de 8, 20de flere, ikke mange. — Randers. Maj: 4de 1, 7de faa, 8de tiltaget, 9de stærkt tiltaget, 12te talrig. — Bølling Sø. Maj: 3dje 1 > N. V., 8de nogle. — Silkeborg. Maj: 12te. — Kolding. April: 23de 1, 26de 6, 27de 2, 28de 5, 30te 12; Maj: 1ste 20, 3dje 30, 4de 60, 5te en Del, 7de ligeledes, 12te overalt, 2 lavt over Fjorden > N. N. O., 2 > N. N. O. — Kerteminde. April:

23de. — Nakkebøllefjord. April: 26de, 27de en Del, 30te 30 i Flok. — Tranekjær. April: 27de; Maj: 1ste lille Træk ank., 4de flere ank., 5te de fleste ank. — Hillerød. Maj: 2den Morgen Kl. 7¹⁵ 1, 3dje 1, 4de Kl. 11³⁰ Fm. faa, Eftm. 1 i St. Lyngby, Aften Kl. 7 flere, 7de lidt talrigere, 14de talrig overalt. — København Ø. Maj: 7de 2, 8de 2, daglig derefter. — Københavns Omegn. Maj: 1ste ved Søborg Mose (N. Christiansen). — Storehedinge. Maj: 3dje 1, 7de 5, 8de 2, 9de 2, 10de flere, 11te enkelte, 12te 8, 15de omtrent normalt Antal. — Faxe. April: 28de 1; Maj: 2den 1, 5te 3, 9de stadig kun en enkelt, 12te langt talrigere, 15de Resten ank. — Arninge. Maj: 2den 2, 3dje 1, 7de, 8de, 14de almindelig. — Almindingen. Maj: 2den enkelte, 14de almindelig. — 1910 (12): $\frac{8}{5}$ ($\frac{20}{4} - \frac{12}{5}$); 1911 (13): $\frac{1}{5}$ ($\frac{23}{4} - \frac{12}{5}$).

Efteraar. — Bjerringbro. Oktober: 4de stort Træk. — Randers. August: 25de flokkes, 31te 13 paa Træk 7³⁰ Aften; September: 7de mange paa Gennemrejse, 18de faa, 19de ingen, 20de faa, 21de faa, 26de faa, 27de ingen, 28de 5; Oktober: 1ste faa, 2den faa. — Kolding. August: 21de flere Hundrede paa Telefontraade; September: 10de Lillebælt 13 > V., 3 > V., 19de 50 > S. V., 25de 20 > S., 28de 300 i Rør, 30te 500 i Rør; Oktober: 3dje flere Hundrede i Rør, 4de faa, 5te 20, 6te faa, 13de 25, 19de 1; 20de ingen, 21de 20, 22de og 23de 3, 24de 1. — Fredericia (Hagerup). Oktober: 17de 4—5. — Kerteminde. Oktober: 10de 1, 20de 1. — Nakkebøllefjord. August: 18de flokkes med *riparia*, 24de i Hundredevis; September: 12te mange, 28de talrig; Oktober: 3dje flokkevis, 4de talrig, 6te en Del, 8de ret stort Antal, 10de nogle, 12te en Del, 22de 5—6, 28de 4, 29de 50; November: 3dje 6, 4de 12, 5te 15, 7de 15, 8de ligeledes, 10de som sædvanligt, 15de lidt aftaget, 17de 2, 19de, sidste saas. — København Ø. August: 15de 30, 28de Aften mange; September: næsten daglig, aftagende mod Maanedens Slutning, dog 30te 15; September: 4de Aften 100, 9de 7³⁰ Fm. 100, sammen med *urbica*, 10de 40—50 tidlig Morgen og ved Solnedgang, mest *rustica*; Oktober: daglig til midt i Maaneden, 4de 30 i Flok, saas sidste Gang 15de. — København K. (N. Christiansen). Oktober: 5te en Del, 8de flere. — Storehedinge. Oktober: 1ste 6, 2den ingen, 4de 7 højt > S. — Arninge. September: 2den store Flokke, 4de faa, 5te i Flokke, 7de enkelte, 11te enkeltvis og i Flokke, 13de Smaaflukke, 18de en Flok, 19de, 20de, 25de; Oktober: 3dje enkelt, 5te 1.

109. *Sitta europæa*, Spetmejsse.

Foraar. — Randers. Faatallig overvintrende. — Silkeborg. Januar: 20de. — Kerteminde. April: 19de. — Arninge. Overvintrende.

110. *Alauda arborea*, Hedelærke.

Foraar. — Silkeborg. Marts: 9de. — København Ø. April: 9de 1 fløj syngende over Anlægget Kl. 7³⁰ Morgen.

111. *Alauda arvensis*, Lærke.

Foraar. — Aalborg. Nogle overvintrende. Marts: 12te ank., 13de Træk. — Bjerringbro. Enkelte overvintrende. Januar: 15de Træk sikkert ank., en Mængde her. — Randers. Ret talrig overvintrende. Februar: 19de talrig, Træk ank., 24de flokkevis, 27de meget talrig; Marts: 5te, 15de, 17de, 26de paa Gennemrejse. — Bølling Sø. Tildels overvintret. — Kolding. Februar: 19de 6 > N., 23de 60 i Smaaflokke > N. og N. N. O. Kl. 8⁴⁵ Morgen, 25de i Mørkningen 10 (*Alauda?*) > N. 150 M. h.; April: 7de 1 > N. V. — Kerteminde. Overvintrende. — Nakkebøllefjord. Februar: 5te talrige sang, 25de talrig; Marts: 1ste overalt paa Markerne. — Hillerød. Februar: 6te første Sang, 26de mange paa Markerne; Marts: 5te i stor Mængde paa Træk. — Københavns Omegn (N. Christiansen). April: 29de Æg. — Storehedinge. Januar: 4de 6 i Flok. — Arninge. Februar: 25de Tilløb til Sang, 27de første Sang.

Efteraar. — Bjerringbro. December: 3dje stort Træk, 21de ret store Flokke. — Kolding. September: 12te 13 + 1 + 1 > S., 13de 3 > S., 22de 3 > S., 26de 50 paa Vandrested, 29de 1 > S. S. O.; Oktober: 4de en Del, 3 > S. O., 5te en Del, 22de faa; November; 23de 14 paa Markerne, 25de 6 > N. O. — Snave, Hindsholm (Johs. Larsen). December: 1ste. — Nakkebøllefjord. September: 16de første Træk, 17de talrig trækkende, 20de faa, 22de nogle > S. V.; Oktober: 6te i Tusindvis paa Markerne, 29de enkelte; November: 5te nogle, 20de en Del, 26de nogle; December: 18de nogle, 25de 40 i Flok. — Korsør (M. Klinge). Oktober: 7de 10 > S. over Korsør Nor Kl. 9³⁰—9⁴⁰ Fm. — Amager Fællid (N. Christiansen). November: 11te enkelte.

112. *Alauda cristata*, Toplærke.

Foraar. — Randers. Ret talrig overvintrende. — Silkeborg. Januar: 10de 1 Par. — Kerteminde. Overvintrede. Februar: 15de, 23de.

Efteraar. — Bølling Sø. September: 25de 3 > S. V. (c. 8

Dage tidligere 5 > S. V.); November: 2den 1 > S. V. — Kerteminde. September: 27de, 29de; Oktober: 7de, 15de, 21de; November: 7de.

113. *Sturnus vulgaris*, Stær.

Foraar. — Thisted. Februar: 6te enkelte. — Aalborg. Februar: Masser kom Natten mellem 1ste og 2den, i Hundredevis paa Lavninger langs Stranden og paa Telefontraade, 3dje mere fordelt, fra nu af almindelig; Marts: 12te flere ankommen, 13de Træk, 18de og 19de i Smaaflokke > N. og Ø., 28de 8 > Ø., Flokke > O. N. O., ligeledes 29de, 31te Eftm. store Flokke > O. N. O.; April: 19de Kl. 7 Eftm. mange Flokke > Ø. S. Ø. — Bjerringbro. Enkelte overvintrede. Februar: 1ste 8—10 Par. — Randers. Februar: 18de 5, 19de 5, enkelte i Omegnen, 25de enkelte, 28de talrig. — Aarhus (Wedelslund). Februar: 1ste 2. — Bølling Sø. Februar: 23de ank.; April: 13de 20 > N. — Silkeborg. Februar: 3dje 2. — Kolding. Januar: 27de 1, 28de 60, 30te 1 + 1 + 2 + 2, 8 > S.; Februar: 6te 70, 8de 100, 16de jævnlig, 19de overalt, de fleste ank.; Marts: 5te 200 i Flok. — Kerteminde. Februar: 20de, 21de, 23de, 24de mange, 25de, 27de; Marts: 5te mange. — Nakkebøllefjord. Februar: 25de ved Kasserne, c. 200 i Mosen; Marts: 2den, hyppig, ikke fuldt Antal. 8de fuldtallig. — Hillerød. Januar: 15de Eftm. 1 over, 30te 1, 31te 1; Februar: 13de—16de enkelte, 18de 1 over, 19de 14 i Flok; Marts: 4de ikke helt alm., ingen i Skoven, 10de overalt, alle ank., i Aar ligeledes først i Byens vestlige Del. — København Ø. Januar: 14de 3, 23de 2, 24de 5, 27de 1, 28de; Februar: 3dje 1, 5te 1, 6te 3, 10de 1, 12te 1, 13de 2, enkeltvis hele Maanednen; Marts: 14de talrigere. I de følgende Maaneder daglig i vekslende Antal; Juni: 21de 60—70 i Flok. — Københavns Omegn (N. Christiansen). Maj: 1ste Aften i Tusindvis i Rørene ved Søborg Mose. — Korsør. Overvintrende. — Storehedinge. Februar: 5te 1, 21de enkelte, 22de adskillige. — Faxe. Februar: 18de 2; Marts: 1ste mange. — Arninge. Omtrent 30 overvintrede. Februar: 26de 10, 27de 1; April: 17de Æg. — Almindingen. Februar: 25de 2. — 1910 (8): $1\frac{1}{2}$ ($2\frac{2}{3}/1 - \frac{4}{3}$); 1911 (12): $1\frac{1}{2}$ ($2\frac{7}{1} - 2\frac{5}{2}$).

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 7de 500 > S. V., 9de 1000 > S. V., 10de flere Tusinde > S. V., 14de mange, sidste større Træk, 15de enkelte > S., 27de 4 > S., 30te 20 > S. V.; November: 2den 10 > S. V., 4de 5 > S. V. — Kolding. August: 8de 200, 12te 1000 i Rør, 14de 5000, 19de 5—10,000, 22de 5000,

23de første Gang ved Rede; September: 13de 20,000, 19de 20,000; Oktober: 23de 300, 26de 100; November: 22de 5. — Viborg (Hagerup). December: 25de 20 + 12, 30te 25, 31te 25. — Snave, Hindsholm (Johs. Larsen). December: 16de 1. — Nakkebøllefjord. August: 30te ved Kasserne; Oktober: 3dje store Flokke, 19de næsten forsvunden fra Kasserne; November: 6te 2, 8de 200, 10de 1, 28de 5; December: 1ste 6 fløj over, 25de 1 (med beskadiget Ben). — Korsør (M. Klinge). Oktober: 7de Kl. 9³⁰—9⁴⁰ 15 > S. over Korsør Nor. — København Ø. August: 5te 2, 10de 1, 25de 4, 28de 1, 30te 1; September: daglig i mindre Tal, 4de og 11te mod Aften store Flokke; Oktober: talrig til Midten af Maaneden, derefter faa og ikke daglig; November: af og til 1 à 2, sidste bemærket 24de. — Storehedinge. Oktober: 15de stærkt aftagen. — Arninge. September: 2den stor Flok, 7de i Flok; Oktober: 6te mindre Flokke; November: 3dje nogle.

114. *Troglodytes parvulus*, Gærdesmutte.

Foraar. — Randers. Enkelte overvintrende. Marts: 1ste 8, Træk ank., 2den 1, 3dje 2, 4de 10, Træk ank., 6te 1, 8de faa, 12te 1, 14de faa, 15de 2, 16de 1, 19de faa paa Gennemrejse, 31te 1; April: 2den Træk ank., 9de talrig paa Gennemrejse, 17de, 23de paa Gennemrejse. — Silkeborg. Februar: 5te; Marts: 13de første Sang. — Kolding. Januar: 28de paa Vandrested; Februar: 8de første Sang. — Kerteminde. Februar: 25de synger. — København Ø. Januar: hele Maaneden, dog ikke daglig; Februar og Marts jævnlig, ringe Antal; April: 8de sidste bemærket. — Almindingen. April: 7de.

Efteraar. — Randers. Oktober: 4de paa Vandring. — Bølling Sø. Oktober: 24de 1; November: 13de, 15de og 21de 1. — Kolding. November: 9de synger. — Nakkebøllefjord. November: 10de synger. — Korsør (M. Klinge). Oktober: 6te talrig paa Gennemrejse, 7de ligeledes ved Korsør Nor. — København Ø. Oktober: 12te første, derefter en enkelt saavel i Novbr. som Decbr.

115. *Certhia familiaris*, Træpikker.

Foraar. — Randers. Faatallig overvintrende. — Silkeborg. April: 17de et Par. — Kerteminde. April: 3dje. — København Ø. Marts: 17de 1. — Almindingen. April: 7de.

Efteraar. — København Ø. December: 21de, 25de og 30te 1.

116. *Accentor modularis*, Jernspurv.

Foraar. — Thisted. April: 2den. — Randers. Marts: 20de 1; April: 2den 10, 9de ret talrig paa Gennemrejse, 17de paa

Gennemrejse. — Silkeborg. April: 28de. — Kolding. Marts: 1ste sang; April: 6te sang. — Kerteminde. Enkelte overvintrede. Marts: 24de; April: 4de, 8de, 11te derefter daglig. — Hillerød. Overvintrede. — Arninge. April: 6te 1. — 1911 (5): $\frac{23}{3}$ ($\frac{1}{3}$ — $\frac{6}{4}$).

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 10de 2. — Kerteminde. November: 7de, 9de.

117. **Parus major**, Musvit.

Foraar. — Randers. Ret talrig overvintrende. — Kolding. Januar: 20de første Sang, 28de sang kraftigt. — Nakkebøllefjord. Januar: 8de begyndt at synge. — Hillerød. Januar: 18de første Sang, 27de livlig Sang. — København Ø. Enkelte overvintrede. Februar: 1ste første Sang. Derefter enkeltvis, 29de Marts 5—6. — Arninge. Marts: 1ste Sang.

118. **Parus coeruleus**, Blaamejse.

Foraar. — Randers. Talrig overvintrende. — København. Januar: fra 22de 1—2.

119. **Parus ater**, Sortmejse.

Foraar. — Silkeborg. Februar: 5te; Marts: 20de.

120. **Parus cristatus**, Topmejse.

Foraar. — Silkeborg. Januar: 3dje, 6te; Februar: 2den, 12te; Marts: 3dje, 23de; April: 27de.

121. **Acridula caudata**, Halemejse.

Foraar. — Randers. Februar: 5te 10; Marts: 19de flere; April: 9de paa Vandring. — Silkeborg. Marts: 16de. — Kolding. Marts: 20de et Par prøver Redesteder, 25de bygger Rede, 28de 2; Maj: 2den et Par. — Hillerød. Februar: 19de en stor Flok $\frac{1}{2}$ Mil N. for Byen. — Arninge. Januar: 29de 10 i Vejlø Skov ved Nakskov.

Efteraar. — Kolding. November: 26de en Flok. — Nakkebøllefjord. December: 31te 1 Flok paa 20.

122. **Sylvia cinerea**, Tornsanger.

Foraar. — Aalborg. Maj: 15de. — Randers. Maj: 21de 1. — Bølling Sø. Maj: 17de. — Silkeborg. Maj: 21de. — Kolding. Maj: 15de 1, 17de 3 Steder. — Kerteminde. Maj: 15de, 23de, 24de, 25de, 30te. — Storehedinge. Maj: 16de 1, 18de flere. — Faxe. Maj: 11te enkelte, 20de mange. — Arninge. Maj: 17de, 19de, 22de. — 1910 (4): $\frac{14}{5}$ ($\frac{5}{5}$ — $\frac{25}{5}$); 1911 (9): $\frac{16}{5}$ ($\frac{11}{5}$ — $\frac{21}{5}$).

Efteraar. — Storehedinge. September: 26de paa Træk.

123. **Sylvia curruca**, Gjerdesanger.

Foraar. — Aalborg. Maj: 16de. — Hobro-Mariager. Maj:

28de meget talrig (M. Klinge). — Silkeborg. Maj: 13de — Kolding. Maj: 7de 2, 8de 1 ny, 9de 3 Steder. — Kerteminde. Maj: 8de, 9de, 14de, 23de. — København. Maj: 8de 1, 10de 1, 11te 2, 12te 2, 13de 2, 15de 1, derefter daglig enkeltvis. Juni: 3dje 1, 4de 1, 5te 1, 6te 1, 20de 1. — Storehedinge. Maj: 9de, 11te 1, 14de flere, 17de flere. — Faxe. Maj: 9de. — Arninge. Maj: 7de, 8de, 9de, 11te og derefter daglig. — 1910 (9): $\frac{7}{5}$ ($\frac{4}{5}$ — $\frac{12}{5}$); 1911 (8): $\frac{10}{5}$ ($\frac{7}{5}$ — $\frac{16}{5}$).

Efteraar. — Nakkebøllefjord. Juli: 26de nogle paa Vandrested. — København Ø. August: 24de 1 første, 31te 1; September: 3dje, 9de sidste.

124. *Sylvia atricapilla*, Munk.

Foraar. — Aalborg. Maj: 9de ♂, 15de ♂ og ♀. — Randers. Maj: 7de 3 ♂♂, 17de talrig. — Silkeborg. Maj: 8de. — Kolding. Maj: 5te 2—3, 10de 1. — Kerteminde. Maj: 14de ♂. — Hillerød. April: 30te i Frederiksborg Højskoles Have. — København Ø. Maj: 18de 1. — Faxe. Maj: 4de en enkelt. — Arninge. Maj: 2den synger. — 1910 (7): $\frac{2}{5}$ ($\frac{26}{4}$ — $\frac{7}{5}$); 1911 (9): $\frac{7}{5}$ ($\frac{30}{4}$ — $\frac{18}{5}$).

Efteraar. — Kerteminde. August: 28de; September: 20de.

125. *Sylvia hortensis*, Havesanger.

Foraar. — Aalborg. Maj: 16de. — Randers. Maj: 17de 1, 21de 1, 28de (Strækningen Hobro-Mariager) talrig. — Bølling Sø. Maj: 13de 2 (?). — Silkeborg. Maj: 16de. — Kolding. Maj: 15de 2—3. — Kerteminde. Maj: 15de, 17de, 23de, derefter daglig. — Nakkebøllefjord. Maj: 16de. — København Ø. Maj: 16de 1, enkelte derefter daglig, ligeledes i Juni, sidste set 14de Juni. — Storehedinge. Maj: 22de synger. — Faxe. Maj: 16de, 17de flere. — Arninge. Maj: 14de 1, 16de, 18de 21de og derefter daglig. — 1910 (7): $\frac{17}{5}$ ($\frac{7}{5}$ — $\frac{23}{5}$); 1911 (10): $\frac{16}{5}$ ($\frac{14}{5}$ — $\frac{22}{5}$).

Efteraar. — København Ø. August: 10de 1.

126. *Hypolais icterina*, Gulbug.

Foraar. — Aalborg. Maj: 22de hørt. — Randers. Maj: 21de 1. — Kolding. Maj: 16de 1, 17de 1 ny. — Kerteminde. Maj: 17de, 23de, 24de. — København Ø. Maj: 25de 1; Juni: 5te 1, 9de 1, 10de 1, 14de 1 og derefter daglig. Yngler i Ø. Anlæg. — Storehedinge. Maj: 24de synger. — Faxe. Maj: 19de, 20de 3. — Arninge. Maj: 27de 1, 29de; Juni: 2den, 23de. — 1910 (8): $\frac{22}{5}$ ($\frac{18}{5}$ — $\frac{28}{5}$); 1911 (8): $\frac{21}{5}$ ($\frac{16}{5}$ — $\frac{27}{5}$).

Efteraar. — Kerteminde. Juli: 24de, 28de.

127. *Acrocephalus palustris*, Kærsanger.

Foraar. — Kolding. Maj: 26de første.

128. *Acrocephalus arundinaceus*, Rørsanger.

Foraar. — Hobro-Mariager (M. Klinge). Maj: 28de faa. — Kolding. Maj: 15de 1. — København Ø. Maj: 14de 1, 15de 1, 16de og daglig derefter 2, en enkelt Dag 3—4; Juni: daglig 3—4, yngler i Ø. Anlæg. — 1910 (4): $\frac{16}{5}$ ($\frac{3}{5}$ — $\frac{22}{5}$).

Efteraar. — Randers. August: 20de. — Kolding. September: 13de 1 juv. — København Ø. August: 1ste 3, 3dje 2, 12te 3, 15de 1, 19de 1, 23de 1; September: 10de 2, 11te 1 sidste.

129. *Acrocephalus turdinus*, Drosselrørsanger.

Foraar. — Københavns Omegn. Maj: 27de Æg, Søborg Mose (N. Christiansen).

130. *Acrocephalus phragmitis*, Sivsanger.

Foraar. — Randers. Maj: 9de 1, 10de 1, 16de talrig, 17de og 18de ligeledes. — Kolding. Maj: 8de 1. — Faxe. Maj: 11te mange, 27de mange.

Efteraar. — Randers. August: 27de ingen ved Randers Fjord.

131. *Phyllosepustes trochilus*, Løvsanger.

Foraar. — Aalborg. Maj: 18de 1. — Randers. Maj: 9de faa, 10de faa, 17de faa, 18de talrig, 19de faa. — Silkeborg. April: 24de. — Kolding. April: 23de 2, 27de flere Steder; Maj: 1ste overalt. — Kerteminde. April: 24de, 25de, 27de; Maj: 13de, 15de. — Nakkebøllefjord. April: 21de flere sang, 27de mange synger. — Hillerød. April: 30te ved Arresø; Maj: 5te mange. — København Ø. April: 23de 1, 26de 1, 27de 2—3, 28de 1, 30te 1; Maj og Juni: daglig enkelte, sidste set 14de Juni. — København K. (N. Christiansen). Maj: 7de sang. — Storehedinge. Maj: 5te, 17de flere. — Faxe. April: 21de 1, 30te 2; Maj: 1ste flere, 3dje og 4de mange. — Arninge. Maj: 4de, 5te, 6te, 8de, 12te. — 1910 (7): $\frac{28}{4}$ ($\frac{23}{4}$ — $\frac{2}{5}$); 1911 (10): $\frac{27}{4}$ ($\frac{21}{4}$ — $\frac{9}{5}$).

Efteraar. — Randers. August: 20de paa Træk. — Nakkebøllefjord. Juli: 26de i Mængde paa Vandrested; August: 9de mange, 17de Masser, 21de ligeledes, 24de i Mængde; September: 2den nogle, aftagne i Tal, 3dje ingen, 8de enkelte. — København Ø. August: 4de 1, 6te 1, 7de 1, 8de 2, 2—3 næsten daglig; September: 9de 2, 10de 2, 16de 1, 17de 2; Oktober: 4de 2. — Arninge. August: 2den synger, 3dje ligeledes, 5te.

132. *Phyllosepustes rufus*, Gransanger.

Foraar. — Kolding. April: 21de sang.

133. *Phylloscopus sibilatrix*, Grøn Løvsanger.

Foraar. — Thisted. Maj: 14de. — Randers. Maj: 17de faa, 19de ret talrig, 21de faa, 25de 1, 28de paa Strækningen Hobro-Mariager 10. — Silkeborg. Maj: 10de. — Kolding. Maj: 9de 1, 10de en ny, 19de en ny (Vandrested?). — Københavns Omegn. Maj: 14de Jonstrup Vang (N. Christiansen). 1911 (5): $\frac{13}{5}$ ($\frac{9}{5}$ — $\frac{17}{5}$).

134. *Regulus cristatus*, Fuglekonge.

Foraar. — Thisted. April: 1ste. — Randers. Overvintrede. April: 9de ret talrig paa Gennemrejse, 17de paa Vandring, 23de ligeledes; Maj: 9de paa Vandring. — Wedelslund (Aarhus). Marts: 16de faa. — Silkeborg. Februar: 5te. — Kolding. April: 2den 2 paa Vandrested. — Kerteminde. April: 6te, 17de mange, 19de, 20de. — København Ø. Marts: 31te 1; April: 1ste, 3dje, 5te, 15de. — Almindingen. April: 7de. — 1910 (4): $\frac{2}{4}$ ($\frac{29}{3}$ — $\frac{5}{4}$); 1911 (8): $\frac{1}{4}$ ($\frac{16}{3}$ — $\frac{7}{4}$).

Efteraar. — Randers. September: 17de talrig paa Træk, ligeledes 24de. — Bølling Sø. Oktober: 4de 1, 5te 2, 14de 2, 22de 2; November: 9de 1, 14de 2, 19de 2, 24de 2, 29de. — Kolding. November: 26de nogle paa Vandrested. — Kerteminde. Oktober: 15de mange, 23de, 29de; November: 9de. — Korsør (M. Klinge). Oktober: 6te talrig paa Gennemrejse, 7de ligeledes ved Korsør Nor. — København Ø. Oktober: 7de 7. — København K. (N. Christiansen). Oktober: 26de, 27de, 28de og 29de parvis mange Steder. Arninge. Oktober: 17de, 18de.

135. *Anthus pratensis*, Engpiber.

Foraar. — Aalborg. Marts: 19de 1, 23de flere, 30te mange. — Bjerringbro. Overvintrede; Marts: 6te stort Træk. — Randers. Februar: 27de 5; Marts: 3dje 5, 8de lille Træk ank., 10de talrig 22de flere paa Gennemrejse, 31te nyt Træk; April: 25de 5 > N. Kl. 8²⁵, 27de, 28de og 30te paa Gennemrejse; Maj: 3dje Kl. 8²⁵ Morgen 2 > N. O. — Bølling Sø. Overvintrede (sp.?); Marts: 11te adskillige ank. — Kolding. Marts: 13de 1 ved Gredstedbro; April: 6te 3 paa Vandrested, 22de 10 paa Vandrested, 23de 9 Afrejse > N. N. O., 6 tilbage. — Kerteminde. Januar: 31te en enkelt. — Nakkebøllefjord. Februar: 23de 1 + 4; Marts 8de alm., 12te alm., 31te nogle. — Hillerød. Marts: 19de faa ved Arresø; April: 23de Mængder ved Arresø. — Amager (N. Christiansen). Januar: 22de (i en Kaalmark Sundbyvester: April: 29de Æg. — 1910 (6): $\frac{4}{3}$ ($\frac{25}{2}$ — $\frac{20}{3}$); 1911 (5): $\frac{9}{3}$ ($\frac{23}{2}$ — $\frac{19}{3}$).

Efteraar. — Kolding. September: 17de 1, 27de 6 > V. S. V.,

30te 1; Oktober: 4de 1; November: 8de 2. — Kerteminde. September: 30te; Oktober: 15de, 16de, 17de; November: 14de; (Snave, Hindsholm): 4de, 18de. — Nakkebøllefjord. September: 20de en Del; Oktober: 6te nogle, 17de nogle; December: 18de 1. — Amager Fælled (N. Christansen). November: 11te enkelte. — Storehedinge. Oktober: 5te talrig.

136. *Anthus aqvaticus* var. *obscurus*, Skærpiber.

Foraar. — Bølling Sø. Overvintrende (sp.?). — Kerteminde. I Januar smaa Flokke; Februar: 1ste; April: 10de, 6te. — Nakkebøllefjord. Marts: 12te nogle, April: 14de adskillige.

Efteraar. — Kerteminde. September: 21de. — Nakkebøllefjord. September: 16de 1 og 22de 4—5 (Svelmø); Oktober: 4de 1 (Svelmø); December: 18de 1, 25de 1.

137. *Anthus arboreus*, Skovpiber.

Foraar. — Aalborg. Juni: 10de nylig udrugede Unger. — Silkeborg. Maj: 14de. — Kolding. Maj: 1ste 1, 2den en anden, 8de 3 Steder. — Københavns Omegn (N. Christiansen). Maj: 27de Æg, Lille Hareskov. — Faxe. April: 27de 1 syngende; Maj: 3dje flere.

138. *Motacilla flava*, Gul Vipstjert.

Foraar. — Thisted. Maj: 12te. — Aalborg. Maj: 29de 3 Par. — Randers. April: 30te 1; Maj: 10de 8¹² Aft. 1 > N. — Bølling Sø. Maj: 2den ank. til Ynglepladserne. — Kolding. April: 30te ♂; Maj: 1ste 2—3. — Kerteminde. Maj: 7de. — Nakkebøllefjord. April: 30te 3. — Hillerød. Maj: 14de. — Københavns Omegn (R. H. Stamm). Maj: 15de flere Par paa Yngleplads, Amager. — Storehedinge. Maj: 10de 1, 16de. — Arninge. Maj: 19de 1, 20de, 21de 2, 22de. — 1910 (7): $\frac{1}{5}$ ($\frac{22}{4}$ — $\frac{13}{5}$); 1911 (10): $\frac{8}{5}$ ($\frac{30}{4}$ — $\frac{19}{5}$).

Efteraar. — Randers. August. 20de. — Kolding. August: 14de mange, 22de 10, 24de 20, 28de 30; September 2den ingen, 6te og 7de 5, 22de 1. — Arninge. August. 5te.

139. *Motacilla alba*, Hvid Vipstjert.

Foraar. — Aalborg. April: 13de 3, 14de 3. — Bjerringbro. Marts: 30te. — Randers. Marts: 29de ♂; April: 16de tiltaget, 28de stærkt tiltaget. — Bølling Sø. April: 10de 2. — Kolding. April: 3dje 2, 6te 1. — Kerteminde. April: 5te 2, 3 ♂, 6te, 24de. — Nakkebøllefjord. April: 7de. — Tranekjær. April: 7de. — Korsør. April: 7de. — Storehedinge. April: 3dje 1, 10de 1. — Faxe. Marts: 29de 2, 31te 1; April: 9de 1, 15de 1, 22de 5, 27de 1.

Almindingen. April: 12te enkelt, 25de alm. — 1910 (12): $\frac{1}{4}$ ($\frac{16}{3}$ — $\frac{15}{4}$); 1911 (13): $\frac{5}{4}$ ($\frac{29}{3}$ — $\frac{13}{4}$).

Efteraar. — Bjerringbro. Oktober: 7de. — Randers. August: 29de Træk, 31te ret talrig; September: 6te talrig gennemrejsende, 2 > S. Kl. 6⁴⁰ Aft., 26de 3 > S. Kl. 6 Aft., 28de 1. — Bølling Sø. Oktober: 5te 1 > S., 6te 1 > S. — Kolding: Juni: 29de 20; Juli: 20de 30, 25de 30; August: 11te mange, 24de 20, 28de 10; September: 6te 50, 7de 25, 12te en Del, 22de 10; Oktober: 5te 2. — Nakkebøllefjord. August: 24de en Del; September: 8de nogle, 12te en Del, 20de 1, hyppig til de sidste Dage, 22de 1, 23de 1, 27de 1, 28de 6; Oktober: 4de 1 (Svelmø), 8de 2 (Svelmø). — Storehedinge. September: 16de mange.

140. *Turdus iliacus*, Vindrossel.

Foraar. — Randers. Marts: 26de 4; April: 2den 25, 6te 4, 7de 10, 9de ret talrig, 17de meget talrig, 23de ingen. — Kolding. April: 5te 25. — Kerteminde. April: 12te. — Faxe. April: 3dje, 9de mange. — Almindingen. Marts: 1ste flere. — 1910 (4): $\frac{25}{3}$ ($\frac{11}{3}$ — $\frac{7}{4}$); 1911 (5): $\frac{1}{4}$ ($\frac{26}{3}$ — $\frac{12}{4}$).

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 15de 7 > S. O., 17de 24 > S. O., 18de 1, 26de 100 > S., 28de nogle > S.; November: 1ste 10 > S. — Kolding. November: 5te en Del, 9de ligeledes, 10de nogle, 11te 1. — København Ø. Oktober: 28de 5; November: 6te 1, 7de 1. — Storehedinge. Oktober: 5te talrig. —

141. *Turdus musicus*, Sangdrossel.

Foraar. — Thisted. April: 12te stort Træk. — Randers. April: 2den 10, 3dje 2, 6te 1, 7de 1, 9de ret talrig, 11te faa, 17de paa Gennemrejse, 29de ligeledes. — Silkeborg. Marts: 24de første Sang. — Kolding. Marts: 23de mindst 2 sang. — Kerteminde. April: 2den 2—3, 3dje, 6te derefter daglig. — Nakkebøllefjord. Marts: 16de (sp.), 27de første med Sikkerhed, 31te lille Træk. — Hillerød. Marts: 15de Kl. 8 Morgen første Sang, 27de alm.; April: 9de ved Ynglested. — Storehedinge. April: 12te 1. — Arninge. Marts: 27de 1; April: 2den 1, 5te 2. — Almindingen. Februar: 28de (sp.); Marts: 1ste flere (sp.); April: 9de store Flokke af »Drosler«. 1910 (13): $\frac{12}{3}$ ($\frac{3}{3}$ — $\frac{4}{4}$); 1911 (9): $\frac{29}{3}$ ($\frac{15}{3}$ — $\frac{12}{4}$).

Efteraar. — Kolding. Oktober: 6te 2 > S. O. — Nakkebøllefjord. September: 8de ret stort Antal; 12te en Del, 16de talrig, 20de 1, 23de nogle, 27de 1; Oktober: 29de nogle Flokke

Drosler (sp.?) > S. V., 1. — Korsør (M. Klinge). Oktober: 6te talrig paa Gennemrejse, 7de talrig ved Korsør Nor.

142. **Turdus viscivorus**, Misteldrossel.

Foraar. — Silkeborg. Marts: 22de.

Efteraar. — Storehedinge. Oktober: 10de 1.

143. **Turdus pilaris**, Sjagger.

Foraar. — Thisted. Overvintrede. — Bjerringbro. April: 17de mange, 20de. — Randers. April: 9de faa, 16de 20, 17de 40, 23de meget talrig. — Bølling Sø. April: 17de 1 > N., 22de 8 > N. V. — Kolding. April: 21de 45. — Kerteminde. April: 5te, 12te. — Hillerød. April: 2den store Flokke, 30te flere 1 Mil V. for H.; Maj: 5te i Byens Udkant. — Roskilde. April: 23de Boserup Skov (N. Christiansen). — Faxe. April: 3dje, 9de mange, 21de mange. — Arninge. April: 8de 20—30. — Almindingen. Januar: 12te 1 Flok. — 1910 (7): $\frac{20}{3}$ ($\frac{10}{2}$ — $\frac{22}{4}$); 1911 (8): $\frac{9}{4}$ ($\frac{2}{4}$ — $\frac{21}{4}$).

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 30te 30 > S.; November: 2den 500 > S., 3dje 50, 4de 30 > S., 10de 80, 13de 100 > N., 16de 50, 19de 500 > S., 21de 100, 22de 50, 23de 8, 24de 10 > S., 26de 1 > S.; December: 15de 3 > S. V. — Snave (Hindsholm) December: 10de 1, 16de flere. — Nakkebøllefjord. November: 7de lille Flok.

144. **Turdus torquatus**, Ringdrossel.

Foraar. — Thisted. April: 18de. — Tranekjær. April: 15de.

145. **Turdus merula**, Solsort.

Foraar. — Thisted. Overvintrede. April: 12te stort Træk. — Bjerringbro. Marts: 15de 1 ank. — Randers. Ret talrig overvintrende; Marts: 12te 12, 26de ret talrig; April: 4de flere paa Gennemrejse. — Bølling Sø. Marts: 14de 2, 17de 2 > N. — Silkeborg. Marts: 13de første Sang. — Kolding. Februar: 20de første Sang; Marts: 1ste 1 hvidbroget ♂. — Kerteminde. Overvintrede. Februar: 25de fløjter. — Nakkebøllefjord. Januar: 8de i Mængde, Antallet synes tiltaget i den senere Tid; Februar: 25de første Sang; Marts: 3dje næsten i fuld Sang. — Hillerød. Februar: 8de første Sang. — København Ø. Januar—Februar: Daglig i Antal indtil 5—6; Marts: lidt talrigere mod Maanedens Slutning, intet større Træk bemærkedes, 16de første Sang; April—Maj: 4—5 daglig. — Storehedinge. Overvintrede. — Arninge. Februar: 25de første Sang. — Almindingen. Januar: 18de.

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 10de 1, 12te 1, 19de 2; November: 8de 1, 9de 1. — Kolding. November: 21de mange som sædvanlig; December: 12te ingen. — Korsør (M. Klinge). Oktober: 7de talrig ved Korsør Nor paa Gennemrejse. — København Ø. August: faatallig; September: talrigere mod Maanedens Slutning; Oktober: noget talrigere de sidste Dage af Maanedens, særlig talrig 2den, 26de, 28de og 30te; November: lidt aftagende i Tal. — Arninge. Oktober: mange i første Halvdel, noget færre i sidste.

146. *Saxicola oenanthe*, Stenpikker.

Foraar. — Thisted. April: 17de. — Bjerringbro. April: 30te. — Randers. April: 23de 1. — Bølling Sø. April: 6te 1, 12te paa Ynglepladser. — Kolding. April: 22de ♂, 28de ♂, ♀. — Kerteminde. April: 16de ♀, fra 19de daglig. — Nakkebøllefjord. April: 20de 2. — Hillerød. April: 23de 1. — Storehedinge. Maj: 14de ♂, 16de enkelte. — Faxe. April: 22de 2. — Arninge. April: 23de (?), 24de 1. — Almindingen. Marts: 31 enkelte. — 1910 (7): $16/4$ ($8/4-26/4$); 1911 (10): $20/4$ ($6/4-30/4$).

Efteraar. — Storehedinge. September: 16de 1.

147. *Praticola rubetra*, Bynkefugl.

Foraar. — Aalborg. April: 22de 2 paa Yngleplads; Maj: 27de 6 Par ynglende indenfor $1\frac{1}{2}$ Td. Land Smaaplantage. — Randers. Maj: 6te 2, 7de 1. — Bølling Sø. Maj: 3de ank. til Ynglepladser. — Silkeborg. Maj: 8de. — Kolding. Maj: 12te 2 ♂♂, 1 ♀. — Kerteminde. Maj: 7de. — Københavns Omegn. Maj: 15de enkelte paa Amager. (Stamm). — Storehedinge. Maj: 10de 2 ♂♂ (sp.?), 13de 1 ♀, 14de mange, 16de ligeledes. — Arninge. Maj: 12te 2, 19de, 22de, 24de derefter daglig. — 1910 (7): $10/5$ ($2/5-21/5$); 1911 (9): $15/5$ ($22/4-12/5$).

148. *Ruticilla phoenicura*, Rødstjert.

Foraar. — Thisted. Maj: 11te mange. — Aalborg. Maj: 9de 1 ♂, 23de 1, 25de. — Bølling Sø. Maj: 12te 1, 13de 2. — Silkeborg. Maj: 13de. — Kolding. Maj: 5te 1, 12te 1, 13de 2. — Kerteminde. April: 24de, 25de, 27de; Maj: 15de. — Hillerød. April: 26de ♀. — København Ø. Bemærkedes mod Sædvane slet ikke. — København K. Maj: 5te flere paa Kastelsvolden. (N. Christiansen). — Storehedinge. Manglede paa Foraarstrækket. — Arninge. Maj: 25de 1 ♂. Halsted. — Almindingen: Manglede ganske paa Foraarstrækket. — 1910 (5): $12/5$ ($6/5-18/5$); 1911 (8): $12/5$ ($24/4-13/5$).

Efteraar. — Nakkebøllefjord. August: 24de 5—6; September: 24de 1. — København Ø. August: 25de 1, 31te 1, derefter jævnlig indtil 23de September; Oktober: 2den 1, 4de 1. — Storehedinge. September: 26de paa Træk.

149. *Erithacus rubecula*, Rødkælk.

Foraar. — Thisted. Overvintrede. — Aalborg. Enkelte overvintrede. April: 8de 2. — Randers. Enkelte overvintrede. April: 2den faa, Træk ank., 9de ret talrig, 17de Træk, 23de paa Vandring. — Silkeborg. Februar: 14de; April: 1ste første Sang. — Kolding. Marts: 21de 1; April 7de Sang. — Kerteminde. Februar: 13de; April: 1ste, derefter daglig. — Nakkebøllefjord. Marts: 31te første Sang; April: 27de synger overalt, Trækket sent i Aar. — Hillerød. Overvintrende. Januar: 29de en Del. — København Ø. Januar og Februar: enkelte; Marts: 7de første Sang. April: enkeltvis, sidste bemærket 27de. — Storehedinge. Januar: 30te 1; Marts: 16de enkelte; April: 10de 1 fundet død. — Faxe. April: 3dje; 9de mange. — Arninge. Faa overvintrede.

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 7de 1. — Kolding. Oktober: 18de 1; December: 10de 1. — Viborg (Hagerup). December: 24de 1. — Kerteminde. September: 30te; Oktober: 15de 20de; November: 21de. — Nakkebøllefjord. September: 8de, 27de; November: 10de Sang. — Korsør (M. Klinge). Oktober: 7de talrig ved Korsør Nor. — København Ø. September: 23de saas første Gang, derefter daglig; November 2—3 i første $\frac{2}{3}$ af Maaneden, en enkelt derefter. — København K. (Christiansen). Oktober: 3dje mange flere Steder, 4de mange. — Storehedinge. September: 26de paa Træk. — Arninge. Oktober; 16de 2; November: 10de, 15de og 18de synger.

150. *Luscinia philomela*, Nattergal.

Foraar. — Kerteminde. Maj: 9de, 10de og daglig derefter. — Nakkebøllefjord. Maj: 10de. — Tranekjær. Maj: 6te. — Hillerød. Maj: 8de Kl. 3⁵⁰ Morgen høres i Haven. Om Eftm. høres 3 forskellige i Byens Nærhed, der ynglede vist kun 1 Par i Byen. København Ø. Maj: 7de Sang. — Korsør: Maj: 6te. — Faxe. Maj: 10de Sang. — Arninge. Maj: 7de. — Almindingen. Maj: 7de enkelte, 14de alm. — 1910 (8): $\frac{16}{5}$ ($\frac{12}{5}$ — $\frac{24}{5}$); 1911 (9); $\frac{8}{5}$ ($\frac{6}{5}$ — $\frac{10}{5}$).

151. *Muscicapa atricapilla*, Broget Fluesnapper.

Foraar. — Thisted. Maj: 5te paa Træk i stor Mængde. — Aalborg. Maj: 16de ♂. — Bølling Sø. Maj: 13de 1. — Silke-

borg. Maj: 5te. — Kerteminde. Maj: 3dje flere ♂♂, 7de, 13de. — Nakkebøllefjord. Maj: 15de alm. — København Ø. April: 27de 1, 29de 1; Maj: 8de 1; paafaldende faa i Aar. — København (N. Christiansen). Maj: 3dje flere. — Storehedinge. Maj: 7de ♂. — Almindingen. Manglede mod Sædvane ganske paa Foraarsstrækket.

Efteraar. — Randers. August: 20de paa Træk. — Nakkebøllefjord. September: 8de. — København Ø. August: 3dje 1, 8de 1, 18de 1, 19de 1, 27de 1; September: 2den 1.

152. *Muscicapa grisola*, Graa Fluesnapper.

Foraar. — Aalborg. Juni: 1ste 1, 2den. — Randers. Maj: 28de 1 Par ved Redebygning. — Kolding. Maj: 17de 2, 18de 1 ny. — Kerteminde. Maj: 30te. — Nakkebøllefjord: Maj: 16de. — København Ø. Maj: 10de 1, 18de 1, 19de 1, 26de 1, 27de 1, 29de 2; Juni: 1ste 1, 3dje 1, 11te 1, 12te, 13de, 14de, 16de, 17de 1. — Storehedinge. Manglede paa Foraarsstrækket. — Arninge. Ikke bemærket. — 1911 (5): $\frac{20}{5}$ ($\frac{10}{5}$ — $\frac{30}{5}$).

Efteraar. — Nakkebøllefjord. August: 17de Masser, 21de og 24de ligeledes; September: 2den nogle, aftagne i Tal, 3dje enkelte, 8de. — København Ø. August: 1ste, saas den første, derefter næsten daglig indtil 25de, flest iagttaget 5te og 6te.

153. *Fringilla coelebs*, Bogfinke.

Foraar. — Aalborg. Maj: 5te færdig med Redebygning. — Randers. Talrig overvintrende. Marts: 1ste stort Træk ank., 2den talrig, ligeledes 3dje, 5te, 12te, 19de, 21de og 22de; April: 2den talrig paa Gennemrejse. — Bølling Sø. Marts: 31te 3; April: 15de 2. — Silkeborg. Marts: 1ste Sang. — Kolding. Januar: 28de 60 (18 ♂♂ 1 ♀); Februar: 20de første Sang. — Nakkebøllefjord. Februar: 23de første Sang, 25de Sang overalt; Marts: 21de trak i Smaaflukke. — Hillerød. Januar: 17de første Sang. — København Ø. Februar: 5te første Sang. — Arninge. Februar: 5te 1 ♀, 15de 6—8, mindst 1 ♀, 17de 1 ♀, 22de mange; Marts: 3dje Sang.

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 5te 3 > S. O. — Kolding. September: 25de nogle > S. S. V.; Oktober: 24de 5 > S. V. — Nakkebøllefjord. Oktober: 10de talrig, 19de talrig. — København Ø. September: faatallig; Oktober: flest bemærket 23de; November: lidt aftagende i Antal.

154. *Fringilla montifringilla*, Kvæker.

Foraar. — Randers. Februar: 28de 20 første Gang i Aar,

2 Stkr. opholdt sig her hele Marts; Marts: 1ste 15—20; April: 2den faa, 16de 30, 17de. — Bølling Sø. Tildels overvintrende. Silkeborg. Marts: 19de en lille Flok. — Tranekjær. Maj: 3dje i Sommerdragt. — 1910 (5): $28\frac{1}{2}$ ($30\frac{1}{1}-7\frac{1}{4}$).

Efteraar. — Kolding. November: 19de 1. — Kerteminde. September: 29de 20—30; Oktober: 15de. — Nakkebøllefjord. Oktober: 4de nogle, 6te nogle, 10de talrig, 12te talrig, 19de talrig, 22de talrig, 28de mange; November: 3dje mange, 5te flokkevis, 7de 1000, 10de i stort Tal, 15de mange, 24de betydeligt aftagne; December: 8de nogle, stærkt aftaget, 13de nogle. — Københavns Omegn (N. Christiansen). Oktober: 15de Tusinder i Jægersborg Dyrehave.

155. *Coccothraustes vulgaris*, Kjernebider.

Foraar. — Kerteminde. Marts: 24de 2. — København. April: 25de 1.

Efteraar. — Kerteminde. November: 28de 1.

156. *Chrysomitris spinus*, Sisken.

Foraar. — Kerteminde. Maj: 23de ♀, 24de, 25de.

Efteraar. — Bølling Sø. November: 10de 50. — Kerteminde. Oktober: 24de 10.

157. *Carduelis elegans*, Stillits.

Foraar. — Aalborg. Maj: 22de, fra Slutningen af April 12, i Dag forsvundne. — Randers. Januar: 15de 20, 22de 2 à 3; April: 6te 4, 7de faa, 11te faa, 14de faa. — Bølling Sø. Marts: 24de 2; April: 20de 3 > V. — Kolding. Maj: 17de 3 Steder. — Kerteminde. Overvintrende. — Arninge. Enkelte overvintrede.

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 5te 1, 9de 2, 25de 1, 27de 10. — Kerteminde. November: 14de, 21de. — Snave, Hindsholm. (Johs. Larsen). December: 1ste, 4de. — Nakkebøllefjord. December: 10de nogle. — Arninge. September: 4de 20, 29de 2 Flokke paa 10—12; Oktober: 20de flokkevis, 27de ligeledes; November: 28de en Flok.

158. *Ligurinus chloris*, Svenske.

Foraar. — Aalborg. April: 2den 1. — Randers. Februar: 27de 2; Marts: 1ste faa, 2den 1, 3dje 3, 4de ret talrig, nyt Træk, 6te 10, 7de 10, 8de tiltaget, 12te faa, 14de talrig, 20de ret talrig, 21de faa, 22de og 29de ret talrig; April: 6te 3, 7de 15, 8de faa, 11te ret talrig, 13de 10, 14de 20, 16de 10, 18de ret talrig, 26de talrig. — Kolding. April: 20de 1, 27de synger flere Steder, 28de flere Steder, Træk ank.; Maj: 16de fodrer udføjne Unger.

— Nakkebøllefjord. Marts: 31te lille Træk; April: 27de i de sidste Dage alm. overalt. — København Ø. Januar: 8de 3—4, 13de 2, fra 20de næsten daglig indtil 7—8 Stkr. Februar: daglig indtil 9—10; Marts og paafølgende Maaneder i vekslende Antal. — Arninge. Overvintrende.

Efteraar. — Bølling Sø. November: 21de 2, 22de 3, 26de 1; December: 10de 1, 14de 2. — Nakkebøllefjord. November: 5te 20, 26de stor Flok; December: 1ste 150, 10de 50, 18de 100. — København Ø. August: Indtil 12te omtrent daglig; September 17de 1, 26de 2, 27de 2. I de paafølgende Maaneder nu og da.

159. *Cannabina linota*, Irisk.

Foraar. — Aalborg. Marts: 30te parvis. — Randers. Februar: 26de 3; Marts: 5te faa, 8de 7⁴⁵ Fm. 5 > N., 7⁵² 1 > N., ret talrig, 23de Kl. 8³⁰ Fm. 1 > N. O., 24de 1³⁰ Eftm. faa > N. O., 26de stærkt tiltaget; April: 6te faa, 13de talrig flokkevis > Ø., 14de 100. — Bølling Sø. Marts: 20de ankom. — Kolding. Marts: 21de lille Flok sang; April: 19de 70 i Flok. — Kerteminde. I December og Januar store Flokke. — Nakkebøllefjord. Marts: 9de 4, 16de Flokke paa over 100. — Københavns Omegn. Januar: 22de stor Flok i Kolonihaverne Sundbyvester. (Christian- sen). — Arninge. Marts: 19de 20; April: 2den 100—200 (sp.?), 13de. — 1911 (6): $\frac{18}{3}$ ($\frac{2}{3}$ — $\frac{4}{4}$); 1911 (6): $\frac{16}{3}$ ($\frac{26}{2}$ — $\frac{30}{3}$).

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 9de 50. — Kolding. August: 14de 500. — Snave, Hindsholm. (Johs. Larsen). December: 1ste, 4de. — Korsør (M. Klinge). Oktober: 6te talrig paa Gen- nemrejse.

160. *Cannabina linaria*, Graasisken.

Foraar. — Randers. Februar: 19de 50 i Flok, der opholdt sig her indtil sidst i Marts, Marts: 30te faa. — Bølling Sø. Over- vintrede. — Kerteminde. Januar: nogle faa.

161. *Pyrrhula vulgaris*, Dompap.

Foraar. — Aalborg. Januar: Indtil 19de 8—10, Halvdelen af hvert Køn; Marts: 18de fløjtede. — Randers. Februar: 26de 2; Marts: 17de 2 ♂♂, 1 ♀, 26de 10, 30te ♂ ♀. — Wedelslund (Aar- hus). Enkelte. — Silkeborg. — Januar: 6te, 14de, 20de, 29de. — Kolding. Januar: 2den ♂ ♀, 21de 1; Marts: 6te 1 ♀, 19de 3 ♂♂, 3 ♀♀. — Nakkebøllefjord. Januar: 8de jævnlig i Skoven. — Hillerød. Hele Vinteren i stor Mængde, næsten daglig. Januar: 8de jævnlig i Skoven. 27de paa en Tømmerplads i Byen, 29de en Flok; Februar: 19de i Byen, 25de 3 ♀♀, 27de

10 ♂♂ og ♀♀; Marts: 18de 4 ♀♀ i St. Dyrehave. — København Ø. Januar og Februar: næsten daglig fra en enkelt indtil 5; Marts: 30te 2, sidste. — Arninge. Januar: 14de nogle, 15de 1, 23de 4; Februar: 10de 1, 13de 3—4, 14de 10, 17de 3, 19de flere, 22de 1; April: 7de 1. — Almindingen. Januar: 13de enkelte, 16de 2, 18de 2, 30te flere; Februar: 2den Flokke, 28de 3.

Efteraar. — København Ø. November: 12te 1, 20de 1, 22de 2, 24de 2.

162. *Loxia curvirostra*, Korsnæb.

Foraar. — Silkeborg. Februar: 14de; Marts: 2den, 21de, 29de.

163. *Emberiza schoeniclus*, Rørspurv.

Foraar. — Thisted. April: 16de. — Aalborg. Juni: 5te 1 Par. — Randers. Februar: 19de 2; Marts: 1ste 1 samme Sted, 12te 3, 31te tiltaget lidt, hidtil faa. — Nakkebøllefjord. Februar: 25de 3—4 ♂♂ + 1 ♀; Marts: 1ste 5—6, 8de 30 ♂♂ og ♀♀, 12te alm.; April: 9de 10. — Tranekjær. Marts: 15de 1. — Hillerød. Marts: 12te ved Buresø, Hjørnlunde. (A. Jakobsen). 19de 2 ved Arresø; April: 23de mange ved Arresø. — Korsør. Marts: 10de 1 ♂. — 1910 (4): $\frac{26}{3}$ ($\frac{13}{3}$ — $\frac{17}{4}$); 1911 (6): $\frac{12}{3}$ ($\frac{19}{2}$ — $\frac{16}{4}$).

Efteraar. — Bølling Sø. Oktober: 8de 3. — Kolding. November: 18de 1; December: 2den 1. — Nakkebøllefjord. Oktober: 8de 1 (Svelmø).

164. *Emberiza citrinella*, Gulspurv.

Foraar. — Randers. Talrig overvintrende. Marts: 14de paa Gennemrejse; April: 2den talrig p. G. — Silkeborg. Marts: 5te første Sang. — Kolding. Marts: 8de første Sang. — Nakkebøllefjord. Marts: 3die Sang.

Efteraar. — Oktober: 27de talrig paa Vandring.

165. *Emberiza miliaria*, Bomlærke.

Foraar. — Aalborg. Marts: I Slutningen flere end om Vinteren. — Randers. — Marts: 9de i de sidste Dage begyndt at forlade sit Vinterkvarter; April: 16de 7 i Flok, 28de 6. — Arninge. I Vinter næsten forsvundet, hen paa Foraaret mere og mere alm.

166. *Emberiza nivalis*, Snespurv.

Foraar. — Bølling Sø. Overvintrede. — Kolding. Februar: 25de 3; Marts: 5te 3 ♀♀. — Kerteminde. Januar: c. 20.

Efteraar. — Snave, Hindsholm (Johs. Larsen). December: 20de 3. — Nakkebøllefjord. September: 22de 1 (Svelmø). — Københavns Omegn. November: 11te mindre Flokke paa Amager Fælled (N. Christiansen).

Januar 1911	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
			Retn.	Styrke		Kl. 9 Aften — Kl. 8 Morgen		
						Kl. 8 2	Kl. 2—9	
1	75,6	3	S. V.	3	10	Tørt - klart - senere Regn	Regn	Tørt - klart
2	75	1,5	S. V.	1	10	Regn af og til	Regn af og til	Regnbyger
3	76,55	2	Ø.N.Ø.	1	10	Regnbyger	Tørt - klart	Tørt - klart
4	76,6	2,5	N. Ø.	2	10	Regn af og til	Regnbyger	Regnbyger
5	76,7	0	N. Ø.	2	10	Tørt - klart	Sne af og til	Sne af og til
6	76,3	2	S. Ø.	1	10	Sne af og til	Tørt - klart	Tørt - klart
7	76,5	1,5	S.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
8	76,75	1,5	S. V.	2	10	Tørt - klart	Lidt diset, Smaaregn af og til	Smaaregn
9	76,65	4	—	0	10	Diset - Smaaregn	Taaget	Taaget - Smaaregn om Aftenen
10	76,3	1,5	N. V.	1	7	Taaget - Hagelbyger, senere tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart, en Storm og Hagelbyge om Aftenen
11	75,95	3,5	S. V.	2	10	Tørt - klart, senere lidt Regn	Regn	Regn
12	74,6	2	N. V.	1	10	Regn omtrent hele Natten	Tørt - klart	Tørt - klart
13	75,8	÷ 1	N.N.Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
14	76,4	÷ 4	—	0	10	Tørt - klart, diset om Morg.	Taaget	Taaget, senere lidt men sigtbart
15	76,6	3	S. V.	1	10	Diset, lidt Regn	Lidt diset	Lidt diset
16	76,8	4	V.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
17	77,3	2,5	S. V.	2	3	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
18	76,95	6	N. V.	2	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
19	76,8	6,5	N. V.	2	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
20	77	5	N. V.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
21	77,1	2,5	V.	1	10	Lidt diset	Tørt - klart	Lidt diset
22	76,5	4	N. V.	2	10	Diset	Tørt - klart	Tørt - klart
23	77,5	÷ 4,5	—	0	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
24	77	÷ 0,5	S. V.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
25	76,1	3,5	S. V.	3	10	Regn	Regn	Regn
26	75,8	5	V.	1	7	Regn, senere tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
27	76,4	5,5	N. V.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
28	76,6	5	N. V.	1	10	Regn	Regn, senere tørt - klart	Tørt - klart
29	77,3	÷ 3	N.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
30	77,65	÷ 5,5	N. Ø.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
31	77,8	÷ 7	—	0	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart

Februar 1911	Baro- meter		Thermo- meter		Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
	Kl. 8	Kl. 8	Retn.	Styrke	Kl. 9 Aften—Kl. 8 Morgen			Kl. 8—2	Kl. 2—9	
1	77,5	÷ 1	N.	1	3	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart		
2	77,1	0,5	V.	1	10	Tørt - klart, Sne om Morg.	Tørt - klart	Tørt - klart		
3	76,8	1,5	N. Ø.	1	3	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart		
4	76,7	2,5	N. V.	1	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart		
5	76,4	2	N.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart		
6	77,2	÷ 4	N. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart		
7	76,7	1	N. V.	2	10	Regn af og til	Tørt - klart	Tørt - klart		
8	77,3	÷ 3	N.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart		
9	77,3	÷ 1	S. V.	2	6	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart		
10	76,85	0,5	V.	1	10	Lidt diset	Tørt - klart	Tørt - klart		
11	76,5	÷ 3	—	0	7	Tørt - klart, diset om Morg.	Tørt - klart	Tørt - klart		
12	76,7	÷ 3	Ø. N. Ø.	0	6	Tørt - klart, diset om Morg.	Tørt - diset	Tørt - diset		
13	77,5	÷ 1,5	N. V.	0	—	Rimtaage - tørt	Tørt, stærk Rimtaage	Tørt - stærk Rimtaage		
13	77	1	S. V.	1	10	Taaget	Diset	Svagt diset		
15	76,65	0	S. V.	2	10	Diset Sne	Diset Regn	Diset Regn, tørt - klart om Aftenen		
16	76,7	0,5	S. V.	1	2	Tørt - klart	Regn af og til	Regn		
17	74,6	7	V. S. V.	4	10	Regn	Regn, senere klart - tørt	Tørt - klart		
18	75	3	—	0	10	Tørt - klart, sen. diset og Regn	Regn - diset	Regn		
19	73,55	5,5	V.	3	10	Regn	Regnbyger	Regnbyger, sen. tørt - klart		
20	74,3	0	N.	3	10	Regn og Snebyger	Tørt - klart	Sne og Stormbyger		
21	75,5	÷ 0,5	N. V.	2	5	Snebyger	Tørt - klart	Tørt - klart		
22	74,6	6	S. V.	3	10	Regn	Regn	Regn		
23	74,9	4,5	S. V.	3	10	Regnbyger	Tørt - klart	Regnbyger		
24	73,35	5,5	S. V.	3	10	Storm og Regnbyger	Storm og Regnbyger	Storm og Regnbyger		
25	74,8	3	V.	2	3	Tørt - klart	Tørt - klart	Klart - tørt		
26	74,7	4	V.	0	1	Regnbyger	Klart - tørt	Klart - tørt		
27	74,9	1,5	N. V.	2	1	Klart - tørt	Klart - tørt	Klart - tørt		
28	75,9	2	S. S. Ø.	2	2	Klart - tørt	Regnbyger	Regn		

Marts 1911	Baro- meter	Thermo- meter	Vind Kl. 8		Sky- mængde	Vejrligget			
			Retn.	Styrke		Kl. 8	Kl. 9 Aften—Kl. 8 Morgen	Kl. 8—2	Kl. 2—9
1	75,1	4,5	V.	2	6	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
2	75,5	4,5	V. S.V.	3	10	Tørt - klart, senere Regn	Regn	Regn og Stormbyger	
3	76,2	0,5	N. V.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
4	76,05	5,5	V.	1	10	Regn - taaget	Taaget	Regn - diset	
5	75,6	4	N. V.	2	2	Regn, senere tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
6	75,65	2	N. V.	2	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
7	76	2	—	0	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
8	76,1	2	N. V.	1	10	Tørt - klart	En enkelt Hagelbyge, ellers tørt - klart	Tørt - klart	
9	76,15	1,5	S. Ø.	1	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
10	76	2	S. V.	1	10	Diset - Regn	Tørt - klart	Tørt - klart	
11	76,05	2,5	S. V.	2	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart, senere Regn	
12	75,8	2,5	S. V.	1	10	Smaaregn - diset	Diset, senere tørt - klart	Tørt - klart	
13	74,7	3,5	S. S. V.	1	10	Regn	Regn	Regn	
14	74,1	3	S. Ø.	2	10	Smaaregn af og til	Regn af og til	Regn	
15	74,7	3	S. Ø.	2	10	Regn af og til	Tørt - klart	Tørt - klart	
16	74,75	1	S. Ø.	2	10	Regn og Sne	Sne, senere tørt - klart	Tørt - klart	
17	75,85	3	Ø.	2	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
18	76,5	0	Ø.	2	3	Tørt - klart	Tørt - klart	En lille Snebyge, ellers tørt - klart	
19	76,65	0,5	Ø.	2	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
20	76,6	0	Ø.	2	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
21	76,55	0,5	Ø.	2	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
22	76,35	3	Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
23	76,5	1,5	N. Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
24	76	2,5	S. V.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	En lille Snebyge Kl. 4, ellers tørt - klart	
25	75,9	÷ 1	N. Ø.	3	8	Snestorm, senere klart	Snebyger, senere klart	Snebyger	
26	76,7	÷ 1	N. Ø.	3	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
27	76,6	÷ 2	Ø.	3	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
28	76,6	4,5	Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
29	76,5	3	N. Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
30	76,3	5	Ø.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
31	75,65	5,5	—	0	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	

April 1911	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
			Retn.	Styrke		Kl. 9 Aften—Kl. 8 Morgen	Kl. 8—2	Kl. 2—9
1	75,9	5,5	Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
2	75,85	5,5	S.	1	10	Diset Smaaregn	Tørt - klart, senere Smaaregn	Tørt - klart
3	75,3	÷ 0,5	N. V.	2	10	Tørt - klart	Snebyger	Snebyger, senere tørt - klart
4	76,1	0	N. Ø.	2	6	Tørt - klart	Snebyger	Snebyger
5	76,55	÷ 4	N. Ø.	1	3	Tørt - klart	Snebyger	Snebyger
6	77	÷ 1,5	N. Ø.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
7	76,9	1,5	N. Ø.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
8	76,75	4	N.	1	5	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
9	76,65	2,5	N. S. V.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
10	75,7	4,5	N. Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
11	76,5	4,5	—	0	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
12	75,95	6	N. Ø.	2	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Klart, enkelte Byger
13	76,25	4	N.	2	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
14	76,8	4	N. V.	0	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
15	76,0	6	V.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
16	75,35	7	V.	2	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
17	75,65	6	S. V.	1	5	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
18	75,85	8,5	S.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
19	75,85	9,5	Ø. S. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
20	75,9	11,5	—	0	1	Tørt - klart	Tørt - klart	En lille Regnbyge Kl. 3, senere tørt - klart
21	77,1	9	S. V.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Regn af og til
22	77,1	10	S. V.	1	10	Lidt Regn i Nattens Løb	Tørt - klart	Tørt - klart
23	76,5	11	S. V.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Lidt Regn af og til
24	75,7	10	S. V.	2	7	Lidt Regn i Nattens Løb	Lidt diset	Lidt Regn af og til
25	75,75	9,5	S. V.	1	6	Tørt - klart	Tørt - klart	Regn af og til
26	75,7	9	S. V.	1	10	Regn af og til	Regn af og til	Regn af og til
27	75,35	8	S. V.	2	10	Regn af og til	Regnbyger, lidt Torden Kl. 1	Regnbyger
28	74,35	8	S. V.	1	10	Regnbyger	En enkelt Regnbyge	Tørt - klart
29	74,7	8	S.	1	10	Tørt - klart	Regnbyger	Regn, senere tørt - klart
30	74,6	5	S. V.	2	10	Regn	Regnbyger	Regnbyger

Maj 1911	Baro- meter	Thermo- meter	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
	Kl. 8	Kl. 8	Retn.	Styrke		Kl. 9 Aften—Kl. 8 Morgen	Kl. 8—2	Kl. 2—9
1	75,3	6	V.	2	2	Tørt - klart	En lille Regnbyge, ellers tørt - klart	Tørt - klart, Regnbyger fra Kl. 7
2	76,1	8	V.	1	9	Regnbyger	Tørt - klart	Tørt - klart
3	76,1	10,5	S.	1	10	Tørt - klart	Regnbyger	En enkelt Regnbyge, ellers tørt - klart
4	75,75	10	S. V.	1	10	Tørt - klart	Regn	Regn, senere tørt - klart
5	76,05	9	—	0	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
6	76,4	10	N. N. Ø.	1	6	Lidt Regn i Nattens Løb	Regnbyger	Regnbyger, sen. tørt - klart
7	76,7	10	N.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
8	76,75	10	N. Ø.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
9	76,6	12,5	N. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
10	76,4	14	Ø.	1	3	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart, om Aftenen Lyn i Syd
11	76,35	14,5	Ø.	2	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
12	76,3	14	Ø.	2	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart (Kl. 6 begyndte det at lyne stærkt i S.S.V., kom nærmere og varede til Kl. 12)
13	75,85	15	Ø.	2	3	Lidt Regn om Natten	Tørt - klart	Tørt - klart
14	75,7	15	Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
15	75,5	14	S. V.	1	10	Regn af og til	Regn af og til	Tørt - klart
16	75,8	12	V. N. V.	1	10	Tørt - klart	Ubetyd. Byger, ellers tørt	Tørt - klart
17	76	12	S. Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
18	76	13	Ø.	1	5	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
19	76	13,8	S. Ø.	1	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
20	76,2	12	S. Ø.	2	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
21	76,5	10	N. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Lidt Regn ca. Kl. 8
22	76,3	10	N. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	En enkelt Byge
23	76	11	N. Ø.	1	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
24	76,2	11	S. V.	1	10	Lidt Regn først paa Natten	En enkelt Byge	Tørt - klart
25	76,5	11	—	0	10	Lidt Regn om Natten	Klart - en Smule Regn	Tørt - klart
26	76,8	13	S. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
27	77	12	Ø. S. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
28	77	13	N. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
29	77	13	Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
30	77	14	Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
31	77	13,5	Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart

Juni 1911	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
			Retn.	Styrke		Kl. 9 Aften—Kl. 8 Morgen		Kl. 2—9
						Kl. 8—2		
1	77	12	Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
2	77,3	12,5	Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
3	77	12	Ø.S.Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
4	76,9	13	Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
5	77	14	Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
6	77,1	15	V.	1	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
7	76,9	14	N. V.	2	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Skyet
8	76,6	14	N. V.	2	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Lidt Regn om Aftenen
9	75,8	12	N. V.	2	3	Regnbyger	Lidt Regn, sen. tørt - klart	Regnbyger
10	75,6	10	N.	1	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
11	75,7	12	V.	3	5	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
12	75,7	11	N. V.	2	9	Tørt - klart, lidt Regn af og til	Tørt - klart	Tørt - klart, lidt Regn af og til
13	75,6	11	S. V.	1	8	Regnbyger	Tørt - klart	Regnbyger
14	75,6	11,5	N. Ø.	1	9	Regn	Regnbyger	Regn
15	75,7	13	N.	1	10	Tørt - klart	Regn, senere tørt	Tørt - klart, Regn om Aftenen
16	76,2	14,5	S. V.	1	7	Regnbyger	Regnbyger	Regnbyger
17	76,2	13	N. Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Regnbyger
18	79,6	14,5	S. Ø.	1	10	Regn	Regnbyger	Regnbyger
19	75,6	15,5	S. V.	1	6	Regnbyger	Regnbyger	Tørt - klart
20	75,4	15	—	0	10	Regn	Regnbyger	Tørt - klart
21	75,9	15	V.	2	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
22	76,5	15	S.	1	6	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
23	76,4	17	S. Ø.	1	9	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
24	75,9	17	S. Ø.	1	10	Regn af og til	Regn	Regn af og til
25	76,15	16	S.	2	7	Tørt - klart	Regn af og til	Regnbyger
26	76	16	S. V.	2	6	Tørt - klart	Regnbyger	Regnbyger
27	76,1	15	S. V.	2	7	Tørt - klart	Regnbyger	Regnbyger
28	76,5	16	S. V.	2	6	Tørt - klart	Tørt - klart	Regnbyger
29	76,6	16	S. V.	1	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Lidt Regn af og til
30	75,7	14,5	S. S. V.	3	10	Regn	Regnbyger	Regn af og til

Juli 1911	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
			Retn.	Styrke		Kl. 9 Aften—Kl. 9 Morgen	Kl. 8—2	Kl. 2—9
1	75,45	15	S. V.	1	9	Tørt - klart	Regn af og til Regn af og til	Regnbyger
2	75,6	12	S.	2	8	Regn af og til	Torden fra 12—2 fra S. V.	Regnbyger
3	76	11,5	V.	3	4	Regnbyger	Regnbyger	Tørt - klart
4	76,9	13	V.	2	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
5	77	14,5	V.	1	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
6	77	16,5	V.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
7	76,8	17	V.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
8	76,6	16	S. V.	1	10	Tørt - klart	Regn	Regn, senere tørt - klart
9	76,85	16	N. Ø.	1	5	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
10	77,1	15	N.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
11	77	16,5	N. V.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
12	76,9	18	N.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
13	76,9	20	N. N. Ø.	1	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
14	76,75	16	N. N. V.	1	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
15	76,2	13	V. N. V.	2	6	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
16	76	14,5	V. N. V.	2	7	Tørt - klart	Regnbyger	Regnbyger
17	75,35	13	V.	3	4	Regnbyger	Tørt - klart	Tørt - klart, lidt Regn
18	75,4	15,5	S. V.	1	10	Regn af og til	Regn af og til, Tordenvejr med stærke Regnbyger fra 12 ¹ / ₄ —2 fra S. V.	Regn af og til
19	75,65	16	V. S. V.	2	3	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
20	76,4	14	V.	2	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
21	76,75	18	S. V.	1	8	Regn af og til	En enkelt Byge, ellers tørt - klart	Tørt - klart
22	76,75	18	S. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
23	76,7	20	N.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
24	76,55	15	N.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
25	76,55	17	Ø. N. Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Lidt Regn om Aftenen
26	76,35	17,5	Ø.	1	4	Regn, senere tørt - klart Torden og Regn, senere tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
27	76,35	19,5	S. V.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
28	76,7	19	Ø. S. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
29	76,55	17,5	Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
30	76,75	19	S. S. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
31	76,7	19	Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart

August 1911	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
			Retn.	Styrke		Kl. 9 Aften—Kl. 8 Morgen	Kl. 8—2	Kl. 2—9
1	76,85	20	S. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - let skyet, senere klart	Tørt - klart
2	76,8	19	Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - let skyet	Tørt
3	76,7	20	S.S. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - let skyet	Tørt
4	76,3	19	N. V.	1	8	Torden - Regn	Tørt - skyet	Tørt - senere Regn
5	76,3	17	—	0	4	Tørt - skyet	Tørt - let skyet	Tørt - klart - skyet
6	76	20	S.	2	8	Tørt	Tørt - skyet	Tørt
7	76,6	18	S. V.	2	10	Tørt	Tørt	Tørt
8	77,1	18	V.	1	3	Tørt	Tørt	Tørt
9	77,1	18	Ø.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
10	76,85	20	S. Ø.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
11	76,85	21	Ø.N.Ø.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
12	76,9	20	—	0	0	Tørt	Tørt	Tørt
13	76,85	20	N.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
14	76,55	20	V.N.V.	1	1	Tørt	Tørt	Tørt
15	76,6	18	N.N.V.	2	4	Tørt	Regnbyger	Regnbyger - tørt
16	75,7	14	N.	1	3	Tørt	Tørt	Tørt
17	76,05	14	N.N.V.	1	5	Tørt	Tørt	Regnbyger - tørt
18	75,7	13	V.N.V.	2	9	Tørt	Tørt	Tørt
19	75,6	14	N. V.	1	2	Tørt	Tørt	Tørt
20	75,7	14	N. V.	1	2	Tørt	Tørt	Tørt
21	75,74	12	N.N.Ø.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
22	75,2	15	N.N.Ø.	1	10	Regn	Regnbyger - tørt	Regnbyger
23	75,6	14	N.	1	4	Tørt	Tørt	Tørt
24	76,05	12	N.N.V.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
25	76	16,5	S.	1	2	Tørt	Tørt	Tørt - Regn - Tørt
26	75,9	16	N.N.Ø.	1	10	Torden - stærk Regn	Regn - tørt	Regn - tørt
27	76,2	17	S.	1	10	Regn - tørt	Tørt	Tørt
28	76,15	18	S.S.V.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
29	75,9	18	—	0	10	Tørt	Tørt	Tørt
30	76,15	14	—	0	3	Tørt - Torden - Regn	Tørt	Tørt
31	76,7	12	N.N.V.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt

September 1911	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
			Retn.	Styrke		Kl. 9 Aften - Kl. 8 Morgen	Kl. 8-2	Kl. 2-9
1	76,5	15	S. S. V.	3	10	Tørt	Tørt	Tørt
2	76,7	15	—	—	3	Tørt	Tørt	Tørt
3	76,15	14	S.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt
4	76,7	15	N. N. V.	1	2	Tørt	Tørt	Tørt
5	76,3	14,5	V.	2	10	Tørt	Tørt	Tørt
6	76,2	15	N. V.	3	10	Tørt	Tørt	Tørt
7	76,5	15	V. N. V.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
8	76,4	16	V. S. V.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt
9	75,95	13	N.	1	2	Tørt	Tørt	Tørt
10	76,45	11,5	N. N. V.	1	1	Tørt	Tørt	Tørt
11	76,8	13	S. S. V.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
12	76,65	10,5	S.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
13	76	13	S. Ø.	1	8	Tørt	Tørt	Tørt
14	76,05	13	N. N. V.	1	2	Regnbyger - tørt	Tørt	Tørt
15	76	12	N. V.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
16	76,4	10	N. N. V.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
17	76,5	11	N. N. Ø.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
18	76,45	14	V. N. V.	2	8	Tørt	Tørt	Regnbyge - tørt
19	76,1	15	V.	1	-10	Regn - tørt	Regn - tørt	Regn - tørt
20	75,75	13	S.	1	2	Tørt	Tørt	Regn - tørt
21	75	14,5	S. S. Ø.	1	8	Tørt - Regn	Tørt	Regn - tørt
22	75,5	12,5	S. S. V.	1	8	Tørt	Tørt	Tørt
23	76,15	12	—	—	6	Tørt - Regn	Tørt	Regn - tørt - Regn
24	75,95	15	S. S. Ø.	1	8	Tørt - Regn	Tørt	Tørt
25	76,25	14	—	—	10	Tørt - Regn	Tørt	Tørt
26	76,5	14	S.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt
27	76,6	11,5	—	—	10	Tørt	Tørt	Tørt
28	75,9	12,5	S. S. V.	1	10	Tørt - Regn	Regn - tørt	Regn - tørt
29	75,7	9,5	S. V.	2	3	Torden - Regn - tørt	Tørt	Tørt
30	75,8	10	S. S. V.	1	10	Tørt	Regn	Tørt

Oktober 1911	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
			Retn.	Styrke		Kl. 9 Aften—Kl. 8 Morgen	Kl. 8 - 2	Kl. 2—9
1	75,5	8	N.N.V.	1	10	Regn	Regn	Regn
2	75,45	8,5	N.N.V.	1	10	Regn	Tørt	Tørt
3	75,2	9,5	N.V.	1	10	Tørt	Regnbyger	Tørt
4	75,9	9	S.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt
5	76,55	5	N.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
6	76,8	10	N.Ø.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
7	76,5	11	Ø.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt - Regn
8	75,4	11	N.N.Ø.	1	10	Regn - tørt	Regn - tørt	Tørt
9	76,2	9	N.	1	10	Regn - tørt	Regn - tørt	Tørt
10	76,95	3	N.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
11	76,8	10	V.	3	10	Regn - tørt	Tørt	Tørt
12	76,8	10	N.N.V.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt
13	76,65	9	V.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt
14	76,4	10	—	—	10	Tørt	Tørt	Tørt - Regn
15	77,3	9	N.Ø.	1	5	Regn - tørt	Tørt	Tørt
16	77,6	5	S.S.Ø.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
17	77,6	5	S.S.Ø.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
18	77,6	2	—	—	0	Tørt	Tørt	Tørt
19	76,7	3	Ø.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt
20	76,2	5	—	—	10	Taae	Taae - klart	Taae
21	75,7	10,5	S.	1	10	Regn	Regn - tørt	Tørt
22	74,9	10	S.S.Ø.	1	10	Regn - tørt	Regn	Regn
23	74	11	S.V.	4	10	Regn	Regn	Regn - tørt
24	75	10	S.S.V.	1	10	Regn	Regn - tørt	Tørt
25	74,6	10	S.	3	10	Regn - tørt	Tørt	Regnbyger - tørt
26	74,3	8	V.S.V.	1	10	Regn - tørt	Regn - tørt	Regn
27	74	9,5	S.S.V.	2	10	Regn - tørt	Tørt	Tørt
28	74,95	5	N.	1	10	Regn - tørt	Tørt	Tørt
29	76,15	5	N.N.V.	1	10	Tørt	Regn - tørt	Tørt
30	76,5	6	S.	2	10	Tørt	Regn	Stærke Byger, tørt
31	75,75	8	S.V.	2	5	Regnbyger - tørt	Tørt	Tørt

14*

November 1911	Baro- meter	Thermo- meter	Vind Kl. 8		Sky- mængde	Vejrliget			
			Retn.	Styrke		Kl. 8	Kl. 9 Aften—Kl. 8 Morgen		Kl. 2—9
							Kl. 8	Kl. 8—2	
1	75,55	8	S.S.V.	3	8	Stærke Regnbyger	Tørt	Regnbyger - tørt	
2	76,3	7	S.S.V.	2	10	Tørt	Tørt	Tørt	
3	75,85	8	S.S.V.	1	10	Regn af og til - Morg. tørt	Regnbyger - tørt	Tørt	
4	75,4	7	S.	4	10	Regnbyger	Regn	Tørt	
5	74,4	11	S.S.V.	3	10	Regn	Regnbyger	Regnbyger - Haglvejr	
6	74,5	7	S.S.V.	4	10	Orkanagtige Vindstød med heftige Regn- og Haglbyger. Regn	Hagl- og Regnbyger - tørt	Regn	
7	75,4	6	V.	1	10	Regn - tørt	Hagl- og Regnbyger - tørt	Regn - tørt	
8	75,7	8	S. V.	2	10	Tørt	Tørt	Tørt	
9	75,4	6	S.S.Ø.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt	
10	75,7	3	S.S.V.	1	5	Tørt	Tørt	Tørt	
11	75,95	5	S.S.V.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt	
12	75,8	5	S.	1	10	Tørt	Regn	Regn	
13	75,95	7	S.S.Ø.	1	10	Regn - tørt	Tørt	Tørt	
14	76,9	7	S.S.V.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt	
15	76,15	7,5	S.S.V.	1	10	Regn	Tørt	Tørt	
16	74,5	7	S.	2	10	Regn	Tørt	Regn	
17	74,9	8	S.S.V.	1	10	Regn - tørt	Regn - tørt	Regn	
18	74,3	8	S.	1	10	Regn - tørt	Regn - tørt	Tørt	
19	73,65	7	Ø.	1	10	Regn - tørt	Tørt	Regn - tørt	
20	73,5	3	Ø.	1	10	Regn - tørt	Tørt - Regn	Regn	
21	74	4	N.N.V.	1	10	Regn - tørt - Regn	Tørt	Tørt	
22	74,6	÷ 1	—	—	2	Tørt	Sne	Sne	
23	75,8	1	N.	1	8	Sne - tørt	Sne - tørt	Tørt	
24	76,5	÷ 3,5	Ø.N.Ø.	1	0	Tørt	Tørt	Tørt	
25	76,4	÷ 2,5	Ø.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt	
26	76,7	4,5	Ø.	2	10	Tørt	Regn - tørt	Regn - tørt	
27	76,75	1,5	Ø.S.Ø.	2	10	Regn - tørt	Tørt	Tørt	
28	76,8	3	S.S.Ø.	1	10	Regn - tørt	Tørt - Regn	Regn - tørt	
29	76,8	3	S.S.Ø.	1	10	Regn - tørt	Regn - tørt	Tørt - Taage	
30	77,25	5	—	—	10	Taage	Taage	Taage	

December 1911	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
			Retn.	Styrke		Kl. 9 Aften—Kl. 8 Morgen	Kl. 8—2	Kl. 2—9
1	77,05	5	S. S. Ø.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt
2	77	4,5	S. S. Ø.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt
3	76,7	4	S.	3	10	Tørt	Tørt	Tørt
4	76,45	1,5	S. S. Ø.	3	10	Tørt	Tørt	Tørt
5	76,35	2	S. S. Ø.	2	10	Tørt - Regn	Tørt	Tørt
6	73,4	3	S. S. Ø.	1	10	Tørt	Tørt - Regn	Regn
7	76,3	3,5	—	—	10	Regn - Taage	Taage	Tørt
8	75,45	4,5	S.	1	10	Tørt - Regn	Regn - tørt	Regn - tørt
9	75,3	3,5	S.	1	10	Taage	Tørt	Tørt - Regn
10	75,7	4	S. S. V.	1	10	Tørt - Regn	Tørt	Tørt
11	74,85	2,5	S. S. Ø.	3	10	Tørt - Regn	Tørt - Regn	Regn - Sne - Tørt
12	75,4	3	S.	1	10	Regn - Taage	Tørt	Regn - tørt
13	76	3	S. S. V.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt
14	75,9	1,5	—	—	10	Taage	Tørt	Tørt
15	76	3	S. S. Ø.	1	10	Taage	Taage	Tørt
16	76	4	S. S. Ø.	1	10	Orkanagtige Vindstod - Regn	Tørt - Taage	Tørt
17	76,6	4	S. S. Ø.	1	10	Tørt	Tørt	Regn
18	76,5	3,5	S. S. Ø.	1	10	Tørt	Tørt (Solskin)	Taage - tørt
19	75,9	4,5	S. S. Ø.	1	10	Tørt	Solskin - Tørt	Regn - tørt
20	75,6	5	—	—	10	Tørt - Taage	Taage - Regn	Regn
21	74,3	6	V.	2	10	Regn	Regn	Regn
22	74,8	5	V.	1	10	Regn	Regn	Solskin - tørt - Regn
23	75	4,5	V.	1	10	Regn - tørt	Tørt	Tørt
24	75,9	1,5	V.	1	10	Regn - tørt	Tørt	Tørt - Regn
25	74,7	4	S. S. V.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt - Regn
26	74,9	2	V.	1	10	Regn - tørt	Tørt	Tørt - Regn
27	75	2	N. V.	1	10	Regn - tørt	Regn - tørt	Tørt
28	76,2	÷-0,5	N. N. V.	1	10	Tørt	Tørt	Tørt - Regn
29	75,3	3	N. V.	1	10	Regn	Tørt	Tørt
30	76,4	2,5	S. S. Ø.	1	10	Tørt	Tøsne - Regn	Regn
31	76,7	2	S. S. Ø.	1	10	Regn - tørt	Regn - tørt	Regn