

17. April Overtrukket. En svag Byge. Klarede Kl. 4. N. N. O. Blæst.
18. April Skyet. Vinden drejede N. O.—N.—V.—S.—N. O.
19. April Klart Solskin. N. O. Blæst.
20. April Overtrukket. Nordl. Blæst.
21. April Overtrukket. Byger. Vestl. Blæst.
22. April Byger. S. V. Vind, drejede i Løbet af Dagen til N. V.
23. April Overtrukket. Vestl. Vind.
24. April Skyet. Nordvestl. Vind.
25. April Klart. Nordl. stærk Blæst.
26. April Haglbyger. Nordl. stærk Blæst.
27. April Klart. Nordl. Blæst.
28. April Byger. S. V. Blæst.
29. April Overtrukket. Byger. V. S. V. Vind.
30. April Overtrukket. Byger. V. S. V. Vind.
1. Maj Overtrukket. Byger. S. V. Vind.
2. Maj Overtrukket. Stærke Byger. S. V. Vind.
3. Maj Byger. S. V. Vind.
4. Maj Regn. Blæst af skiftende Retning.
5. Maj Klart. Mildt. Svag Blæst fra S. V.
6. Maj Klart. Østl. Blæst.
7. Maj Klart. Varmt. Østl. Blæst.

## FUGLENES FORAARSTRÆK 1907 VED ESBJERG.

AF

M. KLINGE.

Naar jeg atter i Aar har iagttaget Fuglene under deres Foraarstræk og nu i det efterfølgende bringer Meddelelser derom, er Grunden bl. a. den, at jeg, saafremt der skal vindes noget Udbytte af Undersøgelser af den Art, anser det for nødvendigt, at disse saa vidt muligt gentages fra Aar til Aar gennem et ikke for kort Tidsrum.

Det Landomraade, hvorover Undersøgelserne er foretaget, er det samme som i Fjor, altsaa ret snævert, men det er rigt afvekslende med Strand, Mose, Mark, Hede og Plantage og har saaledes Betingelser for at kunne tilfredsstille de fleste Arter af vore Trækfugle, naar de efter en besværlig Rejse kan have Hvile behov. Den Mulighed, at de omhandlede Arter, naar der

ses hen til deres Hovedtræk, kan have indfundet sig til andre Dele af Egnen paa et tidligere Tidspunkt end her, anser jeg da ogsaa næsten for udelukket, dog ikke som Følge af Naturforholdene alene, men af disse i Forbindelse med Trækkets Forløb i det hele. Derimod vil der være en Mulighed for, at enkelte Fugle af de forskellige Arter, forud for Hovedtrækket, kan være ankomne hertil før end af mig iagttaget. Det har nemlig vist sig hos adskillige Arter, baade af Egnens Ynglefugle og af dens Gæster, at naar den Tid nærmer sig, da Trækket kan ventes, indfinder enkelte Fugle sig, tilsyneladende dels for her at afvente Hovedtrækkets Ankomst og dels paa Vej til andre Egne. Tidsforskellen mellem deres Ankomst og Hovedtrækkets er meget vekslende, i de fleste Tilfælde dog under en Uge.

Jeg har imidlertid haft min Opmærksomhed henvendt paa dette Forhold, idet jeg som Regel har søgt Fuglene adskillige Dage, forinden jeg turde vente deres Ankomst, og jeg er derfor temmelig sikker paa, at de Afvigelser, der maatte findes mellem Forløbernes Ankomstid og mine Optegnelser derom, kun er ubetydelige. Hertil maa ogsaa bemærkes, at Undersøgelserne er foretagne daglig og som Regel til de for de forskellige Lokalteter gunstigste Tider i Døgnet. Mine Besøg paa Stranden har saaledes rettet sig efter Ebbe, den Tid da Fuglene indfinder sig for at søge Føde, og til Iagttagelser i og ved Plantagerne, hvor den langt overvejende Del af Smaafuglene maa søges, er som Regel anvendt de tidligste Morgentimer, det eneste Tidspunkt paa Dagen, paa hvilket det har vist sig muligt at faa et paalideligt Overblik over Fuglelivet der.

For at give den bedst mulige Oversigt har jeg valgt at behandle hver Art for sig og dertil at benytte den Rækkefølge, som er angivet af Hr. Viceinspektør Winge i Tidsskriftets 1. Hefte.

*Anas penelops*, Pibeand, har i Vinterhalvaaret opholdt sig talrig ved Kysten. Den er meget selskabelig og færdes næsten udelukkende i Flok, men den er tillige en sky Fugl, der sjældent kommer Strandbredden nærmere, end at den kan føle sig sikret mod Fare derfra. Under Ebbe, naar Havbunden lægges tør til en Afstand af ca. 1000 Alen fra Land, ser man den i Flok forsamlet paa Dyndet i Færd med at indtage sine Maaltider. I første Uge af April brød den op for at drage til Ynglepladserne.

*Tadorna cornuta*, Gravand, bemærkede jeg første Gang 16.

April paa Stranden ved Eshjerg. Den er ret almindelig Ynglefugl her, men dog særlig med Fanø som Hjemsted, og det kan derfor være muligt, at dens første Besøg paa Fastlandet ikke nøjagtigt angiver dens Træk hertil.

*Cygnus musicus*, Sangsvane. Nogle enkelte Flokke paa 5—10 Stkr. blev under Trækket mod Nord set i Tiden fra 10—24. Marts.

*Anser torquatus*, Knortegaas, har overvintret talrig i Farvandet mellem Fanø og Fastlandet. Den er overmaade selskabelig og ses sjældent uden i Flok. Ved Ebbetid er den ligesom Pibeanden travlt beskæftiget med at samle Føde; men den er endnu mere sky end denne og søger derfor Tilhold saa langt fra Land som paa nogen Maade muligt, helst paa de Holme, der under stærk Ebbe skyder op hist og her. I roligt Vejr lyder dens Stemme tydeligt ind over Land, ofte fra en saadan Afstand, at man end ikke gennem Kikkert kan blive Fuglen var. Det stærkt befærdede Farvand Nord om Fanø søger den at undgaa. 8. April bemærkede jeg den sidste Gang.

*Vanellus cristatus*, Vibe, iagttoges umiddelbart efter Ankomsten i Flok paa 12—16 Stkr.: men da flere Flokke meldte sig til Egnen samtidig, er der Mulighed for, at de har foretaget Rejsen hertil i Fællesskab. Den forblev i Flok i nogle Dage og havde i den Tid sine bestemte Tilholdssteder, i de fleste Tilfælde højtliggende Græsmarker. Derpaa opløste Flokkene sig i flere mindre, der fordelte sig over lavere Terrain, og da atter nogle Dage var forløbne — 2 à 3 Uger efter Ankomsten —, kunde man se den begynde at parre sig. De første Flokke meldte sig hertil 27. Februar; men Trækket strakte sig over hele Marts Maaned.

*Charadrius pluvialis*, Hjejle, var meget talrig paa Gennemrejse; men i højere Grad end de fleste andre Vadefugle havde den sine bestemte Tilholdssteder. Paa disse kunde den træffes i Flokke, der talte Hundreder af Fugle, medens den kun undtagelsesvis viste sig andetsteds. Gennemtrækket, der begyndte midt i Marts, var størst mod Maanedens Slutning. I April aftog den i Antal lidt efter lidt; men før vi nærmede os Maj, kunde Trækket dog ikke anses for afsluttet.

*Ægialitis minor*, Lille Præstekrave, viste sig sparsomt; nogle enkelte Flokke paa ca. 10 Stkr. opholdt sig paa Stranden i sidste Uge af April.

*Ægialitis hiaticula*, Præstekrave, ankom tidligt tiltrods for

ugunstige Forhold. Allerede 22. Februar iagttog jeg en enkelt Fugl. Vejret var i Dagene 20—22. Februar stormende V., Vandstanden usædvanlig høj, og Stranden laa dækket af mandshøje Isblokke, idet Drivisen af Storm og Flod var presset sammen og opskyllet. 23. Februar var Stormen aftagen, og Vandstanden blev i Løbet af faa Dage normal. Først nu var alt i Orden til at tage mod Fuglene, og de lod da ejheller vente paa sig. 28. Februar viste sig en Flok paa 8 Stkr., og man kunde herefter se dens Antal vokse Dag for Dag indtil 5. Marts, da den var talrig overalt paa Stranden. Den synes at indfinde sig i Afdelinger paa en halv Snes Fugle, men allerede umiddelbart efter Ankomsten kunde ses enkelte Fugle, der trak sig bort fra Flokkene og herefter opholdt sig parvis; andre sluttede sig til Ryleflokkene, naar disse under Ebbe drog om paa Stranden. Fra Slutningen af Marts aftog den kendelig i Antal, og ved 10. April var Gennemtrækket væsentlig endt. Fra 30. April til 5. Maj kunde træffes nogle enkelte Flokke, tilsyneladende et lille Eftertræk.

*Hæmatopus ostreologus*, Strandskade. Den 10. Januar under en Times Spadseretur paa Fanø Strand fandt jeg en død Fugl i temmelig frisk Tilstand, hvilket lod formode, at Arten overvintrede der. Hvorvidt det forholdt sig saaledes, fik jeg ikke Lejlighed til selv at undersøge, men Forespørgsler, jeg har rettet til Skytter, bekræfter det. Paa Esbjerg Strand bemærkede jeg 28. Februar Fugle, der, saa vidt jeg gennem Kikkert kunde skelne, var Strandskader; men Afstanden til Vandlinjen, hvor de opholdt sig, var dog for stor til, at jeg kunde faa Vished derom. 8. Marts iagttog jeg 3 Eksemplarer og ved senere Lejligheder atter 3 sammesteds, sandsynligt de samme. 8 Fugle opholdt sig her 20. Marts. Artens Hjemsted her er Fanø, og Iagttagelser fra Fastlandet over det begyndende Træk var under disse Forhold umulige. Natten mellem 15.—16. April faldt et temmelig stort Træk af Vadefugle, og det ser ud, som ogsaa Strandskadens Hovedtræk dermed er kommet. I ethvert Tilfælde indfandt den sig meget talrig i Flok paa Esbjerg Strand — væsentlig unge Fugle —, og den var herefter ofte at træffe talrig gennem Resten af April og gennem Maj Maaned.

*Numenius arquatus*, Stor Regnspove, var i Aar trods Vintrens Strenghed temmelig talrig som overvintrende. Den havde særlig Tilhold paa Fanø, hvor den tillige havde sit Nattekvarter;

men hyppigt indfandt den sig dog ogsaa paa Fastlandet for dels paa Stranden dels paa de nærliggende Marker at opsøge Føde. Iagttagelser over det begyndende Træk har altid sine Vanskeligheder i Tilfælde som her, hvor Arten forud derfor var almindelig, og med Vished tør jeg derfor ikke udtale mig; imidlertid synes det, som om de overvintrende Fugle har forladt os før 12. Marts; thi fra det Tidspunkt hengik en Periode af ca. 3 Uger, i hvilken jeg ikke saa den. Fra Begyndelsen af April indfandt den sig atter, og fra 7. April ret talrig; der kan derfor være Grund til at antage, at det er Trækket sydfra, der først nu begyndte. Den optraadte herefter ret talrig indtil 2. Maj, fra hvilken Dag Trækket maatte noteres endt. 17. Maj traf jeg dog 2 Fugle paa Stranden, og 22. Maj lød en enkelt Stemme ind over Land.

*Numenius phaeopus*, Lille Regnspøve, kunde 15. April Aften Kl. 11 høres trækkende over Byen, og den paafølgende Morgen opholdt 12 Fugle sig paa Stranden. Den var herefter ret hyppig, og altid saa man den færdes flokkevis, oftest i Antal af 10—20 Stkr. Sidste Gang, jeg bemærkede den, var 22. Maj, da adskillige Fugle opholdt sig her; men da min Tid fra nu af var meget stærkt optagen, maatte jeg væsentlig afslutte mine Iagttagelser, og jeg fik af samme Grund ikke senere Lejlighed til at undersøge dens Yndlingspladser. Den holdt sig udelukkende til Stranden.

*Totanus glareola*, Tinksmed, var almindelig under Trækket, væsentlig som gennemrejsende. Nogle enkelte Fugle kom hertil i Slutningen af April — den første bemærkede jeg 26. April —, men Hovedtrækket foregik fra 3.—5. Maj.

*Totanus calidris*, Rødbenet Klire, iagttog jeg første Gang 30. April paa Stranden ved Eshjerg. Den er ynglende paa Fanø, omend kun sparsomt, men derimod næppe paa Fastlandet, og da jeg ikke bemærkede dens Træk, er der Mulighed for, at dette er faldet noget tidligere.

*Recurvirostra avocetta*, Klyde, der ifølge Meddelelse til mig ankom til Ringkøbing Fjord Natten mellem 4. og 5. April, blev ikke bemærket her.

*Tringa alpina*, Ryle, er foruden at være den af Vaderne, der optræder talrigst her i Foraarstiden, tillige den, hvis Træk strækker sig over den længste Periode; men gunstigere Lokalteter end de, Stranden her frembyder, vil den ogsaa vanskeligt kunne opnaa andetsteds. Den er højst selskabelig, ses snart i

talrige Smaaflokke og snart i mægtige Skarer. Trækket begyndte 3. Marts, og fra 5.—10. Marts ankom den talrig; derefter stod dens Antal, naar enkelte Dage undtages, temmelig uforandret indtil 7. Maj, fra hvilket Tidspunkt det efterhaanden aftog indtil Maanedens Slutning. Særlig stort Besøg af gennemrejsende Fugle havde vi 16. og 28. April samt 11. Maj. Nogle mindre Flokke overvintrede.

*Gallinago scolopacina*, Dobbelt Bekkasin, var ret talrig paa Gennemrejse; men dens Ophold her var kort, og Trækket iøvrigt skarpt begrænset. De første Fugle — dog kun ganske faa Eksemplarer — kunde træffes fra 28. Marts. Hovedtrækket foregik i 2 Afdelinger og faldt betydelig senere, nemlig 7.—8. April og 12. April. Rejsen blev fortsat efter en Dags Hvile.

*Scolopax rusticula*, Skovsneppe, er normalt sparsom paa Gennemrejse. En besynderlig Undtagelse herfra dannede dog Efteraarstrækket 1906, under hvilket den var forholdsvis meget talrig, men til Gengæld var dens Forekomst under Foraarsstrækket i Aar under det normale. De faa Fugle, der blev set, opholdt sig her de sidste Dage i Marts. Ved Nytaarstid kunde nogle enkelte Eksemplarer ses ved Spangsberg Mølleaa, og en enkelt, stærkt afmagret Fugl blev skudt. Det synes imidlertid, som om disse Fugle, der maa antages at være saarede fra Efteraars-trækket, er gaaet til Grunde under de strenge Vinterdage, der senere fulgte.

*Larus ridibundus*, Hættemaage, var 17 Marts med stærk Søndenvind talrig paa Stranden, de fleste dog kun som flygtige Gæster paa Rejsen mod Nord. Et Antal af ca. 50 Fugle, som blev tilbage, tog fast Ophold her i et Par Maaneder og var til Stadighed at træffe ved Kloakudløbene. 8 Maj drog de bort. I Fanø Klitter ses en Koloni af tilsvarende Størrelse, og det er sandsynligt, at den bestaar af disse Fugle.

*Sterna minuta*, Dvergterne, ankom hertil 7 Maj og var i den paafølgende Ugestid talrig paa Stranden, væsentlig som gennemrejsende.

*Sterna macrura*, Kystterne, var ligeledes talrig, særlig paa Gennemrejse, og dens Hovedtræk, der begyndte 7 Maj, faldt nøje sammen med Dvergternens. Enkelte Fugle var ankomne hertil forinden. 1 Eksemplar traf jeg 1 Maj, og 2 Eksemplarer 6 Maj.

*Columba palumbus*, Ringdue, besøger ret jævnligt vore

Plantager under Træktiderne. 31 Marts bemærkede jeg den første Gang. 3 Fugle gæstede os fra 10—12 April, og 6 Fugle fra 15—18 April.

*Cypselus apus*, Mursejler, ankom sent i Aar, og Aarsagen dertil var uden Tvivl det kolde og ustadige Foraar. Adskillige Fugle opholdt sig her 1 Juni paa Gennemrejse, og et Træk, dog tilsyneladende betydelig mindre, gik over Egnen 6 Juni.

*Cuculus canorus*, Gøg. De første Fugle ankom hertil Natten til 11 Maj. Umiddelbart efter Ankomsten, Kl. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Morgen, saa jeg den ved Plantagerne, fulgt af Engpiberen.

*Corvus monedula*, Allike, der hyppig ses under Foraars-trækket, oftest i mindre Flokke og i Selskab med Krager, iagttog jeg første Gang 24 Marts. Dens Hovedtræk foregik i 2. Uge af April.

*Corvus cornix*, Krage, var som sædvanlig almindelig som Vintergæst. Den opholdt sig overalt i Egnen, dog særlig talrig i Byens Nærhed og paa Stranden ved Ebbetid. Mod Aften brød den op og begav sig enkeltvis til sit Nattekvarter paa Fanø, hvorfra den atter vendte tilbage ved Daggry. I sidste Uge af Marts drog de fleste bort, og de tilbageblivende, der særlig havde Tilhold paa Stranden, forlod os midt i April; kun undtagelsesvis kunde ses en enkelt Fugl til omkring 22 April. Et temmelig stort Besøg af Krager paa Gennemrejse havde vi i Dage 9—12 Marts.

*Lanius collyrio*, Alm. Tornskade, forekommer i Aar mindre hyppig end nærmest foregaaende Aar, og ogsaa under Trækket viste den sig sparsomt. Den første Fugl iagttog jeg 12 Maj.

*Lanius major*, Stor Tornskade. 8 April under mildt Vejr opholdt en enkelt Fugl sig i Maade Mose, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mil Øst for Esbjerg. Den var optaget af at fange Firben, som den udspejdede dels fra Toppen af Buske og dels fra Luften, idet den holdt sig svævende paa samme Vis som Rovfugle.

*Hirundo riparia*, Digesvale, der er almindelig i Egnen, begyndte sit Træk hertil 7 Maj.

*Hirundo rustica*, Forstuesvale, kunde enkelte Steder iagttages 6 Maj. Hovedtrækket foregik 4—5 Dage senere.

*Alda arvensis*, Sanglærke, overvintrede ret talrigt. Man saa den oftest i mindre Flokke drage om paa Markerne, men haardt Vintervejr med Kulde og Sne tvang den ligesom andre Smaafugle til at søge Tilflugt til Byerne. Særlig paa Havne-

terrainet omkring Kornpakhusene var den da at træffe i Selskab med Toplærke, Spurv og Bomlærke. Den var den først tilbagevendende af vore Trækfugle, idet den allerede 17—18 Februar, medens Sneen endnu delvis dækkede Markerne, indfandt sig talrigt; den var derefter yderst talrig paa Gennemrejse indtil et Par Dage ind i Marts.

*Sturnus vulgaris*, Stær, kunde nu og da ses i Vintertiden, oftest parvis. 9 Januar traf jeg den i Flok paa ca. 15 Stkr. i Byens Udkant. Dens Træk hertil begyndte ved 20 Februar, et Par Dage senere end Sanglærkens.

*Troglodytes parvulus*, Gærdesmutte, indfinder sig til Egnen hvert Efteraar under Træk sydpaa; den færdes parvis, hyppigst ved Gærder og Grøfter langs Markerne, hvor den kan søge Skjul i Lyng og højt Græs. Nogle bliver tilbage for at overvinde i Haver og Plantager, men dens Antal i Aar var under det sædvanlige. De overvintrende Fugle synes at have forladt os lidt efter lidt i første Halvdel af April, og noget Foraarstræk over Egnen har jeg ikke bemærket.

*Accentor modularis*, Brunelle, er almindelig Ynglefugl i Plantagerne og normalt ret almindelig overvintrende, men denne Vinter saa man den kun sparsomt. Dens Træk hertil begyndte 6 April, og tillige gæstede en Del Fugle os paa Gennemrejse.

*Sylvia cinerea*, Tornsanger, var under Trækket talrig Gæst i Plantagerne. Det første Eksemplar bemærkede jeg 15 Maj, og Hovedtrækket begyndte 17 Maj.

*Sylvia curruca*, Gærdesanger, er blandt Sylvierne den Art, hos hvilken jeg har truffet den største Tidsforskel mellem Forløbernes og Hovedtrækkets Ankomst, idet jeg allerede 26 April, 14 Dage forinden Hovedtrækket begyndte, bemærkede det første Eksemplar. Enkelte Fugle traf jeg dernæst 8 og 9 Maj, medens Hovedtrækket, under hvilket den var almindelig i Plantagerne, begyndte 10 Maj og varede en Ugestid.

*Sylvia hortensis*, Havesanger, var ligeledes almindelig som gennemrejsende, og dens Hovedtræk, der begyndte 10 Maj, faldt nøje sammen med Gærdesangerens. 2 Eksemplarer bemærkede jeg 8 Maj.

*Hypolais icterina*, Gulbuget Sanger, ankom hertil 12 Maj og var i de følgende 4 Dage tillige almindelig paa Gennemrejse.

*Acrocephalus phragmitis*, Sivsanger, var talrig under Trækket.



En enkelt Fugl bemærkede jeg 8 Maj, og den paafølgende Dag fulgte Hovedtrækket, der varede knap en Uge.

*Phylloscopus trochilus*, Løvsanger, bemærkede jeg første Gang 4 Maj, og den var herefter daglig at træffe i Plantagerne. 12 Maj var den talrigst, og Trækket syntes dermed at slutte.

*Regulus cristatus*, Gultoppet Fuglekonge, hvis Efteraars-træk 1906 begyndte 13 September, var som sædvanlig almindelig Vintergæst, omend dens Ophold i Plantagerne var en Del mere periodisk end forrige Aar. Et Par Dage ind i April begyndte Foraarstrækket, og det foregik derefter temmelig jævnt indtil 23 April, da Hovedtrækket var forbi. Nogle forsinkede Hold drog i Maj Maaned gennem Egnen og kunde ses i Plantagerne 4, 8—10 samt 17 Maj. Trækket foregik i Afdelinger paa en halv Snes Fugle, og det var ved flere Lejligheder iøjnefaldende, hvilken Forskel der kunde være paa Fuglenes Udvikling i de forskellige Hold; enkelte Hold stod saa langt tilbage for andre, at der for deres Vedkommende ikke kunde være Tvivl om, at de stammede fra samme Kuld. I det hele syntes det at fremgaa af Trækket, at det foregik familievis.

*Anthus pratensis*, Engpiber, iagttog jeg første Gang 11 Marts, men de Eksemplarer, der ankom hertil før 20 Marts, var yderst faa. Fra 20 Marts begyndte Trækket at foregaa livligere, og i sidste Uge af Marts samt første Uge af April var den meget talrig. Under Trækket synes den særligt at vælge lave, fugtige Enge eller unge Naaetræsplantninger med Lyng og højt Græs til Opholdssted.

*Anthus obscurus*, Skærpiber. I Dagene 24—27 Marts kunde et enkelt Par under Gennemrejse træffes ved Havnedæmningen.

*Anthus arboreus*, Træpiber. Nogle faa Eksemplarer opholdt sig ved Plantagerne omkring Midten af April.

*Motacilla flava*, Gul Vipstjert, bemærkede jeg første Gang 28 April, da 5 Fugle i Selskab med Hvid Vipstjert opholdt sig paa en Brakmark, der var under Oppløjning. Imidlertid synes det, som om disse Fugle kun har gæstet os paa Gennemrejse; thi der forløb 8 Dage, forinden jeg traf den paany. Hovedtrækket, under hvilket den var ret talrig, foregik fra 6—9 Maj.

*Motacilla alba*, Hvid Vipstjert, hørte til de Arter, der viste den største Tidsforskel mellem Forløbernes og Hovedtrækkets Ankomst. Det første Eksemplar iagttog jeg 31 Marts 1 Mil Nord for Esbjerg, og 1 April traf jeg den 1 Mil Øst for Byen. Fra

6 April indfandt den sig noget hyppigere, og fra midt i Maaneden saa jeg den ret almindeligt. Dens Hovedtræk faldt imidlertid i sidste Uge af April, og under dette færdedes den ofte i Selskaber paa indtil en halv Snes Fugle, de fleste med Tilhold i Nærheden af Plantagerne.

*Turdus iliacus*, Vindrossel, forekom sparsomt paa Genemrejse. Den første Fugl blev set 20 Marts. En Flok paa ca. 10 Stkr., det største Antal, jeg traf samlet, opholdt sig her 26 Marts.

*Turdus musicus*, Sangdrossel, var den af Drosselarterne, der var talrigst under Trækket, og den var i Tidsrummet 20 Marts til 8 Maj til Stadighed at træffe i Plantagerne.

*Turdus pilaris*, Sjagger, viste sig ret hyppigt i mindre Flokke, men dens Besøg indskrænkede sig til enkelte Dage. Den 8 April ankom de første hertil, en Flok paa ca. 40 Stkr. De sidste opholdt sig her 3 Maj.

*Turdus torquatus*, Ringdrossel, bemærkede jeg kun 2 Gange, nemlig 5 og 8 Maj.

*Turdus merula*, Solsort, var som sædvanlig almindelig som overvintrende; den synes endog at forekomme i større Antal i Plantagerne ved Vintertid end om Sommeren. Trækket over Egnen var temmelig ubetydeligt og kun kendeligt i Dagene 20—21 April.

*Saxicola oenanthe*, Graa Digesmutte. Dens Træk havde en Del tilfælles med Hvid Vipstjerts, idet den ligesom denne begyndte at indfinde sig temmelig lang Tid forinden Hovedtrækket og derefter var jævnt tiltagende i Antal. De første Fugle — 4 Eksemplarer — bemærkede jeg 7 April, og atter den paafølgende Dag traf jeg dem; men det synes, som om de derpaa er draget videre. Fra 12 April kom et nyt Træk, og den var herefter at træffe ret almindeligt, dels enkelt-, dels parvis. Hovedtrækket foregik i sidste Uge af April, og under dette færdedes den jævnligt i Selskaber paa 6—8 Stkr.

*Praticola rubetra*, Brunstrubet Digesmutte, af hvilken Art en enkelt Fugl viste sig 7 Maj, var fra 8—12 Maj samt 17 Maj talrig i Moserne og ved Plantagerne, væsentlig som gennemrejsende.

*Ruticilla phoenicura*, Rødstjert, der hvert Efteraar i September og Oktober Maaned skarevis drager gennem Egnen, viser sig forholdsvis sparsomt paa Foraarsstrækket. Nogle enkelte

Fugle kunde iagttages i Plantagerne 8—10 Maj, og 11 Maj begyndte Hovedtrækket, der kun strakte sig over 3 Dage.

*Erithacus rubecula*, Rødkælk, var ligesom foregaaende Aar at se overvintrende i Plantagerne, men dens Antal var dog under det normale. I Esbjerg Plantage, hvor jeg hyppigst traf den, har der næppe opholdt sig over 4—5 Fugle. Dens Træk foregik skarevis ved Nattetid og faldt i 3 Afdelinger, nemlig 8, 12 og 20 April, og Rejsen blev fortsat, efter at Fuglene havde udhvilet sig en enkelt Dag. Mellemtrækket — 12 April — var størst. De overvintrende Fugle forlod os sammen med de gennemrejsende.

*Muscicapa atricapilla*, Broget Fluesnapper, gæstede os fra 7—17 Maj. Den var ret almindelig, men dens Foraarsstræk over Egnen kan dog langtfra maale sig med Efteraarstrækket 1906 fra midt i August til midt i September, under hvilket den meget talrig opholdt sig i Plantagerne.

*Muscicapa grisola*, Graa Fluesnapper. Enkelte Par kunde under Gennemrejse ses i Plantagerne fra 11—13 Maj.

*Fringilla coelebs*, Bogfinke, indfinder sig hvert Efteraar talrigt til Egnen for at overvintre. Den færdes omkring paa Markerne og ved Gaardene for at samle Føde, men mod Aften ses den søge til Plantagerne for at finde Nattely. Henimod Foraaret, naar Fyrrekoglerne begynder at udfolde sig, forbliver den tillige i Plantagerne om Dagen, og under den sidste Tid af dens Ophold her lever den næsten udelukkende af Naaletræernes Frø. 25 Marts begyndte Trækket sydfra, og den var derefter meget talrig indtil 8 April. Aftenen forinden dens Bortrejse — 7 April —, da jeg ved 7 Tiden spadserede gennem Spangsberg Plantage, var Fuglene just gaaet til Ro; men det var paafaldende at se, hvor tæt de den Aften havde samlet sig i en lille Granafdeling; der kunde ikke næres Tvivl om, at der forestod noget vigtigt. Den paafølgende Morgen Kl. 6, da jeg kom for at se til dem, var Opbruddet allerede sket; de havde forladt Egnen. Et større Antal end tidligere blev i Aar tilbage som Ynglefugle.

*Fringilla montifringilla*, Kvækerfinke, begyndte sit Træk 25 Marts samtidig med Bogfinken. Den var ret almindelig i den ældste af Plantagerne, Spangsberg Plantage; dog fandtes den ikke i saa stort Antal som i 1906, ligesom dens Forekomst i Aar var en Del mere periodisk. Det sidste Hold, en Flok paa 16 Stkr, ankom hertil 29 April og forlod os 2 Maj. Fra 24—28 Februar

gæstede nogle faa Fugle os, men jeg antager, det har været overvintrende.

*Ligurinus chloris*, Grønirisk, der i Vinteren 1906 hyppig af lagde Visit i vore Plantager, svigtede os i Aar helt i Maanederne Januar og Februar. 8 Marts ankom de første Fugle hertil, men efter at have opholdt sig her en Ugestid drog de bort. I Begyndelsen af April viste den sig paany, og den var herefter stadig at træffe, enkelte Dage, nemlig 8 og 20 April, temmelig talrig. 21 April var Trækket endt.

*Cannabina linota*, Rødirisk, ankom hertil 20 Marts. Ved Middagstid bemærkede jeg en enkelt Fugl, og om Aftenen Kl. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, da jeg gik gennem Esbjerg Plantage, svingede det første Hold, en Flok paa ca. 50 Stkr., kvidrende ind over Trætoppene, hvor dens første Gerning var at faa undersøgt, om Stedet bød den Sikkerhed. I hurtig, bølgende Flugt kredsede den en halv Snes Gange hen over Træerne, og da den derpaa slog sig ned, anbragte den sig tæt samlet paa nogle faa Grantoppe, hver Fugl spændt opmærksom paa alt, hvad der kunde forekomme mistænkeligt. Da jeg nærmede mig og blev bemærket af dem, var de alle straks paa Vingerne, men efter at de et Par Gange havde gentaget Turen hen over Trætoppene og forvissat sig om, at Faren ikke var saa stor, faldt de atter til Ro. Den paafølgende Morgen havde de fordelt sig over Plantagen. — Den ankom herefter skarevis og var overordentlig talrig, indtil omkring 10 April, ved hvilket Tidspunkt dens Træk endte. Ingen har overvintret.

*Emberiza schoeniclus*, Rørspurv, iagttog jeg første Gang 7 April — 4 Eksemplarer. Dens Hovedtræk faldt omkring Midten af April.

*Emberiza citrinella*, Gulspurv, er i de senere Aar begyndt at indvandre til Plantagerne, men først med Aaret 1906 kunde den anføres som almindelig Ynglefugl. Den er hidtil Trækfugl her. Fra 27 Marts til 13 April foregik Trækket, og i samme Tidsrum gæstede en Del Fugle os paa Gennemrejse.

*Emberiza miliaria*, Bomlærke, er almindelig som ynglende, men om Efteraaret forøges dens Antal betydeligt af Fugle, der kommer hertil dels for at overvintre og dels for at drage videre. Ogsaa under Foraarstrækket, der i Aar foregik i sidste Uge af Marts og første Uge af April, indfinder den sig talrig. Paa senere Tidspunkt traf jeg dog ogsaa Fugle, som jeg er tilbøjelig til at anse for Trækfugle; den 15 og 17 April saa jeg den saa-

ledes i Flok paa ca. 50 Stkr. 7 Maj Kl. 8 Aften bemærkede jeg en lignende Flok, der under et heftigt Tordenvejr ængstelig fløj omkring fra Sted til Sted.

*Emberiza nivalis*, Snespurv, var i Aar baade som overvin-trende og som gennemrejsende langt mindre talrig end i 1906. Dens Foraarstræk begyndte i Slutningen af Februar, og under dette færdedes den oftest i Selskaber paa 5—6 Fugle og havde Tilhold paa Strandbredden. Det største Antal, jeg saa samlet, var 12 Stkr., der opholdt sig her 22 Marts. De sidste forlod os 29 Marts.

## OM FOTOGRAFERING AF VILDE FUGLE I FRIHED.

MED TAVLE I—V.

AF

ROAR-CHRISTENSEN.

Da jeg i Efteraaret 1905 i »Videnskabelige Meddelelser fra naturhistorisk Forening« havde offentliggjort mine Iagttagelser af Dvergmaagens og Splitternens Yngleforhold paa Klægbanken i Ringkøbing Fjord, ledsagede af et Par Billeder efter Fotografi, modtog jeg en Del Forespørgsler om, hvorledes jeg havde været i Stand til at fotografere de nævnte Fugle paa saa nært Hold. Flere af Spørgerne vare dygtige Amatørfotografer, der havde givet sig af med at fotografere Fugle i Naturen. Af Mangel paa Tid fik jeg ikke besvaret alle Forespørgslerne, og da jeg desuden kunde ønske at udbrede Interessen for denne efter min Mening smukke og nyttige Sport, vil jeg i nærværende lille Meddelelse offentliggøre mine hidtil gjorte Iagttagelser. Da jeg imidlertid kun har fotografert Fugle i knapt tre Aar, og da jeg kun har været i Stand til at ofre et ringe Maal af Tid paa denne min Yndlingssport, ere Resultaterne ogsaa kun smaa, saavel hvad Erfaring som hvad de optagne Billeder angaa. Naar jeg desuagtet allerede nu offentliggør samme, da er det for at anmode andre Amatørfotografer om at hjælpe til med at løse denne vanskelige Opgave, at faa fotografert Danmarks Fugle i det fri, samt at tilraade en Del af vort Lands talrige Jægere at ombytte Bøssen med et Kamera. Kunde det saaledes lykkes at faa flere til at interessere sig for denne Sag, da kunde vi i Forening hvert Aar fremkomme med de indvundne Er-