

Fyr viste de færreste Fuglefald. Ved de nordlige kunde der være stort Fuglefald en Nat, hvor der faldt faa eller ingen Fugle ved Vestfyrene — og omvendt. I Reglen var der stærkt Træk ved Kolding Morgenen efter en Nat, hvor der var stærkt Træk ved Vestfyrene, der jo ligge ret vest for Kolding. Mærkeligt nok sporedes der kun ganske ringe Træk ved Fyrene den 8 og 9 Oktober, da der var stærkt Træk ved Kolding. Kun ved Strib var der den 9 om Dagen stærkt Træk af Gæs, der fløj mod S., maaske for at dreje ind i Kolding Fjord og fra Bunden af denne fortsætte Rejsen over Land. — Den senere Trækperiode karakteriseredes ved Kolding ved sydøstlige Vinde, skyet Himmel, mildt Vejr, højt, langsomt stigende Barometer, og den afsluttedes med Barometerfald, Kulde og svag sydlig Vind. Paafaldende synes mig de mange trækkende Lommer, og at Lærker, der dog ofte trække om Dagen, næsten ikke trak (om Dagen) ved Kolding, skønt de i Mængde faldt ved Fyrene. I Forhold til tidligere Aars Oktobertræk var dette meget langvarigt — 5 Dage, — talrigt paa Individier og præget af Uro.

OM SORT RØDSTJERT (*RUTICILLA TITYS*)

I DANMARK¹.

AF

V. WEIBÜLL.

Under et Besøg 19 Juni 1906 i Helsingør besaa jeg det da under Restauration værende Kloster og tænkte mindst af alt paa at gøre ornithologiske Fund i Bygningen. Lige ved Udgangen til den indre Gaard overraskedes jeg imidlertid ved i et Murhul i ca. 4 Alens Højde at se en Rede, der fyldte næsten hele Hullet, (en udtagen Mursten). Uden at gøre mig Forestilling om, hvilken Fugl Reden tilhørte, undersøgte jeg den og saa da til min Overraskelse, at jeg havde for mig Reden af *Ruticilla titys* med 5 Æg; Reden viste sig at være forladt, hvorfor jeg medtog baade Rede og Æg. Ved dette Fund blev min Interesse for denne Fugl vakt, og jeg har siden overalt søgt at indhente Oplysninger om den og samlede Meddelelser om dens Forekomst, der indtil nu fore-

¹ For Hjælp ved Udarbejdelsen af denne lille Artikel samt for venligt Gennemsyn af Udkastet bringer jeg herved Hr. Inspektør Winge og Hr. Fuldmægtig E. Lehn Schiøler min bedste Tak.

ligger for Offentligheden. — Disse Meddelelser om *Ruticilla titys*, hvoraf Hovedmængden stammer fra »Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i København«, særlig de af Hr. Inspektør H. Winge udgivne Meddelelser om »Fuglene ved de danske Fyr«, har jeg søgt at sammendrage her i det Haab, at andre derved maa faa Interesse for Fuglen, saa at der eventuelt kan fremkomme yderligere Nyt til Belysning af Spørgsmaalet om den sorte Rødstjerts Udbredelse her i Landet. — Allerede det nu foreliggende synes mig at tyde paa (hvad ogsaa Hr. Inspektør Winge hævder i sin Oversig over Danmarks Fugle i dette Skrifts Hæfte I—II), at denne lille Fugl er i jævn Tiltagen her i Landet som Ynglefugl, og det skulde ikke undre mig, om adskillige sad inde med Oplysninger om den, der maatte vise, at dens Udbredelse allerede er større, end nedenstaaende viser.

Ruticilla Titys, der først i Mellemeuropa er almindelig Ynglefugl og allerede i Nordtyskland ikke forekommer særlig hyppigt, var paa Kjærbøllings Tid endnu ukendt i Danmark, i hvert Fald forelaa der intet sikkert Vidnesbyrd om dens Forekomst udenfor Hertugdømmerne, hvor dens Rede med 4 Æg blev fundet i en Have ved Flensborg 1859 (Collin: Skandinaviens Fugle). — I det nordlige Danmark synes den sorte Rødstjert først at være bemærket i 1872, idet Konditor Bjerrum (Collin: I Supplement til Skandinaviens Fugle) den 11 Maj nævnte Aar saa et Par bygge Rede i en Have ved:

Ribe, hvor han ogsaa i 1879 saa Reden med Unger. Ved Ribe blev Exemplarer skudt 25 April 79 (Han), 30 Marts 85 (Han) 4 September 87, 14 April 91 (Han), Maj 94, og den angives af Bjerrum, formodentlig 1894, (Collin III Suppl.) aarlig at yngle der, endda flere Par. — 1903 ynglede ifl. M. Claussens Meddelelser et Par i Seem Skov, SO. for Ribe (H. Winge: Fuglene ved de danske Fyr 1903).

Kolding. 25 Juni 81 saa O. & H. Winge Han og Hun paa Koldinghus Ruiner, hvor de rimeligvis havde Rede (H. Winge 1890). Sammesteds saa Dr. phil. O. F. Petersen 2 Exemplarer 31 Juli og 1 August 97 (H. Winge 1897), ligesom Arkitekt Hagerup (H. Winge 1898) angiver, at den sorte Rødstjert siden 1894 aarlig ses i Kolding, ved Koldinghus Ruiner og Havnen, hvilke Steder man flere Gange har set dens Rede med Æg eller Unger.

Fredericia. Et halvdødt Exemplar blev fundet i en Have først i April 84 (Collin III Suppl.).

Vejle. Bagermester Nielsen hørte Fuglen 1 Juni 02 ved Havnen (H. Winge 1902).

Horsens. I Tidsrummet Maj-Juli 1906 besøgte jeg gentagne Gange Horsens og saa der stadig en Han paa en Tømmerplads, altid dog kun et Eksemplar og uden at kunne faa oplyst, om den ynglede der. — Kbmd. N. Larsen meddeler (H. Winge 1903 & 04), at en Hun blev skudt i Ejstrup, NV. for Horsens 1 April 03, og at han iagttog den sorte Rødstjert dér 12 August 03 og 8 August 04.

Aarhus. En Meddelelse om, at Fuglen for et Par Aar siden skal være set ved Aarhus, er det desværre ikke lykkedes mig at faa tilstrækkeligt oplyst.

Grenaa. Ingeniør A. Christiani meddeler mig i Brev, at han sidst i Juli 1904 saa mindst een (antagelig to) Familie af *Ruticilla titys* ved Grenaa Havn, ligesom han angiver ofte i 90'erne at have set den paa Stensmark (ved Grenaa), hvor han Juli (August?) 1901 skød en Fugl ud af et Kuld paa 5—6. Paa Stensmark ynglede *Ruticilla titys* baade 1902 og 1903, medens tilsvarende Opgivelser ikke findes for 1904 og senere. 1904 blev gamle Fugle ret ofte set paa Stensmark.

Aalborg. Et Par havde 1903 bygget Rede i Banegaardens Stald, hvor dog desværre Reden blev ødelagt, da Stalden toges i Brug (H. Winge 1903 — Meddeler Overportør Storgaard og Lærer T. Bang —). Samme Aar ynglede et Par ifølge Meddelelse fra Lærer J. Larsen og P. Nørgaard i et Pissoir ved en Nybygning lige udenfor »Kilden«.

Nyborg. Ved flere Besøg i Løbet af Foraar og Sommer 1906 saa jeg et enkelt Exemplar paa en Tømmerplads ved Havnen.

Lou St. (Sjælland). En gammel Han blev ifølge Opgivelse fra afd. Apotheker Baagøe (H. Winge 1905) skudt 29 Marts 1905 ved Hammer.

Haslev. Læge Helms iagttog her den sorte Rødstjert i Juni 1906, sikkert som ynglende (H. Winge 1904).

Roskilde. Bagermester Nielsen af Kolding saa et Exemplar 1 April 03 (H. Winge 1903).

Helsingør. Rede med 5 Æg 19 Juni 04 (se ovenfor). — Om dens Forekomst dér senere har jeg ingen paalidelige Oplysninger kunnet faa.

København. Et Par opholdt sig iflg. Hofman-Bang i Maj 1903 ved Uglehuset i Zool. Have (Collin: III Suppl.) H. Winge saa Fuglen 6 Februar 01 i sin Have ved Hellerup.

Allinge. Alexander v. Homeyer iagttog ifl. Hagerup (Collin III Suppl.) den sorte Rødstjert den 15—17 Juni 86.

Nykøbing F. R. Jul. Olsen fik 2 flyvefærdige Unger 29 Maj 02 og saa selv 8 Juli 02 en Rede med Unger. — Rederne anbragte paa en Tverbjælke i et Skur (H. Winge 1902). 1903 ynglede 3 Par ifl. samme Meddeler i og ved Nykjøbing (H. Winge 1903), og i 1904 angiver Hr. Olsen Fuglen som ret almindeligt ynglende der (H. Winge 04).

Ved Fyrene er den kun faldet een Gang, nemlig en Hun paa Horns Revs Fyrskib, 12 April 01, Vindretning ved Blaavandshuk NO. (H. Winge 1901).

Om end noget udenfor denne Artikels Plan er det maaske dog af Interesse at nævne, at *Ruticilla titys* ifl. Knud Andersen (Videnskabelige Meddelelser fra Naturhistorisk Forening i København 05) blev set ved Myggenæs paa Færøerne 30 November, Vindretning SO. (1), 2—3 December Vindretning SO. (1), 7 December 02 (1), 10 December 02—12 Januar 03 (flere). — Ifl. Meddelelse fra Hr. Inspektør Winge ere de nu nævnte Tilfælde dog ikke de eneste fra Færøerne.

Den sorte Rødstjert er — foruden paa Færøerne — truffen enkelte Gange i Nordskotland og Irland og er en almindelig Vinterfugl i Syd-England, hvortil den antagelig kommer fra Holland, hvor den er overordentlig almindelig (*Seebohm*). Den yngler næppe paa de britiske Øer.

Den skal være set af Preyer 17 Juni 1860 paa Videy ved Reykjavik — det eneste kendte Tilfælde fra Island.

I Sverrig og Norge er Fuglen kun ganske enkelte Gange truffet, i Sverrig ikke nordligere end Upsala, i Norge ikke nordligere end Jäderen.

MINDRE MEDDELELSER.

FRA FUGLETRÆKKET OVER BORNHOLM 1907. De sidste Dage af April iaar saa jeg her i Almindingen paa en tildels aaben Plads — Hareløkkerne — en Flok Vindrosler (*Turdus iliacus*) paa flere Tusinde Stykker. Fuglene lod sig komme paa nært Hold, saa de vare sikkert trætte efter en længere Flyvetur. — Traner (*Grus cinerea*) trak over Øen i ret talrige Flokke fra 7 September og næsten daglig Maaneden ud. Graagæs (*Anser cinereus*) og Sangsvaner (*Cygnus musicus*) saas drage sydpaa