

FORTEGNELSE OVER DANMARKS FUGLE.

AF

HERLUF WINGE.

Efterfølgende Fortegnelse omfatter de vilde Fugle-Arter, der kjendes fra Danmark efter Istiden. Med Danmark menes kun det egentligste Danmark; Færøerne, Island o. s. v. ere ikke medregnede; derimod medregnes den danske Del af Sønderjylland, skjønt den for Tiden er under Herredømme af Fremmede; det er iøvrigt kun én Art, *Otis undulata*, som denne Del af Landet har tilført vor Liste.

Med Hensyn til Forstaaelsen af Listen er et og andet at sige.

Opfattelsen af Arterne er i de allerfleste Tilfælde den sædvanlige. Enkelte Former, der ofte regnes for særskilte Arter, ere her opførte som Underarter eller Racer, fordi de ere langt fra at have den Grad af Selvstændighed, som man plejer at forlange af Arter.

Naar ikke andet udtrykkelig siges, menes det, at vedkommende Art hos os findes i Artens typiske Form, den Form, der nærmest har været tænkt paa af den, der har givet Arten dens latinske Navn, eller som af andre Grunde ved Hævd er bleven at regne for Type.

Slægterne ere helst opfattede ikke for snevert, for at undgaa en Navne-Vidtløftighed, der ikke er Udtryk for Indsigt. Der kan ankes over, at Slægterne paa sine Steder ere for smaa. Deres Tal vil sikkert nok kunne indskrænkes; men i de Tilfælde, hvor man ikke har fuld Klarhed over Gruppernes Slægtskab og Rang, er det ment bedre at skjelne end at forene.

Standfugle kaldes ikke alene de Arter, der blive i deres snevre Føde-Egn baade Sommer og Vinter, men ogsaa de, der udenfor Yngletiden strejfe omkring uden dog i det væsentlige at forlade Landet.

Med Vintergjæster menes de Arter, der komme hertil for at overvintre her eller i Nærheden. Nogle af dem komme saa tidlig og rejse bort saa sent, at de kunne være at se i Sommermaanederne.

De tilfældige Gjæster ere af meget forskjellig Slags. Nogle af dem komme hertil saa langvejsfra, at de ere virkelig tilfældige; andre have deres Hjem saa nær ved Danmark, at de maaske vilde bosætte sig her, hvis de fik Fred.

Om Arternes geografiske Udbredelse er der ikke sagt noget undtagen i de Tilfælde, hvor Danmark ligger i Randen af deres Udbredningskreds.

Arterne er ordnede efter deres naturlige Slægtskab, saa vidt det for Tiden kjendes. Der er begyndt med dem, der i de væsentligste Træk af deres Bygning have størst Lighed med Krybdyr, Fuglenes lavere Slægtinge.

De her vedtagne latinske Navne ere almindelig brugte Navne, der længe have været kjendte over hele Jorden. Med Vilje er her ikke fulgt den for Tiden, men sikkert ogsaa kun for Tiden, meget udbredte Skik at ombytte velkjendte Navne med ældre, men hidtil saa godt som ukjendte, oftest ret tvivlsomme, eller at bruge velkjendte Navne i anden Betydning end hidtil, eller at lade Slægt- og Artnavn være ens, hvorved man omgaar Fordringen om dobbelt Navn, eller at skrive Navnene i urigtig Form, med Trykfejl eller andre Fejl, hvormed de have været befængte første Gang, de saa Lyset, o. s. v.

-
1. *Anas crecca*, Krikand. Ikke sjelden som ynglende. Nærmest Trækfugl. Talrig paa Gjennemrejse. Fra Stenalder.
 2. *Anas querquedula*, Atling. Ret faatallig som ynglende. Trækfugl. I Norge kun tilfældig.
 3. *Anas discors*, Blaavinget And. Tilfældig Gjæst fra Nordamerika.
 4. *Anas penelops*, Pibeand. Vistnok ynglende i Landet, faatallig. Talrig paa Gjennemrejse og som Vintergjæst. Fra Stenalder.
 5. *Anas strepera*, Knarand. Faatallig som ynglende. Trækfugl. I Norge kun tilfældig.
 6. *Anas acuta*, Spidsand. Ret faatallig som ynglende. Nærmest Trækfugl. Talrig paa Gjennemrejse. Fra Stenalder.

7. *Anas boscas*, Stokand. Almindelig som ynglende. Dels Standfugl, dels Trækfugl. Fra Stenalder og Jernalder. I nyeste Tid er den paa flere Steder i Landet ved kunstig Fodring og andre Midler bragt ud af den naturlige Tilstand.
8. *Anas clypeata*, Skeand. Ret almindelig som ynglende. Trækfugl. Mere talrig paa Gjennemrejse. Fra Stenalder. I Norge neppe eller kun sjelden ynglende.
9. *Tadorna cornuta*, Gravand. Ret almindelig som ynglende. Nærmest Trækfugl. Fra Stenalder og Jernalder.
10. *Tadorna casarca*, Rustand. Tilfældig Gjæst fra Syd- eller Sydøst-Europa.
11. *Cygnus olor*, Knopsvane. Faatallig som ynglende. Nærmest Standfugl. Fra Stenalder. I Norge kun tilfældig.
12. *Cygnus minor*, Pibesvane. Vintergjæst. Fra Stenalder.
13. *Cygnus musicus*, Sangsvane. Almindelig Vintergjæst. Fra Stenalder.
14. *Fuligula cristata*, Troldand. Sjelden som ynglende. Almindelig Vintergjæst. Fra Stenalder.
15. *Fuligula marila*, Bjergand. Vistnok ynglende i Landet, men sjelden. Almindelig Vintergjæst. Fra Stenalder.
16. *Fuligula ferina*, Taffeland. Faatallig som ynglende. Almindelig Vintergjæst. Yngler ikke i Norge.
17. *Fuligula nyroca*, Hvidøjet And. Tilfældig Gjæst fra det østlige Mellem-Europa eller fra Syd-Europa.
18. *Fuligula rufina*, Rødhovedet And. Tilfældig Gjæst fra Syd- eller Sydøst-Europa.
19. *Clangula glaucion*, Hvinand. Almindelig Vintergjæst. Fra Stenalder.
20. *Pagonetta glacialis*, Havlit. Almindelig Vintergjæst. Fra Stenalder.
21. *Oedemia nigra*, Sortand. Almindelig Vintergjæst, adskillige ogsaa at se om Sommeren, dog ikke ynglende. Fra Stenalder.
22. *Oedemia fusca*, Fløjlsand. Almindelig Vintergjæst, adskillige, ikke ynglende, at se om Sommeren. Fra Stenalder.
23. *Somateria dispar*, Stellers-And. Tilfældig Gjæst fra Nord.
24. *Somateria mollissima*, Ederfugl. Faatallig som ynglende. Talrig som Vintergjæst. Fra Stenalder og Jernalder.
25. *Somateria spectabilis*, Konge-Ederfugl. Sjelden Vintergjæst.
26. *Mergus albellus*, Lille Skallesluger. Ret sjelden Vintergjæst.

27. *Mergus merganser*, Stor Skallesluger. Sjelden som ynglende; fra den seneste Tid savnes Underretning. Almindelig Vintergjæst. Fra Stenalder.
28. *Mergus serrator*, Toppet Skallesluger. Ret almindelig som ynglende. Almindelig Vintergjæst. Fra Stenalder og Jernalder.
29. *Anser segetum typicus* & var. *brachyrhynchus*, Sædgaas. Almindelig som gennemrejsende, tildels overvintrende.
30. *Anser albifrons*, Blisgaas. Almindelig paa Gjennemrejse.
31. *Anser erythropus*, Dverrgaas. Sjelden Vintergjæst.
32. *Anser cinereus*, Graagaas. Har været almindelig som ynglende i Landet, men er nu stærkt indskrænket. Nærmest Trækfugl. Almindelig paa Gjennemrejse. Fra Stenalder og Jernalder.
33. *Anser ruficollis*, Rødhalsset Gaas. Tilfældig Gjæst fra Sibirien.
34. *Anser torquatus*, Knortegaas. Almindelig som Vintergjæst og gennemrejsende. Fra Stenalder.
35. *Anser leucopsis*, Bramgaas. Ikke sjelden som Vintergjæst og paa Gjennemrejse.
36. *Coturnix communis*, Vagtel. Ret almindelig som ynglende. Trækfugl.
37. *Perdix cinerea*, Agerhøne. Almindelig. Standfugl. Ved kunstige Omflytninger og Indførelse af fremmede ere dens naturlige Forhold i de senere Aar forrykkede.
38. *Tetrao tetrix*, Urfugl. Ret almindelig Standfugl i Jylland. Jordfunden paa Sjælland, hvor den i Nutiden kun findes som kunstig indført.
39. *Tetrao urogallus*, Tjur. Almindelig i Stenalderen. I Oldtiden uddød i Landet. I nyeste Tid forsøgt kunstig indført. I England udryddet i nyere Tid, derefter kunstig indført.
40. *Tachybaptus minor*, Lille Lappedykker. Ret almindelig som ynglende. Trækfugl, tildels overvintrende. Fra Stenalder. I Norge neppe eller kun sjelden ynglende.
41. *Podiceps auritus*, Hornet Lappedykker. Faatallig som Vintergjæst eller gennemrejsende. Neppe sikkert paavist som ynglende.
42. *Podiceps nigricollis*, Sorthalsset Lappedykker. Faatallig som ynglende i Jylland. Trækfugl. I Norge og England kun tilfældig.

43. *Podiceps griseigena*, Graastrubet Lappedykker. Ret almindelig som ynglende. Trækfugl. Fra Stenalder. I Norge nærmest tilfældig, ikke ynglende i England.
44. *Podiceps cristatus*, Stor Lappedykker. Ret almindelig som ynglende. Trækfugl, tildels overvintrende. Fra Stenalder. I Norge nærmest kun tilfældig.
45. *Colymbus arcticus*, Sortstrubet Lom. Faatallig, ustadig Vintergjæst. Fra Stenalder og Jernalder.
46. *Colymbus glacialis typicus* & var. *adamsii*, Islom. Faatallig, ustadig Vintergjæst.
47. *Colymbus septentrionalis*, Rødstrubet Lom. Ret almindelig Vintergjæst. Fra Stenalder.
48. *Procellaria pelagica*, Stormsvale. Tilfældig Vintergjæst fra Atlanterhavet.
49. *Procellaria leucorrohoa*, Stor Stormsvale. Tilfældig Vintergjæst fra Atlanterhavet.
50. *Puffinus anglorum*, Skraape. Tilfældig Vintergjæst fra Atlanterhavet.
51. *Fulmarus glacialis*, Stormfugl. Tilfældig Vintergjæst fra Atlanterhavet.
52. *Crex pratensis*, Engsnarre. Almindelig som ynglende. Trækfugl.
53. *Porzana minuta*, Dverg-Sumphøne. Kun faa Gange set i Landet. Vist ynglende Trækfugl. Ikke kjendt fra Norge.
54. *Porzana pygmaea*, Dverg-Rørvagtel. Kun faa Gange set i Landet. Vist ynglende Trækfugl. Ikke kjendt fra Sverig og Norge.
55. *Porzana maruetta*, Rørvagtel. Ret almindelig som ynglende. Trækfugl.
56. *Rallus aquaticus*, Vandrixe. Ikke sjelden som ynglende. Trækfugl, enkelte overvintrende. Ret talrig paa Gjennemrejse.
57. *Gallinula chloropus*, Rørhøne. Ret almindelig som ynglende. Trækfugl, enkelte overvintrende.
58. *Fulica atra*, Blishøne. Almindelig som ynglende. Trækfugl, nogle overvintrende.
59. *Otis tetrax*, Dvergtrappe. Tilfældig Gjæst fra Syd, vist fra Nord-Tyskland.
60. *Otis tarda*, Trappe. Mest som tilfældig Gjæst fra Syd, vel fra Tyskland, men har dog forsøgt at yngle her.

61. *Otis undulata* var. *macqueenii*, Kravetrappe. Tilfældig Gjæst fra Sydøst-Europa eller Asien.
62. *Grus cinerea*, Trane. Har tidligere ynglet i Landet, men er nu udryddet som ynglende. Endnu ikke helt sjelden paa Gjennemrejse. Fra Stenalder og Jernalder. I England kun tilfældig.
63. *Grus virgo*, Jomfrutrane. Tilfældig Gjæst fra Syd, vel fra Spanien eller Afrika.
64. *Oedinemus crepitans*, Triel. Tilfældig Gjæst fra Syd, fra Tyskland eller England.
65. *Vanellus cristatus*, Vibe. Almindelig som ynglende. Trækfugl, undertiden nogle overvintrende. Talrig paa Gjennemrejse om Foraaret, om Efteraaret derimod neppe at se gjennemrejsende.
66. *Charadrius squatarola*, Strandhjejle. Ikke sjelden paa Gjennemrejse.
67. *Charadrius pluvialis*, Hjejle. Ikke sjelden som ynglende. Trækfugl. Talrig paa Gjennemrejse.
68. *Eudromias morinellus*, Pomeransfugl. Ret almindelig paa Gjennemrejse, især talrig om Foraaret.
69. *Ægialitis minor*, Lille Præstekrave. Ret faatallig som ynglende. Trækfugl. I England kun tilfældig.
70. *Ægialitis hiaticula*, Præstekrave. Almindelig som ynglende. Trækfugl.
71. *Ægialitis cantiana*, Hvidbrystet Præstekrave. Ret almindelig som ynglende. Trækfugl.
72. *Streptilas interpres*, Stenvender. Ret faatallig som ynglende. Trækfugl.
73. *Hæmatopus ostreologus*, Strandskade. Almindelig som ynglende. Trækfugl.
74. *Glareola praticola*, Braksvale. Tilfældig Gjæst fra Syd eller Sydøst-Europa.
75. *Cursorius gallicus*, Ørkenløber. Tilfældig Gjæst fra Syd, fra Afrika.
76. *Numenius phæopus*, Lille Regnspove. Almindelig paa Gjennemrejse, sjelden overvintrende.
77. *Numenius arquatus*, Storspove. Vist ynglende faatallig. Almindelig paa Gjennemrejse; nogle overvintrende.
78. *Limosa lapponica*, Kobbersneppe. Almindelig paa Gjennemrejse.

79. *Limosa ægocephala*, Stor Kobbersneppe. Faatallig som ynglende. Trækfugl. Ikke sjelden paa Gjennemrejse. I England udryddet som ynglende.
80. *Macrorhamphus griseus*, Sneppeklire. Tilfældig Gjæst fra Amerika.
81. *Actitis hypoleuca*, Mudderklire. Faatallig som ynglende. Trækfugl. Almindelig paa Gjennemrejse..
82. *Totanus glareola*, Tinksmød. Ret almindelig som ynglende. Trækfugl. Ret almindelig paa Gjennemrejse. I England nærmest tilfældig.
83. *Totanus ochropus*, Svaleklire. Sjelden som ynglende. Trækfugl. Oftere paa Gjennemrejse. Yngler ikke i England.
84. *Totanus calidris*, Rødben. Almindelig som ynglende. Trækfugl, sjelden overvintrende. Talrig paa Gjennemrejse. Fra Stenalder.
85. *Totanus fuscus*, Sortklire. Ret faatallig paa Gjennemrejse.
86. *Totanus glottis*, Hvidklire. Ret almindelig paa Gjennemrejse.
87. *Machetes pugnax*, Brushane. Ret almindelig som ynglende. Trækfugl. Ogsaa gjennemvandrende. Fra Stenalder. Udryddet i England.
88. *Himantopus candidus*, Stylteløber. Tilfældig Gjæst fra Syd- eller Sydøst-Europa.
89. *Recurvirostra avocetta*, Klyde. Ynglende nogle faa Steder i Landet. Trækfugl. Kun som tilfældig i Norge, udryddet i England.
90. *Tringa minuta*, Dvergryle. Ret talrig paa Gjennemrejse.
91. *Tringa temminckii*, Temminck's Ryle. Ikke sjelden paa Gjennemrejse.
92. *Tringa maritima*, Sortgraa Ryle. Ikke sjelden paa Gjennemrejse og overvintrende.
93. *Tringa canutus*, Islandsk Ryle. Almindelig paa Gjennemrejse.
94. *Tringa alpina*, Ryle. Almindelig ynglende. Trækfugl, tildels overvintrende. Talrig paa Gjennemrejse.
95. *Tringa subarquata*, Krumnæbet Ryle. Ikke sjelden paa Gjennemrejse.
96. *Limicola pygmæa*, Brednæbet Ryle. Ret faatallig paa Gjennemrejse.
97. *Calidris arenaria*, Selning. Ret faatallig paa Gjennemrejse og overvintrende.

98. *Phalaropus hyperboreus*, Odinshane. Ret sjelden Gjæst paa Gjennemrejse og overvintrende.
99. *Phalaropus fulicarius*, Thorshane. Sjelden Gjæst paa Gjennemrejse eller overvintrende.
100. *Limnocyptes gallinula*, Enkelt Bekkasin. Ret almindelig paa Gjennemrejse og overvintrende.
101. *Gallinago scolopacina*, Hørsegjøg. Almindelig som ynglende. Trækfugl; enkelte undertiden overvintrende. Talrig paa Gjennemrejse.
102. *Gallinago major*, Tredækker. Tidligere ikke sjelden som ynglende, nu faatallig. Trækfugl. Ret talrig paa Gjennemrejse.
103. *Scolopax rusticula*, Skovsneppe. Faatallig som ynglende. Trækfugl, nogle undertiden overvintrende. Talrig paa Gjennemrejse.
104. *Larus minutus*, Dvergmaage. Faatallig som ynglende. Oftere som Vintergjæst. Kun som tilfældig i Norge og England.
105. *Larus ridibundus*, Hættemaage. Almindelig som ynglende. Nærmest Standfugl; har tidligere været mere udpræget Trækfugl. Fra Stenalder.
106. *Larus canus*, Stormmaage. Almindelig som ynglende. Standfugl. Fra Stenalder.
107. *Larus argentatus*, Havmaage. Ret almindelig som ynglende. Nærmest Standfugl. Fra Stenalder og Jernalder.
108. *Larus fuscus*, Sildemaage. Ret faatallig Vintergjæst.
109. *Larus marinus*, Svartbag. Maaske ynglende faatallig; ikke faa yngre, ikke ynglende Fugle oversomrende. Ret talrig som Vintergjæst og paa Gjennemrejse. Fra Stenalder.
110. *Larus leucopterus*, Hvidvinget Maage. Tilfældig Vintergjæst.
111. *Larus glaucus*, Graamaage. Tilfældig Vintergjæst.
112. *Larus tridactylus*, Ride. Ikke sjelden som Vintergjæst.
113. *Larus eburneus*, Ismaage. Tilfældig Vintergjæst.
114. *Sterna minuta*, Dvergterne. Ret almindelig som ynglende. Trækfugl. Findes ikke i Norge.
115. *Sterna hirundo*, Terne. Almindelig som ynglende. Trækfugl. Fra Stenalder.
116. *Sterna macrura*, Havterne. Almindelig som ynglende. Trækfugl.

117. *Sterna paradisea*, Dougall's Terne. Meget faatallig og vist ustadig som ynglende. Trækfugl. Findes ikke i Sverige og Norge.
118. *Sterna cantiaca*, Splitterne. Talrig som ynglende, men kun faa Steder. Trækfugl. I Sverige og Norge kun tilfældig.
119. *Sterna caspia*, Røvterne. Har ynglet faatallig i Landet; fra seneste Tid savnes Underretning. Trækfugl. Findes ikke i Norge, i England kun tilfældig.
120. *Sterna anglica*, Sandterne. Ret talrig som ynglende flere Steder. Trækfugl. Findes ikke i Norge, i Sverige og England kun tilfældig.
121. *Sterna leucoptera*, Hvidvinget Terne. Tilfældig Gjæst fra Syd- eller Sydøst-Europa.
122. *Sterna nigra*, Moseterne. Ret almindelig som ynglende. Trækfugl. I England udryddet som ynglende.
123. *Lestris parasitica*, Kjove. Meget faatallig som ynglende; fra nyeste Tid savnes Underretning. Ikke sjelden paa Gjennemrejse.
124. *Lestris longicauda*, Lille Kjove. Ikke helt sjelden paa Gjennemrejse.
125. *Lestris pomatorhina*, Mellemkjove. Faatallig og ustadig paa Gjennemrejse og som Vintergjæst.
126. *Lestris catarrhactes*, Storkjove. Tilfældig Vintergjæst.
127. *Cepphus grylle*, Tejste. Ret faatallig som ynglende. Almindelig Vintergjæst.
128. *Uria troile*, Lømvie. Yngler eller rettere har indtil for faa Aar siden ynglet i Landet, meget faatallig. Almindelig Vintergjæst. Fra Stenalder.
129. *Uria arra*, Kortnæbet Lømvie. Sjelden Vintergjæst.
130. *Mergulus alle*, Søkonge. Faatallig, ustadig Vintergjæst, undertiden mere talrig.
131. *Alca torda*, Alk. Yngler maaske endnu i Landet, meget faatallig. Almindelig som Vintergjæst. Fra Stenalder.
132. *Alca impennis*, Gejrfugl. I Danmark kun kjendt fra Stenalderen, dengang almindelig og vist ynglende her eller i Nærheden, at slutte efter Fund af Knogler af ganske unge Fugle.
133. *Fratercula arctica*, Lunde. Faatallig, ustadig Vintergjæst.
134. *Ardea comata*, Tophejre. Tilfældig Gjæst fra Syd, fra Mellem- eller Syd-Europa.

135. *Ardea bubulcus*, Kohejre. Tilfældig Gjæst fra Syd, fra Spanien eller Afrika.
136. *Ardea cinerea*, Hejre. Har været almindelig som ynglende, men er nu stærkt indskrænket. Trækfugl, undertiden faatallig overvintrende. Fra Stenalder og Jernalder.
137. *Ardea purpurea*, Purpurhejre. Tilfældig Gjæst fra Syd, snarest fra Holland.
138. *Ardetta minuta*, Dverghejre. Sjelden, dog vist ynglende. Trækfugl. I Sverig og Norge kun tilfældig.
139. *Botaurus stellaris*, Rørdrum. Har været almindelig som ynglende, men er nu ganske faatallig. Trækfugl, dog nogle overvintrende. Fra Stenalder. I Norge kun tilfældig, i England udryddet som ynglende.
140. *Nycticorax griseus*, Nathejre. Tilfældig Gjæst fra Syd, fra Mellem- eller Syd-Europa.
141. *Plegadis falcinellus*, Sort Ibis. Tilfældig Gjæst fra Syd-Europa.
142. *Platalea leucorodia*, Skehejre. Har en sjelden Gang forsøgt at yngle her, ellers kun som tilfældig Gjæst fra Syd, snarest fra Holland. I Sverig og Norge kun som tilfældig, i England udryddet som ynglende.
143. *Ciconia alba*, Stork. Almindelig som ynglende. Trækfugl. I Norge og England kun tilfældig.
144. *Ciconia nigra*, Sort Stork. Faatallig som ynglende. Trækfugl. Fra Stenalder. I Norge og England kun tilfældig.
145. *Phalacrocorax carbo*, Skarv. Har været almindelig som ynglende, men er i nyeste Tid udryddet. Kommer endnu som Vintergjæst, i det hele faatallig, men paa sine Steder i større Tal; nogle ganske faa, ikke ynglende, at se om Sommeren. Fra Stenalder og Jernalder. De Skarver, der senest ynglede hos os, ikke Stenalderens Skarver, synes, at dømme efter de faa opbevarede Skind, at have været af en lille Race, i Modsætning til den større, mere nordiske.
146. *Phalacrocorax graculus*, Topskarv. Tilfældig Vintergjæst.
147. *Pelecanus crispus*, Krøltoppet Pelikan. I Danmark kun kjendt fra Stenalderen, dengang vist som ynglende. I England ynglede den endnu i Jernalderen. I Nutiden findes den i Europa kun i den sydøstlige Del.
148. *Sula bassana*, Sule. Faatallig, ustadig Vintergjæst fra Atlanterhavet eller Nordsøen. Fra Stenalder og Jernalder;

synes dengang at have været almindeligere end i Nutiden, har vist haft Ynglesteder i større Nærhed.

149. *Falco tinnunculus*, Taarnfalk. Ret almindelig som ynglende. Overvintrende, i hvert Fald tildels.
150. *Falco vespertinus*, Rødfodfalk. Sjelden, men har dog vist undertiden ynglet her. Trækfugl. I Norge og England kun tilfældig.
151. *Falco aesalon*, Dvergfalk. Ikke sjelden paa Gjennemrejse og som Vintergjæst.
152. *Falco subbuteo*, Lærkefalk. Ikke helt sjelden som ynglende. Trækfugl.
153. *Falco peregrinus*, Vandrefalk. Har ynglet faatallig i Landet, men er nu saa godt som udryddet. Ikke helt sjelden som Vintergjæst.
154. *Falco gyrfalco*, Jagtfalk. Faatallig og ustadig Vintergjæst.
155. *Buteo vulgaris typicus* & var. *desertorum* (med *zimmermannæ*), Musevaage. Den typiske Race har været almindelig som ynglende i Landet, men er i de senere Aar ikke lidt indskrænket. Mest Trækfugl, nogle overvintrende. Almindelig paa Gjennemrejse. Fra Stenalder og Jernalder. Racen *desertorum* synes at være ikke helt sjelden paa Gjennemrejse fra Øst, fra Rusland.
156. *Buteo ferox*, Ørnevaage. Tilfældig Gjæst fra Sydøst-Europa.
157. *Buteo lagopus*, Vintermusevaage. Ikke sjelden som Vintergjæst.
158. *Aquila nevia*, Skrigørn. Tilfældig Gjæst fra Syd, vist fra Tyskland.
159. *Aquila fulva*, Kongeørn. Skal have ynglet i Landet, men er nu udryddet. Faatallig som Vintergjæst. Fra Stenalder og Jernalder.
160. *Haliaëtus albicilla*, Havørn. Har ynglet ret almindelig i Landet, men er nu saa godt som udryddet. Nærmest Standfugl. Ikke helt sjelden som Vintergjæst. Fra Stenalder og Jernalder.
161. *Circaëtus gallicus*, Slangeørn. Tilfældig Gjæst fra Syd, vist fra Tyskland.
162. *Pernis apivorus*, Hvepsevaage. Faatallig som ynglende. Trækfugl. Ret talrig paa Gjennemrejse. Fra Stenalder. I England kun sjelden.

163. *Milvus migrans*, Sort Glente. Tilfældig Gjæst fra Syd, vel fra Tyskland.
164. *Milvus icinus*, Glente. Har været almindelig som ynglende i Landet, men er i Løbet af faa Aar saa godt som udryddet. Trækfugl. Fra Stenalder. I Norge kun i det sydøstligste Hjørne, i England næsten udryddet.
165. *Circus æruginosus*, Rørhøg. Indtil for faa Aar siden almindelig som ynglende, nu næsten udryddet. Trækfugl. Findes ikke i Norge, næsten udryddet i England.
166. *Circus cineraceus*, Enghøg. Meget faatallig som ynglende. Trækfugl. Findes ikke i Norge, i Sverig kun tilfældig, sjelden i England.
167. *Circus cyaneus*, Blaa Kjærhøg. Har ynglet faatallig i Landet; fra nyere Tid haves ingen Underretning. Ikke helt sjelden paa Gjennemrejse og som Vintergjæst. I England næsten udryddet.
168. *Circus pallidus*, Steppehøg. Tilfældig Gjæst fra Øst, vist fra Syd-Rusland.
169. *Accipiter nisus*, Spurvehøg. Ret almindelig som ynglende. Nærmest Trækfugl, dog ikke faa overvintrende. Talrig paa Gjennemrejse.
170. *Astur palumbarius*, Duehøg. Har været ikke sjelden som ynglende, men er nu næsten udryddet. Nærmest Standfugl. Faatallig som Vintergjæst. Fra Bronzealder og Jernalder. I England kun tilfældig.
171. *Pandion haliaëtus*, Fiskeørn. Har været ikke helt sjelden som ynglende, men er nu saa godt som udryddet. Trækfugl. Faatallig paa Gjennemrejse. Fra Stenalder.
172. *Gyps fulvus*, Gul Grib. Tilfældig Gjæst fra Syd-Europa.
173. *Glaucidium passerinum*, Spurveugle. Sjelden Vintergjæst.
174. *Athene noctua*, Kirkeugle. Almindelig som ynglende i Jylland og paa Fyn, i andre Dele af Landet kun sjelden. Nærmest Standfugl. I Sverig og England kun tilfældig, kjendes ikke fra Norge.
175. *Nyctale funerea*, Perleugle. Ret sjelden Vintergjæst.
176. *Surnia ulula*, Høgeugle. Sjelden Vintergjæst.
177. *Syrnium aluco*, Natugle. Almindelig som ynglende, men synes at svinde i Tal ligesom vore andre Ugler. Standfugl. Fra Stenalder og Jernalder.

178. *Otus brachyotus*, Mose-Hornugle. Faatallig som ynglende. Almindelig paa Gjennemrejse og som Vintergjæst.
179. *Otus vulgaris*, Skov-Hornugle. Ikke helt sjelden som ynglende. Talrigere paa Gjennemrejse og som Vintergjæst.
180. *Bubo maximus*, Stor Hornugle. Har ynglet faatallig i Landet, men er nu, tildels af Æggesamlere, udryddet som ynglende. Faatallig og ustadig som Vintergjæst. I England kun tilfældig.
181. *Nyctea nivea*, Sneugle. Faatallig og ustadig Vintergjæst.
182. *Strix flammea*, Slørugle. Ikke helt sjelden som ynglende. Standfugl. I Norge kun tilfældig.
183. *Syrhaptus paradoxus*, Steppehøne. Er et Par Gange flokkevis indvandret i Landet fra Øst, fra Asien, og har da ynglet her, men er snart igjen forsvunden.
184. *Turtur auritus typicus* & var. *orientalis*, Turteldue. Den typiske Race meget faatallig og vist ustadig som ynglende. Nærmest Trækfugl. Racen *orientalis* tilfældig Gjæst fra Syd eller Øst-Asien.
185. *Columba oenas*, Huldue. Ret faatallig som ynglende. Nærmest Trækfugl. Talrigere paa Gjennemrejse.
186. *Columba palumbus*, Ringdue. Almindelig som ynglende. Nærmest Trækfugl, dog ofte overvintrende. Fra Stenalder.
187. *Caprimulgus europæus*, Natravn. Faatallig som ynglende. Trækfugl.
188. *Cypselus apus*, Mursvale. Almindelig som ynglende. Trækfugl.
189. *Cypselus melba*, Alpesejler. Tilfældig Gjæst fra Syd, fra Frankrig, Schweiz eller det sydligere Europa.
190. *Coracias garrulus*, Ellekrage. Har ynglet i Landet, men er udryddet som ynglende. Faatallig paa Gjennemrejse og bortskydes stadig, mod Loven. I Norge og England kun tilfældig.
191. *Merops apiaster*, Biæder. Tilfældig Gjæst fra Syd, fra Mellem- eller Syd-Europa.
192. *Alcedo ispida*, Isfugl. Faatallig som ynglende. Ikke helt sjelden som Vintergjæst. Bortskydes stadig, mod Loven.
193. *Cuculus canorus*, Gjøg. Almindelig som ynglende. Trækfugl.
194. *Iynx torquilla*, Vendehals. Faatallig som ynglende. Trækfugl. Ret almindelig paa Gjennemrejse.
195. *Gecinus canus*, Graaspet. Sjelden Vintergjæst.

196. *Gecinus viridis*, Grønspet. Faatallig som ynglende. Standfugl.
197. *Dendrocopus minor*, Lille Flagspet. Sjelden Vintergjæst.
198. *Dendrocopus medius*, Mellemflagspet. Ret sjelden som ynglende. Standfugl. Findes ikke i Norge og England.
199. *Dendrocopus major*, Stor Flagspet. Ret almindelig som ynglende. Standfugl. Fra Stenalder.
200. *Picus martius*, Sortspet. Sjelden Vintergjæst. Fra Stenalder, dengang vist hjemmehørende i Landet. Findes neppe i England.
201. *Upupa epops*, Hærfugl. Har ynglet i Landet som ikke sjelden, men er udryddet. Af og til viser den sig endnu, men bortskydes stadig, mod Loven. Var Trækfugl.
202. *Garrulus glandarius*, Skovskade. Endnu ret almindelig som ynglende, men forfølges meget. Nærmest Standfugl. Undertiden ret talrig som Vintergjæst. Fra Stenalder.
203. *Nucifraga caryocatactes typicus* & var. *macrorhynchus*, Nøddekrige. Meget faatallig og vist ustadig som ynglende. Undertiden talrig som Vintergjæst, vistnok især kommende fra Øst, fra Sibirien (var. *macrorhynchus*).
204. *Pica caudata*, Skade. Almindelig som ynglende, men pletvis. Standfugl.
205. *Corvus monedula*, Allike. Almindelig som ynglende, dog pletvis. Dels Standfugl, dels Trækfugl. Talrig paa Gjennemrejse. Fra Bronzealder.
206. *Corvus frugilegus*, Raage. Almindelig som ynglende. Mest Trækfugl, nogle overvintrende. Talrig paa Gjennemrejse.
207. *Corvus cornix typicus* & var. *corone*, Krage og Sortkrage. Kragen almindelig som ynglende. Standfugl. Talrig som Vintergjæst. Fra Stenalder og Jernalder. Sortkragen kun sjelden ynglende. I Sverig og Norge er Sortkragen kun tilfældig.
208. *Corvus corax*, Ravn. Har indtil for faa Aar siden været almindelig som ynglende, men er nu saa godt som udryddet. Standfugl. Fra Bronzealder.
209. *Lanius collyrio*, Tornskade. Ret almindelig som ynglende. Trækfugl.
210. *Lanius senator*, Rødhovedet Tornskade. Meget sjelden, men skal dog have ynglet i Landet. Findes ikke i Sverig og Norge og kun tilfældig i England.

211. *Lanius minor*, Rosenbrystet Tornskade. Tilfældig Gjæst fra Syd, fra Tyskland.
212. *Lanius excubitor typicus* & var. *major*, Stor Tornskade. Meget faatallig som ynglende; sikker Underretning savnes fra nyere Tid, i hvert Fald. Ofte paa Gjennemrejse og som Vintergjæst.
213. *Oriolus galbula*, Pirol. Faatallig som ynglende, mest i Landets sydligste Dele. Trækfugl. I Sverig og Norge kun tilfældig, i England nærmest ligeledes.
214. *Ampelis garrula*, Silkehale. Vintergjæst, ustadig, undertiden talrig.
215. *Hirundo riparia*, Digesvale. Almindelig som ynglende. Trækfugl.
216. *Hirundo urbica*, Bysvale. Almindelig som ynglende. Trækfugl.
217. *Hirundo rustica*, Forstuesvale. Almindelig som ynglende. Trækfugl. Talrig paa Gjennemrejse.
218. *Sitta europæa typica* & var. *cæsia*, Spetmejse. Almindelig som ynglende, den typiske Race paa Sjælland, Racen *cæsia* i Jylland, begge paa Fyn. Standfugl. Racen *cæsia* findes ikke i Sverig og Norge, Racen *typica* ikke i England.
219. *Alauda arborea*, Hedelærke. Faatallig som ynglende. Trækfugl. Ret almindelig paa Gjennemrejse.
220. *Alauda arvensis*, Lærke. Almindelig som ynglende, vist den talrigste Fugl i Landet. Trækfugl, enkelte overvintrende. Meget talrig paa Gjennemrejse.
221. *Alauda cristata*, Toplærke. Ret almindelig som ynglende i Jylland, ifærd med at brede sig paa Øerne. Standfugl. I England kun tilfældig.
222. *Alauda alpestris*, Bjerglærke. Faatallig og ustadig Vintergjæst.
223. *Sturnus vulgaris*, Stær. Almindelig som ynglende. Trækfugl, nogle undertiden overvintrende.
224. *Pastor roseus*, Rosenstær. Tilfældig Gjæst fra Sydøst-Europa.
225. *Troglodytes parvulus*, Gjerdesmutte. Almindelig som ynglende. Nærmest Standfugl. Ogsaa almindelig som Vintergjæst.
226. *Certhia familiaris*, Træpikker. Almindelig som ynglende. Standfugl.

227. *Cinclus aquaticus* var. *melanogaster*, Vandstær. Meget faatallig som ynglende. Ikke sjelden som Vintergiæst.
228. *Accentor modularis*, Jernspurv. Ret almindelig som ynglende. Tildels Trækfugl, nogle overvintrende.
229. *Parus major*, Musvit. Almindelig som ynglende. Standfugl.
230. *Parus coeruleus*, Blaamejse. Almindelig som ynglende. Standfugl.
231. *Parus ater*, Sortmejse. Ikke sjelden som ynglende, bredende sig i de plantede Naaleskove. Standfugl. Den typiske Race i England kun tilfældig.
232. *Parus palustris*, Graamejse. Ret almindelig som ynglende. Standfugl.
233. *Parus cristatus*, Topmejse. Faatallig som ynglende, i Jylland, bredende sig i Naaleskovene. Standfugl.
234. *Acredula caudata*, Halamejse. Ret faatallig som ynglende. Standfugl. Den typiske Race i England kun tilfældig.
235. *Sylvia cinerea*, Tornsanger. Almindelig som ynglende. Trækfugl.
236. *Sylvia curruca*, Gjerdesanger. Almindelig som ynglende. Trækfugl.
237. *Sylvia atricapilla*, Munk. Almindelig som ynglende. Trækfugl.
238. *Sylvia hortensis*, Havesanger. Almindelig som ynglende. Trækfugl.
239. *Sylvia nisoria*, Høgesanger. Ret faatallig som ynglende. Trækfugl. I England kun tilfældig.
240. *Hypolais icterina*, Gulbug. Almindelig som ynglende. Trækfugl. I England kun tilfældig.
241. *Acrocephalus palustris*, Kjærsanger. Ikke sjelden som ynglende. Trækfugl. Findes ikke i Norge og kun sjelden i England.
242. *Acrocephalus arundinaceus*, Rørsanger. Almindelig som ynglende. Trækfugl. Findes ikke i Norge.
243. *Acrocephalus turdinus*, Drosselrørsanger. Ikke helt sjelden som ynglende. Trækfugl. Findes ikke i Sverig og Norge og kun tilfældig i England.
244. *Acrocephalus phragmitis*, Sivsanger. Almindelig som ynglende. Trækfugl.

245. *Acrocephalus aquaticus*, Vandsanger. Sjelden som ynglende. Trækfugl. Findes ikke i Sverig og Norge og kun tilfældig i England.
246. *Locustella naevia*, Græshoppesanger. Ynglende i Landets sydligste Dele. Trækfugl. Sjelden paa Gjennemrejse. Findes ikke i Sverig.
247. *Locustella fluviatilis*, Flodsanger. Tilfældig Gjæst fra Øst-Europa.
248. *Phyllopeustes trochilus*, Løvsanger. Almindelig som ynglende. Trækfugl. Talrig paa Gjennemrejse.
249. *Phyllopeustes rufus*, Gransanger. Meget faatallig og vist ustadig som ynglende. Trækfugl. Ikke sjelden paa Gjennemrejse.
250. *Phyllopeustes sibilatrix*, Grøn Løvsanger. Ikke sjelden som ynglende. Trækfugl.
251. *Phyllopeustes superciliosus*, Hvidbrynet Løvsanger. Tilfældig Gjæst fra Øst, fra Sibirien.
252. *Regulus cristatus*, Fuglekonge. Almindelig som ynglende, bredende sig i Naaleskovene. Nærmest Standfugl. Paa Gjennemrejse desuden talrig.
253. *Regulus ignicapillus*, Rødtoppet Fuglekonge. Tilfældig Gjæst fra Syd, vel fra Tyskland.
254. *Anthus pratensis*, Engpiber. Almindelig som ynglende. Trækfugl; enkelte kunne sees om Vinteren. Talrig paa Gjennemrejse.
255. *Anthus aquaticus* var. *obscurus*, Skjærpiber. Ret faatallig som ynglende. Nærmest Trækfugl, tildels overvintrende.
256. *Anthus campestris*, Markpiber. Faatallig som ynglende. Trækfugl. Findes ikke i Norge og kun som tilfældig i England.
257. *Anthus arboreus*, Skovpiber. Almindelig som ynglende. Trækfugl.
258. *Motacilla flava typica* & var. *borealis*, Gul Vipstjert. Den typiske Race almindelig som ynglende. Trækfugl. I England kun tilfældig, dér erstattet af en anden Race. Racen *borealis* faatallig paa Gjennemrejse. Findes ikke i England.
259. *Motacilla melanope*, Bjergvipstjert. Tilfældig Gjæst fra Syd eller Vest, fra Tyskland eller England.
260. *Motacilla alba typica* & var. *lugubris*, Hvid Vipstjert og Sorttrygget Vipstjert. Den typiske Race almindelig som

- ynglende. Trækfugl. Racen *lugubris* tilfældig Gjæst, vist fra Vest, fra England, hvor den er almindelig, medens den typiske Race kun er tilfældig; ogsaa i Norge er Racen *lugubris* funden ynglende, men faatallig.
261. *Turdus iliacus*, Vindrossel. Almindelig, undertiden meget talrig, paa Gjennemrejse, ofte nogle overvintrende.
262. *Turdus musicus*, Sangdrossel. Almindelig som ynglende. Trækfugl. Talrig paa Gjennemrejse, undertiden enkelte overvintrende.
263. *Turdus visivorus*, Misteldrossel. Ret faatallig som ynglende. Nærmest Trækfugl, tildels overvintrende. Mere talrig paa Gjennemrejse. Fra Stenalder.
264. *Turdus atrigularis*, Sortstrubet Drossel. Tilfældig Gjæst fra Øst, fra Sibirien.
265. *Turdus fuscatus*, Brundrossel. Tilfældig Gjæst fra Øst, fra Sibirien.
266. *Turdus pilaris*, Sjagger. Talrig paa Gjennemrejse og som Vintergjæst.
267. *Turdus torquatus*, Ringdrossel. Ret faatallig paa Gjennemrejse.
268. *Turdus merula*, Solsort. Almindelig som ynglende. Nærmest Standfugl. Talrig paa Gjennemrejse. Var endnu i 80erne i forrige Hundredaar en ret faatallig, spredt levende Skovfugl, men er siden bleven en af vore almindeligste Fugle, baade i Skovene og i Haver ved og i Byerne.
269. *Saxicola oenanthe*, Stenpikker. Almindelig som ynglende. Trækfugl. Talrig paa Gjennemrejse. I Vandretiden er af og til set Stenpikkere, der ere større end sædvanlig; om de ere komne fra Island eller Grønland, hvor Stenpikkeren plejer at være stor, eller om de have været hjemmehørende her i Landet, kan ikke siges.
270. *Praticola rubetra*, Bynkefugl. Almindelig som ynglende. Trækfugl. Talrig paa Gjennemrejse.
271. *Praticola rubicola*, Sortstrubet Bynkefugl. Faatallig, vist ynglende i det sydlige Jylland. Nærmest Trækfugl, vist tildels overvintrende. I Sverig og Norge kun tilfældig.
272. *Ruticilla phoenicura*, Rødstjert. Noget faatallig som ynglende. Trækfugl. Talrig paa Gjennemrejse. Fra Stenalder.
273. *Ruticilla titys*, Sort Rødstjert. Endnu faatallig som ynglende, dog i de sidste Aar ret hurtig bredende sig over

- Landet. Trækfugl, vist tildels overvintrende. I Sverig og Norge kun tilfældig, i England nærmest kun Vintergjæst.
274. *Erithacus rubecula*, Rødkjælk. Almindelig som ynglende. Trækfugl, dog nogle overvintrende. Talrig paa Gjennemrejse.
275. *Cyanecula suecica typica* & var. *leucocyanea*, Blaakjælk, med rød eller hvid (eller uden) Strubeplet. Racen *leucocyanea*, sydlig, meget faatallig som ynglende. Trækfugl. Ikke kjendt fra Sverig og Norge, i England kun tilfældig. Den typiske Race, nordlig, ret sjelden paa Gjennemrejse. I England kun tilfældig.
276. *Luscinia vera*, Sydlig Nattergal. Ynglende i det sydligste Jylland og maaske paa Fyn; nærmere Underretning om dens Grænser mod vor almindelige Nattergal savnes. Trækfugl. Kjendes ikke fra Sverig og Norge.
277. *Luscinia philomela*, Nattergal. Almindelig som ynglende over det meste af Landet, dog ikke i det nordlige og vestlige Jylland. Trækfugl. Findes ikke i Norge og England.
278. *Muscicapa parva*, Lille Fluesnapper. Meget faatallig og neppe stadig som ynglende. Trækfugl. Findes ikke i Norge, i England kun tilfældig.
279. *Muscicapa atricapilla typica* & var. *collaris*, Broget Fluesnapper og Hvidhalset Fluesnapper. Den typiske Race almindelig som ynglende. Trækfugl. Talrig paa Gjennemrejse. Racen *collaris* tilfældig Gjæst fra Syd og Øst. I Sverig ynglende i den sydøstligste Del, ikke funden i Norge og England.
280. *Muscicapa grisola*, Graa Fluesnapper. Almindelig som ynglende. Trækfugl.
281. *Passer domesticus*, Spurv. Almindelig som ynglende. Standfugl.
282. *Passer montanus*, Skovspurv. Almindelig som ynglende. Standfugl.
283. *Fringilla coelebs*, Bogfinke. Almindelig som ynglende, Landets almindeligste Skovfugl. Tildels Trækfugl, mange overvintrende. Talrig paa Gjennemrejse.
284. *Fringilla montifringilla*, Kvæker. Almindelig som Vintergjæst, undertiden i meget stor Mængde.
285. *Coccothraustes vulgaris*, Kjernebider. Ikke sjelden som ynglende. Nærmest Standfugl.

286. *Chrysomitris spinus*, Sisken. Faatallig som ynglende. Almindelig som Vintergjæst.
287. *Carduelis elegans*, Stillits. Ret almindelig som ynglende. Tildels Standfugl.
288. *Ligurinus sinicus*, Brunsvenske. Tilfældig Gjæst fra Øst-Asien.
289. *Ligurinus chloris*, Svenske. Almindelig som ynglende. Tildels Standfugl.
290. *Serinus hortulanus*, Gulirisk. Tilfældig Gjæst fra Syd, vist fra Tyskland.
291. *Cannabina linota*, Irisk. Almindelig som ynglende. Mest Trækfugl, enkelte overvintrende.
292. *Cannabina flavirostris*, Bjergirisk. Ret almindelig Vintergjæst.
293. *Cannabina linaria typica* & var. »*holboellii*«, Graasisken. Den typiske Race ret almindelig Vintergjæst. Racen »*holboellii*« sjelden Vintergjæst.
294. *Pyrrhula vulgaris*, Dømpap. Ret almindelig Vintergjæst.
295. *Pinicola enucleator*, Krognæb. Ustadig, undertiden ret almindelig Vintergjæst.
296. *Loxia leucoptera*, Hvidvinget Korsnæb. Tilfældig Vintergjæst fra Rusland eller Sibirien, undertiden ret talrig.
297. *Loxia curvirostra typica* & var. *pityopsittacus*, Korsnæb og Stor Korsnæb. Korsnæben ret faatallig som ynglende. Mere talrig som Vintergjæst. Den Store Korsnæb ikke helt sjelden som Vintergjæst.
298. *Emberiza schoeniclus*, Rørspurv. Almindelig som ynglende. Mest Trækfugl, nogle overvintrende. Talrig paa Gjennemrejse.
299. *Emberiza hortulana*, Hortulan. Kun en sjelden Gang funden ynglende i Landet. Trækfugl. Faatallig paa Gjennemrejse. I England kun tilfældig.
300. *Emberiza citrinella*, Gulspurv. Almindelig som ynglende. Mest Standfugl.
301. *Emberiza miliaria*, Bomlærke. Almindelig som ynglende. Nærmest Standfugl.
302. *Emberiza lapponica*, Laplands-Verling. Tilfældig Vintergjæst.
303. *Emberiza nivalis*, Snespurv. Almindelig Vintergjæst.

Af vore 303 Arter ere altsaa omtrent 68 at regne for tilfældige Gjæster, og omtrent 45 ere Gjæster, der mere eller mindre stadig vise sig paa Gjennemrejse eller opholde sig her om Vinteren. Kun 190, meget rigelig talt, ere at regne for at være eller at have været hjemmehørende i Landet som ynglende. Af dem ere 4 Arter, Tjur, Gejrfugl, Krøltoppet Pelikan og Sortspet, forlængst forsvundne herfra, vel mest af naturlige Grunde. I nyeste Tid derimod er en hel Række af vore største og smukkeste Fugle, især blandt Rovfuglene, ifærd med at forsvinde, mest paa Grund af vilkaarlig Forfølgelse fra Samlere og Jægere. Af Mænd, der ikke bryde sig stort om Natur, og som ikke kjende stort til Fuglenes Virken, er der dannet Selskaber med det Maal at udrydde en væsentlig Del af vore Fugle. Nogle Arter ere saa godt som uigjenkaldelig borte; andre gaa ned i Tal med rivende Fart. Den første Opgave, der foreligger for Danmarks Fuglekyndige, er den: at gjøre deres til at hindre, at vor Fugleverdens Fjender faa Lov at arbejde, indtil det er for sent.

Foreningens Bestyrelse bringer herved Herr Viceinspector Winge sin Tak for det Arbejde, han har udført ved at affatte ovenstaaende Liste. De deri brugte systematiske Navne ville for Fremtiden blive anvendte i Tidsskriftet, hvor ikke Forfatterne af særlige Grunde ønske at bruge andre.

Da Omtrykning af første Hæfte dog skulde foretages, have vi fundet det naturligt, at lade denne Liste over Danmarks Fugle begynde vort Tidsskrift.

For første Gang i en lang Række Aar er der nu givet en fuldstændig Fortegnelse over Danmarks Fugle; men om mange Arters Forekomst og Ynglen er Kundskaben endnu ret mangelfuld, og Bestyrelsen opfordrer derfor Medlemmerne til at indsende alle Meddelelser, som de mene kunne udfylde eller berigtige Listen, til Foreningens Formand E. Lehn Schiøler, Fredericiagade 57^{III}, København.