


der har været saa venlige at give mig Oplysninger eller optage Artikler om Sagen, særlig til d'Hrr. Redaktører for vor stedlige Presse: »Viborg Stiftstidende«, »Viborg Stifts Folkeblad«, »Viborg Amtstidende« og »Viborg Amts Socialdemokrat«. Hr. Universitetsboghandler Gad er jeg forbunden for Laanet af de Clichéer fra L, der er mærket med *.



Mærkede Fugles Rejser: B Biel (Stær Nr. 1031). C Crefeld (Musevaage Nr. 1). D Dieckow (Stork Nr. 9). G 's Gravezande (Musevaage Nr. 8). H Hermannstadt (Frøken Paulis Stork). L Lister (Stær Nr. 193). M Marclowitz (Stork Nr. 34). P Puente Genil (Glente Nr. 5). T Texel (Stær Nr. 1151). W Weseram (Frøken Paulis Stork). Wulkow (den første Stork) er mellem W og D.

LISTE OVER FUGLE IAGTTAGNE PAA BORNHOLM SÆRLIG I ALMINDINGEN.

AF

L. JENSEN-TUSCH.

Anas crecca, Krikand. Yngler. Talrig paa Efteraarstrækket.

Anas querquedula, Atling. Sjelden. Enkelte Individder skudte i Moserne her i Almindingen. Trækfugl.

- Anas penelops*, Pibeand. Yngler; ses og skydes jævnlig.
- Anas strepera*, Knarand. Et enkelt Individ skudt i Bastamose Efteraar 1904.
- Anas acuta*, Spidsand. Ses og skydes jævnlig. Trækfugl.
- Anas boscas*, Stokand. Almindelig.
- Anas clypeata*, Skeand. Ses ofte; skudt her i Almindingen paa Andejagt i Juli Maaned 1902.
- Tadorna cornuta*, Gravand. Set een Gang i Aasedam her i Almindingen.
- Tadorna casarca*, Rustand. Skudt en Gang i Bastamose.
- Cygnus musicus*, Sangsvane. Almindelig som Trækfugl. Skudt flere Gange.
- Fuligula cristata*, Troidand. Skudt i Bastamose. Ret sjelden.
- Fuligula marila*, Bjergand. Almindelig i Moserne her i Almindingen som Trækfugl.
- Fuligula ferina*, Taffeland. Ikke sjelden om Efteraaret.
- Clangula glaucion*, Hvinand. Et Eksemplar skudt i Bastamose.
- Pagonetta glacialis*, Havlit. Skudt i Bastamose.
- Somateria mollissima*, Ederfugl. Skudt i Bastamose. Yngler ved Kristiansø, hvor jeg har set den rugende Fugl paa Reden.
- Mergus albellus*, Lille Skallesluger. 2 Stk. set tidlig i Foraaret 1905 ved Bastamose.
- Anser cinereus*, Graagaas. Talrig her For- og Efteraar.
- Anser torquatus*, Knortegaas. Sjelden Gjest her. 2 Stk. skudte.
- Coturnix communis*, Vagtel. Enkelte Aar ret talrig om Efteraaret, saaledes 1906.
- Perdix cinerea*, Agerhøne. Almindelig, dog først i de senere Aar. (*Tetrao tetrix*, Urfugl. Indført her).
- (*Tetrao urogallus*, Tjur. Indført her).
- Tachybaptus minor*, Lille Lappedykker. Almindelig her i Moserne.
- Podiceps griseigena*, Graa- eller brunstrubet Lappedykker. Yngler her talrig.
- Crex pratensis*, Engsnarre, Vagtelkonge. Kun set faa Gange. Skudt.
- Rallus aquaticus*, Vandrikse. Flere Gange skudt i Bastamose.
- Porzana maruetta*, Plettet Sumphøne. Skudt i Bastamose. Ikke sjelden.
- Fulica atra*, Blishøne. Almindelig her i alle Moser.
- Grus cinerea*, Trane. Talrig i Træktiden. Har tidligere ynglet her i Almindingen.
- Vanellus cristatus*, Vibe. Almindelig.

- Charadrius pluvialis*, Hjejle. Her vist kun som Trækfugl.
- Ægialitis hiaticula*, Præstekrave. Set i Klitterne ved Snogebæk.
- Hæmatopus ostreologus*, Strandskade. Almindelig ved Øens Kyster mod Syd.
- Numenius arquatus*, Storspove. En stor Flok set en Gang ved Bastamose. Dens Fløjten høres ofte.
- Limosa lapponica*, Kobbørsneppe. Ses som Trækfugl.
- Tringa alpina*, Ryle. Almindelig.
- Limnocyptes gallinula*, Enkelt Bekkasin. Ret almindelig sent paa Efteraaret.
- Gallinago scolopacina*, Horsegjøg. Almindelig. Yngler her.
- Gallinago major*, Tredækker. Sjelden, dog skudt her.
- Ardea cinerea*, Hejre. Ikke ynglende her paa Øen. Kommer ofte som Trækfugl.
- Ciconia alba*, Stork. Ret sjelden her. Yngler ikke.
- Ciconia nigra*, Sort Stork. Set enkelte Gange i Moserne her i Almindingen.
- Falco tinnunculus*, Taarnfalk. Almindelig som ynglende.
- Falco æsalon*, Dvergfalk. Ses ofte. Ikke ynglende.
- Falco subbuteo*, Lærkefalk. Yngler her i Almindingen.
- Falco peregrinus*, Vandrefalk. Skudt her i Almindingen. Sjelden.
- Buteo vulgaris*, Musevaage. Yngler her, dog kun enkelte Par.
- Buteo lagopus*, Vintermusevaage. Talrig som Trækfugl. Enkelte her hele Vinteren.
- Aquila fulva*, Kongeørn. Forekommer hver Vinter som Trækfugl.
- Haliaëtus albicilla*, Havørn. Enkelte Gange set.
- Milvus iclinus*, Glente. Kun set een Gang her.
- Circus cyaneus*, Blaa Kjærhøg. Set ved Bastamose.
- Accipiter nisus*, Spurvehøg. Yngler her faatallig.
- Astur palumbarius*, Duehøg. Ikke ynglende paa Øen. Ses ikke ofte.
- Strix Tengmalmi*, Perleugle. Enkelte Vintre her i stor Mængde som Trækfugl.
- Syrnium aluco*, Natugle. Almindelig.
- Otus vulgaris*, Skov-Hornugle. Ret almindelig som ynglende.
- Nyctea nivea*, Sneugle. Talrig her som Trækfugl — især i Vinteren 1889—90.
- Columba oenas*, Huldue. Ses kun paa Træk.
- Columba palumbus*, Ringdue. Yngler almindelig i alle Skove. Talrig paa Træk. Enkelte Stykker overvintre.
- Caprimulgus europæus*, Natravn. Faatallig, dog ynglende.

- Cypselus apus*, Mursvale. Ses som Trækfugl ofte i store Flokke.
Coracias garrulus, Ellekrage. Forekommer hvert Aar som Trækfugl i Maj—Juni.
Alcedo ispida, Isfugl. Kun set een Gang.
Cuculus canorus, Gjøg. Almindelig.
Iynx torquilla, Vendehals. For en Del Aar siden ikke sjelden her om Foraaret — ikke set de senere Aar.
Dendrocopus major, Stor Flagspet. Yngler her, dog kun faa Par.
Upupa epops, Hærfugl. Set her ved Skovfogedstedet, hvor en enkelt Fugl opholdt sig i flere Dage. Samme Foraar skudt flere Steder paa Øen.
Garrulus glandarius, Skovskade. Yngler her. Talrig som Trækfugl.
Nucifraga caryocatactes, Nøddekrige. Enkelte Aar her i stor Mængde som Trækfugl. Yngler ikke her paa Øen.
Pica caudata, Skade. Almindelig.
Corvus monedula, Allike. Almindelig.
Corvus frugilegus, Raage. Almindelig.
Corvus cornix typicus, Krage. Meget almindelig.
Corvus corone, Sortkrage. Et enkelt Eksemplar set hele Vinteren ved Skovridergaarden Rømersdal.
Corvus corax, Ravn. Enkelte Gange set paa Østkysten. Har før ruget paa Klipperne ved Rø. Nu vist ikke mere ynglende paa Bornholm.
Lanius collyrio, Tornskade. Ret sjelden, dog ynglende.
Lanius major, Stor Tornskade. Ses hver Vinter som Trækfugl. Jager Smaaafugle.
Ampelis garrula, Silkehale. Ofte her som Vintergjæst. Besøger mest Haverne ved Byerne, dog ogsaa set her i Almindingen.
Hirundo riparia, Digesvale. Yngler her flere Steder.
Hirundo urbica, Bysvale. Almindelig.
Hirundo rustica, Forstuesvale. Almindelig.
Sitta europæa typica, Spetmejse. Sjelden Gjæst paa Træk.
Alauda arvensis, Lærke. Almindelig.
Alauda cristata, Toplærke. Set her ved Skovfogedstedet.
Alauda alpestris, Bjerglærke. Set een Gang.
Sturnus vulgaris, Stær. Almindelig.
Troglodytes parvulus, Gjerdesmutte. Her hele Aaret.
Certhia familiaris, Træpikker. Ses ofte, vist ikke ynglende.
Cinclus aquaticus, Vandstær. Set her i Almindingen enkelte Gange.
Parus major, Musvit. Almindelig.

- Parus coeruleus*, Blaamejse. Som Trækfugl ikke sjelden.
- Parus palustris*, Graamejse. Almindelig.
- Acredula caudata*, Halemejse. Ses ofte i Smaaflokke om Vinteren.
- Regulus cristatus*, Fuglekonge. Findes Aaret rundt. Talrig paa Træk.
- Motacilla alba typica*, Hvid Vipstjert. Almindelig som ynglende.
- Turdus iliacus*, Vindrossel. Forekommer i store Flokke som Trækfugl.
- Turdus musicus*, Sangdrossel. Yngler her, dog ej talrig.
- Turdus viscivorus*, Misteldrossel. Ses som Gjæst.
- Turdus pilaris*, Sjagger. Som Trækfugl i store Flokke.
- Turdus torquatus*, Ringdrossel. Et enkelt Eksempel set her i Almindingen i Juni Maaned 1906.
- Turdus merula*, Solsort. Almindelig hele Aaret. Talrig i Haven her.
- Saxicola oenanthe*, Stenpikker. Almindelig som ynglende.
- Praticola rubetra*, Bynkefugl. Almindelig som ynglende.
- Ruticilla phoenicura*, Rødstjert. Almindelig som Trækfugl For- og Efteraar.
- Erithacus rubecula*, Rødkjælk. Almindelig som ynglende. Overvintrer.
- Luscinia philomela*, Nattergal. Almindelig som ynglende.
- Muscicapa atricapilla*, Broget Fluesnapper. Almindelig som Trækfugl.
- Passer domesticus*, Spurv. Almindelig.
- Passer montanus*, Skovspurv. Ret almindelig.
- Fringilla coelebs*, Bogfinke. Almindelig som ynglende. Overvintrer.
- Fringilla montifringilla*, Kvækerfinke. Almindelig som Vintergjæst her i store Flokke.
- Coccothraustes vulgaris*, Kjernebider. Ses ret jævnlig som Gjæst.
- Chrysomitris spinus*, Sissen. Almindelig som Vintergjæst.
- Ligurinus chloris*, Svenske. Almindelig som ynglende.
- Cannabina linota*, Irisk. Som Trækfugl i stor Mængde.
- Pyrrhula vulgaris*, Dompap. Ses hver Vinter her som Trækfugl.
- Pinicola enucleator*, Krognæb. Skudt her en enkelt Gang.
- Loxia leucoptera*, Hvidvinget Korsnæb. Set her flere Gange.
- Loxia curvirostra typica*, Korsnæb. Almindelig her hver Vinter.
- Emberiza citrinella*, Gulspurv. Almindelig som ynglende.
- Emberiza miliaria*, Bomlærke. Yngler her, dog ej talrig.
- Emberiza nivalis*, Snespurv. En større Flok set en Gang paa Sydlandet.

At der herovre findes flere Arter, især blandt Sangere, Vade-fugle, Terner og Maager, er indlysende. Min Stilling fører med sig, at jeg maa leve her inde i Almindingen, langt fra Strand og Hav, og derfor giver den mig ingen Lejlighed til at iagttage Fuglelivet andetsteds paa Øen.

RØRDRUM (BOTAURUS STELLARIS), FOREKOMMENDE VED FAABORG.

AF

C. S. LARSEN.

Den store Rørdrum, der i ældre Tid forekom ret hyppigt her ved Faaborg i en Indsø, kaldet »Sundet«, var i en Aarrække forsvunden herfra, i det mindste hørte og saa man den aldrig. For 3—4 Aar siden viste den sig her igen, og der blev skudt nogle enkelte Eksemplarer af den. Efterat jeg nu har lejet Jagten paa »Sundet«, fredes imidlertid denne sjeldne og interessante Fugl.

Jeg vil først beskrive Lokaliteten. »Sundet« er c. 60 Tdr. Ld. stort, og heraf er hele Kanten i et flere Hundrede Alen bredt Bælte bevokset med Rør og Siv, ligesom der ogsaa rundt om findes mange Holme af disse Planter; der findes i Forhold til Arealets Størrelse kun meget lidt aabent Vand. Dybden er fra $\frac{1}{2}$ —c. 2 Alen, men Bunden er Dynd, og fast Bund kan ikke mærkes selv med lange Stænger. »Sundet« ligger umiddelbart op til Byens nordøstlige Side. Det siger sig selv, at der paa en saadan Lokalitet — tildels ufarbar — findes en ret rig Fuglefauna, og jeg nævner nedenfor de Arter, jeg i Øjeblikket husker at have set dér:

Graaand (*Anas boscas*), hyppig (et Aar fandtes et Kuld hvide).

Krikand (*Anas crecca*), hyppig.

Atlingand (*Anas querquedula*), hyppig.

Pibeand (*Anas penelops*), sjældnere.

Skeand (*Anas clypeata*), sjældnere.

Gravand (*Tadorna cornuta*) og toppet Skallesluger (*Mergus serrator*), ses af og til.

Graagaas (*Anser cinereus*), ynglende af og til.

Blishønen (*Fulica atra*) og grøn. Rørhøne (*Gallinula chloropus*), meget talrig, en mindre graaplettet Rørhøne ses af og til.