


Sjældne fugle på Færøerne i 1986 og 1987

SØREN SØRENSEN



(With an English summary: Rare birds in the Faeroe Islands in 1986 and 1987)

Rapport nr 16 fra Sjældenhedsudvalget

Indledning

I de to år, der er forløbet siden sidste sjældenhedsrapport for Færøerne (Boertmann et al. 1986), har Sjældenhedsudvalget (SU) færdigbehandlet godt 90 sager. De 80 sager, som er godkendt, er gennemgået og kommenteret nedenfor, og sidst i rapporten er også anført de sager, som er forkastet. Enkelte sager med vanskeligt bestemmelige underarter (se nedenfor) blev behandlet, uden at det var muligt at nå en endelig afgørelse. Disse er ikke medtaget i rapporten.

Den fortsatte stigning i antallet af sager er et glædeligt udtryk for interessen for Færøernes fugle, men som det fremgår af rapporten, skyldes stigningen ikke mindst, at Jens-Kjeld Jensen, Nólsoy, gør et værdifuldt og utrætteligt arbejde med at videreformidle en stor del af fundene til SU. På samme måde har han fungeret som kontaktperson til Føroya Fuglafrødisfelag. Det skal dog understreges, at sagerne naturligvis godt kan forelægges direkte til SU. Det sker ved at indsende oplysninger om fundomstændigheder, grundig beskrivelse af fuglen samt eventuel anden dokumentation, f.eks. i form af foto eller båndoptagelse.

Rapporten indeholder 6 nye arter for Færøer-

ne, 1 ny underart, samt 5 2.gangs- og 6 3.gangsfund. Desuden er der flere fund, der på spændende måde forøger vores kendskab til fuglenes forekomstmønster i det NØ-Atlantiske område. Dette skal sammenholdes med, at der i dag er mere viden om sjældne fugle på de skotske ø-grupper og Island, og det er søgt afspejlet i relativt fyldige kommentarer i gennemgangen.

Ved hver observation/fund er følgende nævnt: 1) Årstal og dato, 2) lokalitet og ø, 3) antal hvis der er flere end én, 4) køn, dragt og evt. adfærd eller fuglens tilstand, 5) finder/indsenders initialer, som er forklaret i en oversigt til sidst.

Følgende forkortelser og symboler er anvendt: Aldersangivelserne er ad. = adult (udfarvet, kønsmoden), imm. = immatur (ungfugl som har fældet sin første fjerdragt). Desuden kan alderen være angivet som 1k eller 2k, d.v.s. at fuglen er i sit 1. eller 2. kalenderår. Desuden: ringm. = ringmærket.

I sidste rapport (Boertmann et al.1986) og i Frågreiding frá FFFF nr 1, 1987, er der opstillet en liste over de arter og underarter, der skal forelægges SU til godkendelse før offentlig-

gørelse finder sted (SU-listen). Til denne SU-liste skal naturligvis nu føjes de arter/underarter, som med nedennævnte gennemgang indgår i den færøske fuglefauna. Som det fremgår af kommentarer i gennemgangen, er der to arter, der hermed udgår af SU-listen: Canadagås *Branta canadensis* og Skovhornugle *Asio otus*. Desuden skal det bemærkes, at flere af underarterne på SU-listen næppe kan godkendes blot ved forelæggelse af enkeltindivider, men måske nok ved særligt karakteristiske eksemplarer. Problemet opstår, hvis der er usikre eller overlappende bestemmelseskriterier mellem to nærtstående underarter. Af sådanne "kritiske" underarter kan fremhæves underarten af Ederfugl *Somateria mollissima borealis*, Dobbeltbekkasin *Gallinago g. gallinago*, Rødhals *Eritacus rubecula melophilus*, Sangdrossel *Turdus philomelos clarkei* og Gransanger *Phylloscopus c. collybita*.

Henvendelse til SU vedrørende Færøerne sker til: Søren Sørensen, SU, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, DK-1620 København V.

Systematisk gennemgang af de godkendte sager

Accepted records

Sortstrubet Lom *Gavia arctica* Stórlómur

1987: 19.10, Akraberg, Suduroy, 1k, IO, SS og LB.

Dette er første fund efter en udateret forekomst af lidt usikker oprindelse fra før 1860. Arten yngler nærmest på Ydre Hebrider og træffes om vinteren ved kysterne, også ved andre skotske øgrupper og sandsynligvis i stigende omfang (Thom 1986, Campbell & Talbot 1987).

Amerikansk Rørdrum *Botaurus lentiginosus*

Amerikanskur Mækjuglámur

1952: 12.11, Lamba, Eysturoy, sternum fra Niels á Botnis samling via JKJ.

JKJ gør opmærksom på, at dette fund fejlagtigt var henført til Nólsoy i seneste SU-rapport.

[Ross' Gås *Anser rossii* Amerikansk Snjógås]

Ca 1972: Ljósá, Eysturoy, fanget blandt tamgæs og derefter holdt i fangenskab, død i 1979, AR via JKJ.

Første fund af denne amerikanske art. Der findes ingen forekomster i Europa, der er anerkendt som spontane, men fritflyvende individer, undsluppet fra

fangenskab, er truffet flere gange. Fuglen her viste ingen fysiske tegn på ophold i fangenskab. Det er tankevækkende, at et par af arten, som stammer fra en britisk dyrepark, igennem 1960erne tilbragte sommeren på Island og vinteren i Skotland. Den ene af disse fugle blev fundet død i Skotland i januar netop i 1972, mens den anden ikke er fundet (Thom 1986). Den færøske fugl bar ikke ring, da den blev fundet, og de skotske var begge ringmærkede.

[Canadagås *Branta canadensis* Øshvít Gás]

1985 og 1986: juni/juli, Gróthúsvatn, Sandoy, par med 4 juv. (1985) og 6 juv. (1986), en række observatører bl.a. DB, SS og 2 DOF-grupper. Ringmærkning og ring aflæsning af DB i 1986.

1987: 12.3 1 og 19.3 2 vid Strond, Tórshavn, Streymoy, EM og PJ via JKJ. – 15.5, Gróthúsvatn, Sandoy, par med 7 juv. + par + 3 ad., og samme dag, Sandvatn, Sandoy, 4 ad., JKJ og PJ.

Dette er de første vildtlevende færøske ynglepar. De 2 stamfugle, som foreløbig har ynglet i 3 år, er begge mærket som pulli 1983 i Yorkshire, England. Det er overraskende, at den ekspanderende britiske bestand af oprindeligt undslupne fugle hermed har nået Færøerne før nogle af de skotske øgrupper. Arten udgår af SU-listen, men den videre etablering må følges med interesse.

Gravand *Tadorna tadorna* Tjaldursont

1987: 15.-18.5, Skálafjörður, Eysturoy, JM via JKJ.

Arten har tidligere været en noget hyppigere gæst. De 2 seneste fund er begge fra maj.

Skeand *Anas clypeata* Spónont

1987: 29.4, vid Strónd, Tórshavn, Streymoy, 2 hanner, EM via JKJ. – 30.4, 3.5 og 5.5, Hoyvíkstjørn, Tórshavn, Streymoy, han, JKP, HP, MG og PJ.

Muligvis er sidstnævnte en af de 2 fra 29.4, og de anførte fund er derfor her regnet som én forekomst. Udover 2 udokumenterede fund først i 1980erne har der nu været 3 forekomster.

Halsbåndstroland *Aythya collaris* Helsiont

1984: 20., 26. og 27.9, sø ved Vágur, Suduroy, juv., KDC, JR og SS.

Denne førstegangsagttagelse for Færøerne af endnu en amerikansk art kan ses i sammenhæng med en stigende registrering af arten i det meste af NV-Europa.

Kongeederfugl *Somateria spectabilis*

Ædukongur

1981: marts, Morskranes, Eysturoy, han ad., HN og JP via JKJ.

1986: 11.5, samme sted, han ad., JKJ, PJ og ET.

1987: 3.5, samme sted, han ad., JKJ, PJ og HN.

Det er sikkert samme stedfaste fugl alle år. Udover de ovenfor dokumenterede registreringer er det meddelt, at HN har set fuglen i flere forårsmånedes siden 1979. Fra Skotland kendes der tilsvarende tilfælde med årligt tilbagevendende Kongeederfugle (Thom 1986).

Strømand *Histrionicus histrionicus* Brimont

Ca 1981: Morskranes, Eysturoy, hun eller juv., HN via JKJ.

Dette 3. fund er en fotograferet fugl med meget usikker tidsangivelse.

Brilleand *Melanitta perspicillata*

Nakkahvít Kolont

1987: ult. juli - 15.9, Morskranes, Eysturoy, 2 hanner og 1 hun, CR og EMJ samt HN via JKJ.

4. fund af denne amerikanske art, der i Storbritannien optræder årligt i små antal, ikke mindst i vinterhalvåret. På Island, og altså Færøerne, er der typisk en del sommerfund (Pétursson et al. 1983, 1984, 1985, 1986).

Fløjlsand *Melanitta fusca* Spegilsont

1987: 2.1-11.3, Morskranes, Eysturoy, han og hun, HN via JKJ.

Dette er blot 6. kendte fund, selv om arten optræder som almindelig gæst i Skotland og er årlig på Island (Pétursson et al. 1983, 1984, 1985, 1986, Thom 1986).

Stor Skallesluger *Mergus merganser* Tannont


1982: 7.1-28.4, Selatrad havn, Eysturoy, han ad., HN via JKJ.

Iflg. HN skulle en ad. han også være set samme sted i foråret 1983.

Hvepsevåge *Pernis apivorus* Bývákur

1987: 24.9, Vágur og Akraberg, Suduroy, juv. udtrækkende sidstnævnte sted, SS og RA-FOS-gruppe.

3. fund. De 2 første var begge ad. fugle i forsommerperioder.



Fiskeørn. Foto: John Larsen.

Havørn *Haliaeetus albicilla* Havørn

Ca 1916: Efterår, Sundshagin, Vágur, skudt, JP og EH via JKJ.

Dette er seneste dokumenterede fund. Nyere jagtgælder har alle været vanskelige at bekræfte.

Spurvehøg *Accipiter nisus* Spurvaheykur

1986: april, Tvøroyri, Suduroy, han imm., JG via JKJ.

Dette er 5. færøske fund. De 3 har været i april/maj.

Fiskeørn *Pandion haliaetus* Fiskiørn

1986: pri. maj, Kaldbak, Streymoy, MJ via JKJ.

Dette er 6. forekomst. Bortset fra en juv. fugl fra efteråret er alle fra maj til starten af juni, svarende til fugle på forlænget forårstræk.

Lærkefalk *Falco subbuteo* Vákasmyril

1985: efterår, Hvalba, Suduroy, taget i pleje og senere død, RT via JKJ.

Færøernes 3. fund. Alle er inden for godt 4 år.

Vagtel *Coturnix coturnix* Vaktíl

1987: ca 18.6-13.7, bygden, Nólsoy, 2 hanner hørt, MG og JKJ.

I det seneste årti er der yderligere nogle få udokumenterede fund. I forrige århundrede var arten mere almindelig også på Færøerne.

Vandrikse *Rallus aquaticus* Jardarkona

1981: 18.2, Nólsoy, hun fundet død, JKJ.

1983: maj, Gásadalur, Vágur, fundet død, KS via JKJ.

1984: 1.4, Stokkvík, Nólsoy, fundet død, FJ via JKJ.

1986: 20.1, Gjógv, Eysturoy, fundet død, CS via JKJ.

1987: 20.10, Sumba, Suduroy, SS.

Arten er vanskelig at opdag og optræder måske årligt. – De 2 fund fra foråret er de første fra denne årstid, idet der er flest fund fra okt./nov., og nogle få fra selve vinteren. En tilsvarende fordeling af forekomsterne kendes fra de skotske øgrupper, hvor kontinentale fugle optræder uden for ynglesæsonen, og fra Island i det mindste i de senere år (Pétursson 1983, 1984, 1985, 1986, Thom 1986). – De gamle færøske fund, som findes i skindsamlingen på Zoologisk Museum, er alle tidligere bestemt til underarten *hibernans*, som skulle udgøre en isoleret ynglende form på Island (Salomonsen 1935 og 1963). SU mener, at såvel bestemmelsen af disse ældre eksemplarer som racespørgsmålet i det atlantiske område i det hele taget trænger til revision.

Plettet Rørvagtel *Porzana porzana*

Døggsmetta

1984: pri. okt., Tórshavn, Streymoy, fundet nyligt død, AR via FN.

4 ud af de ialt 5 fund er fra sep./okt.

Trane *Grus grus* Trani

1987: 21.5-ca 21.6, centrale del af Suduroy, bl.a. fotograferet ved Hov, SN, DH, AH og GP via JKJ.

Dette er 7. forekomst. En fugl, der berettes set på Svínø og Vidoy flere gange i juli måned, kan have været samme individ.

Stribet Ryle *Calidris melanotos*

Spølagrælingur

1987: 23. og 24.10, Akraberg, Suduroy, juv., SS, IO og LB.

2. færøske forekomst, og denne gang mere typisk i forhold til artens optræden i Storbritannien (Sharrock 1974). Førstefundet var i maj 1984 (Boertmann et al. 1986).

Lille Kobbersneppe *Limosa lapponica*

Lónspógvi

1985: 30.8, Sumba, Suduroy, han juv., fundet skadet derefter aflivet, GP via JKJ.

1987: 1.10, Vidareidi, Vidoy, juv., SS og RAFOS-gruppe.

Det er overraskende få forekomster i betragtning af, at der bl.a. er et mindre overvintringsområde så nær som Ydre Hebrider (Prater 1981). Fra den 72-årige periode 1905-76 kendes ikke et eneste fund fra Færøerne.

Mellemkjove *Stercorarius pomarinus* Jói

1985: 23.-27.10, ved Nólsoy, større invasion, via JKJ.

Denne masseforekomst var nævnt i seneste SU-rapport. JKJ påpeger, at forekomsten dér er sat for højt. Korrekt er 2-300 fugle.

Hvidvinget Terne *Chlidonias leucopterus*

Vonghvít Svartterna

1987: 11.10, Sandargerdi, Tórshavn, Streymoy, juv., SS.

2. forekomst på Færøerne af denne gæst fra SØ-Europa, som er årlig men yderst fåtallig i Storbritannien. Enkelte af de britiske fund er endnu senere end denne (Sharrock 1974).

Lomvie *Uria aalge* Lomvigi

Med karakterer som Sydlig Lomvie ssp. *albionis*:

1982: 29.12, havnen, Nólsoy, han aflivet, MiK via JKJ.

1984: 10.3, 3 sømil Ø for Nólsoy, han skudt, WJ via JKJ.

1985: 9.1, havnen, Nólsoy, 2k fundet død, JKJ.

Dette er de første kendte Lomvier fra Færøerne, der har vist karakterer svarende til den lysere gråsorte underart *U.a.albionis*. Denne findes sydligst i udbredelsesområdet og går i SV-Skotland gradvist over i *U.a.aalge*, som også udgør den færøske ynglebestand. Fra ringmærkningen kendes der foreløbig 48



Stribet Ryle. Akraberg, 23. oktober 1987. Foto: Ivan Olsen.

fund i færøske farvande af skotske fugle (JKJ in litt.), men fugle fra *albonis'* britiske yngleområde bevæger sig mod S uden for yngletiden (Cramp et al. 1985).

Gøg *Cuculus canorus* Geykur

1987: 17.8, Víkarbyrgi, Suduroy, juv. fundet afkræftet, senere død, AP via JKJ.

Kun 3. fund i de sidste 85 år, idet arten tidligere optrådte noget hyppigere. De fleste fund er fra perioden maj-juli.

Skovhornugle *Asio otus* Kattugla

1985: 28.10, Vágur, Suduroy, hun imm. fundet død, EP via JKJ. – 5.12, Nes, Eysturoy, fundet levende, senere død, SJ via JKJ.

1986: 11.2, Giljanes, Vágur, død ca ult. 1985, DN via JKJ. – 9.5, bygden, Nólsoy, fundet nylig død, TJJ via JKJ. – 3.8, Vidarlund, Tórshavn, Streymoy, fundet længe død, BP, HP og FV via IO.

1987: 17.4, Hoyvík, Streymoy, fundet nylig død, MWP via JKJ. – Ca 10.11, Vágur, Suduroy, 1k fundet død var ringmærket på rede 29.6 i Gävle, Sverige, via JKJ.

Hermed har udvalget behandlet 9 fund alene fra årene 1984-87. De viser et forekomstmønster, der fordeler sig dels på sent efterår/tidlig vinter og dels på forår/sommer, og dette svarer nogenlunde til de ældre fund. Der kendes således ingen levende fugle i dette århundrede fra januar/februar eller fra august/september. – Arten er med 1988 taget af SU-listen.

Digesvale *Riparia riparia* Bakkasvala

1987: 24.9, 2 og 25.-27.9 1, Sumba, Suduroy, heraf ad. ringm., SS og RAFOS-gruppe. Sjælden gæst, der senest er set i 1970.

Jernspurv *Prunella modularis* Jarnspurvur

1985: 16.7, Vidarlund, Tórshavn, Streymoy, SS og DOF-gruppe. Fuglen sang angiveligt på stedet i det mindste fra 26.6.

1987: 23.10, bygden, Nólsoy, ringm., JKJ. Hermed foreligger der ialt 10 fund, hvoraf halvdelen er fra sep./okt. De øvrige er fordelt over den øvrige del af året. – Særligt i betragtning af artens skjulte levevis må det tages for givet, at arten er underregistreret.

Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos*

Náttargali

1984: 5.10, Husar, Kallsoy, SS.

1. forekomst på Færøerne af denne gæst fra S eller måske snarere SØ. Omstændighederne muliggjorde ikke sikker bestemmelse til underart, men nogle af

de iagttagne karakterer sandsynliggør, at det var en af de østlige underarter, evt. *L.m.hafizi*. Denne er enkelte gange konstateret i Vesteuropa, bl.a. på Island og Fair Isle (Ævar Petersen in litt., Thom 1986).

Misteldrossel *Turdus viscivorus* Mistiltrøstur

1984: 26.9, nær Sumba, Suduroy, JR.

Dette fund er fejlagtigt angivet som forkastet i seneste rapport.

1987: 26.3 2 og 28.3 4, bygden, Nólsoy, JKJ.

Hermed foreligger der ialt 7 fund, som alle ligger inden for de nordeuropæiske Misteldrosslers træktid i det tidlige forår og sene efterår.

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*

Royljómari

1987: 29.9, Sumba, Suduroy, 1k ringm., RAFOS-gruppe. – 22.10, bygden, Nólsoy, ringm., JKJ.

Dette er 5. og 6. fund. Bestemmelsen er dog særdeles vanskelig, når det ikke drejer sig om syngende fugle eller fugle i hånden. Især om efteråret er flere fugle derfor ubestemte.

Fuglekongesanger *Phylloscopus proregulus*

1987: 17.10, bygden, Nólsoy, han, død (taget af kat), JKJ.

Det er første færøske fund af denne efterårsgæst fra Sibirien og også foreløbig det mest nordvestlige i Europa. Sammenlignet med Hvidbrynet Løvsanger (se nedenfor) optræder den gennemgående lidt senere og ikke så nordvestligt i Storbritannien. Den er således langt sjældnere på Shetland end Hvidbrynet Løvsanger (Howey & Bell 1985, Shetland Bird Report 1984, 1985, 1986). Det kan nævnes, at arten optrådte invasionsagtigt i Vesteuropa i 1987, med bl.a. 19 i Danmark.

Hvidbrynet Løvsanger *Phylloscopus*

inornatus Uralljómari

1987: 20.10 2 og 21.10 1, Sumba, Suduroy, SS, IO og LB.

Denne østlige art er hermed registreret i 8 efterår med mindst 16 individer ialt. Ovennævnte er de hidtil seneste, men forekomsterne spreder sig kun over en måned: 20.9-21.10. Forekomstmønstret svarer igvrigt helt til det, der kendes i det øvrige NV-Europa (Baker & Catley 1987).

Gransanger *Phylloscopus collybita*

Grannljómari

Med karakterer som Sibirisk Gransanger ssp. *tristis*:

1987: 24.10, Sumba, Suduroy, ringm., SS,

LB og IO. – 15.11, bygden, Nólsoy, hun fundet død, JKJ.

Før disse er der kun et enkelt fund, men det skyldes især, at sikker bestemmelse til underart kræver fuglen i hånden (Svensson 1984).

Lille Fluesnapper *Ficedula parva* Smágrípur

1982: 26.9, Sumba, Suduroy, 1k, SS, HA, JCH.

1984: 24.9, Sumba, Suduroy, 1k ringm., SS og JR.

1987: 22.10, Sumba, Suduroy, 1k ringm., IO, LB og SS.

Ovennævnte udgør blot fund nr 2-4 efter det første på Nólsoy i sep. 1947. Arten er dog nok en overset, meget sparsom efterårsgæst på omvendt træk. Jvf. en regelmæssig efterårsforekomst i Skotland, hvor den visse år ligefrem optræder invasionsagtigt, f.eks. med 30-40 individer på Shetland i 1984 (Thom 1986, Shetland Bird Report 1984).

Træløber *Certhia familiaris*

1986: 23.7, Vidarlund, Tórshavn, Streymoy, skelet og fjerrester fundet, KDC.

Dette er første fund på Færøerne. – Selv om arten yngler sparsomt på Ydre Hebrider, er dette individ mere sandsynligt en gæst fra Skandinavien. På Shetland optræder skandinaviske fugle meget fåtalligt og uregelmæssigt om efteråret (Thom 1986).

[**Husskade** *Pica pica* Skjóra]

1987: 29.10, Tvøroyri, Suduroy, IO og LB. Set samme sted fra 31.1, hvor den fløj i land fra skib fra Norge, PJ, JG og RT via JKJ.

Første fund på Færøerne, men som det fremgår en "menneskestøttet", ikke-spontan forekomst.

Allike *Corvus monedula* Rókur

Med karakterer som Vestlig Allike ssp. *spermologus*:

1979: forår, Sumba, Suduroy, fundet død, RK via JKJ.

1987: 26.3, bygden, Nólsoy, JKJ og JøP. – 19.10, Akraberg, Suduroy, indtrækkende, LB, samme dag og 20.10, Sumba, Suduroy, LB, IO og SS.

De 3 fugle i disse fund har alle vist karakterer, der peger mod ssp. *spermologus*, der nærmest findes i Storbritannien. Nogle "udokumenterede" fugle fra de senere år har vist samme tendens. Alliker svarende til den skandinaviske underart *monedula* er hermed stadig kun kendt fra 2 fund i 1940erne, i en periode hvor Shetlandske ynglefugle forøvrigt blev bestemt til samme underart (Williamson 1945a, Fjeldså 1972).

Kun Alliker, der forsøges bestemt til underart, skal forelægges SU.

Stær *Sturnus vulgaris* Stari

Med karakterer som ssp. *vulgaris*:

1987: 13.-14.3, bygden, Nólsoy, han ringm., JKJ. – 24.3, bygden, Nólsoy, han ringm., JKJ. – 30.3, bygden, Nólsoy, han ringm., fundet død 31.3, JKJ.

Dette er 5.-7. fund af underarten fra kontinentet og det britiske hovedland. 4. fund (1979) var også en han i marts. Underarten optræder antageligt årligt, men er overset p.g.a. bestemmelsesproblemet.



Rosenstær. Mykines, 2. juni 1985. Foto: Karsten Larsen.

Rosenstær *Sturnus roseus* Reydstari

1985: 2.6, bygden, Mykines, ad., KL via FN.

7. forekomst af denne strejfgæst fra SØ. På Island har der til 1986 været 11 forekomster. Arten optræder tilsyneladende oftere i det nordatlantiske område fra Shetland til Island, end den gør f.eks. på det skotske fastland (Petersen 1984, Thom 1986).

Bjergirisk *Carduelis flavirostris* Íriskur

1987: 23.10, Sumba, Suduroy, ringm., IO og LB. – 25.10, Sumba, Suduroy, 3, SS og IO. – 27.10, Sumba, Suduroy, SS.

Udover nogle få ynglepar på Nólsoy 1938-47 kendes der ellers blot 6 fund, til trods for at arten yngler på alle de skotske øgrupper, og til trods for at også skandinaviske fugle kan dukke op. Mærkeligt nok skulle ynglefuglene på Nólsoy have været af underarten fra Skandinavien (Williamson 1945b). De nye oktoberfund er de første fra denne del af året.

Kærnebider *Coccothraustes coccothraustes***Kjarnbítur**

1986: 10.5, Vestmanna, Streymoy, JCS via FN.

1987: 20.5 til ca 27.5, Tvøroyri, Suduroy, RT. – 3.-5.6, Selastrad, Eysturoy, HN via KJK. Dette drejer sig om 2.-4. fund, alle fra samme del af foråret. På Shetland er der registreret usædvanlige forårsinfluks af arten i de seneste år (Shetland Bird Report 1985, 1986 og 1987).

Laplandsværpling *Calcarius lapponicus***Fjallasnóflugur**

1987: 26.9, Akraberg, Suduroy, ialt 4 heraf mindst 2 imm., SS. – 2.10, NØ for Kirkja, Fugloy, SS. – 3.10, Skardsvík, Fugloy, SS. Antallet af individer, der indgår i disse fund, er næsten på højde med, hvad der hidtil er registreret ialt. Arten forekom i usædvanlige antal på Fair Isle i samme periode (Fair Isle Bird Report 1987).

Forkastede sager fra 1986 og 1987**Records not accepted**

Kongeederfugl *Somateria spectabilis* 1985: 25.6, Gjøgv, Eysturoy, 2 hunner.

Kongeørn *Aquila chrysaetos* 1987: 24.6, Mykines, juv.

Ismåge *Pagophila eburnea* 1978: ult. nov., Nólsoy, 2.

Høgeugle *Surnia ulula* 1983: 15.11, Akraberg, Suduroy.

Sortrygget Vipstjert *Motacilla alba yarrellii* 1984: 19. og 21.4, Akraberg, Suduroy.

Observatører m.m.

AP Aksal Poulsen, AR Andrias Reinert, BP Bjarne Petersen, CR Carsten Rahbek, CS Christian í Stórustova, DB Dorete Bloch, DH Ditlev Hammer, DN Dánjal á Nesium, EH Esbern Hansen, EM Erik Mortensen, EMJ Erik M. Jacobsen, EP Evelyn Petersen, ET Erik Tjener, FJ Fritihof Jacobsen, FN Føroya Náttúrugripasavn, FV Flemming Volkersen, GP Gudmund Poulsen, HA Hanne Amiri, HN Hans Nielsen, HP Hanne Petersen, IO Ivan Olsen, JCH Jens Chr. Hansen, Jens Chr. Skaalum, JG Jógvan Gudmundsson, KJK Jens-Kjeld Jensen, JM Jónsvein Mikkelsen, JP Jógvan Poulsen, JØP Jørgen Poulsen, JPa Jákup Pauli, JR Jørgen Rabøl, KDC Kim Diget Christensen, KL Karsten Larsen, KS Katrina við Skípa, LB Leon Berthou, MiK Mikkjal Gulkleit, MJ Magnus Jacobsen, MG Marita Gulkleit, MWP Morten Winther Poulsen, PeJ Petra Jespersen, PJ Palle Jensen, RAFOS Royal Airforce Ornith. Soc., RK Regin Kristiansen, RT Rókur Tummasarson, SJ Sigfred Johannesen, SN Susan Nielsen, SS Søren Sørensen, TJJ Tummas J. Jacobsen, WJ William Jensen, ÁH Ása Hovgaard.

Summary**Rare Birds in the Faeroe Islands in 1986 and 1987**

In 1986 and 1987 the Danish Rarities Committee (SU) has dealt with 90 records from the Faeroe Islands, and of these 80 have been accepted. 6 species are new to the Faeroese list: Ross's Goose, Ring-necked Duck, Nightingale, Pallas's Warbler, Tree-creeper and Magpie (not spontaneous). A new subspecies is the southern race of Guillemot *U.a. albionis* of which 3 specimens have been collected in different winters. As a breeding species Canada Goose is new. It should be mentioned that of these Ross's Goose and Canada Goose are regarded as originating from British introduced birds, and both birds in the first pair of breeding Canada Geese were ringed in Yorkshire. Among the other records are 5 second-time and 6 third-time records.

The details given are 1) year and date, 2) locality and island, 3) number of birds if more than one, 4) other details, e.g. *død* = found dead, *ringm.* = ringed, 5) initials of observer(s).

The committee works in close cooperation with the ornithological society of the Faeroe Islands, Føroya Fuglafrødisfelag, but may be contacted directly: Søren Sørensen, SU, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, DK-1620 København V, Denmark.

Litteratur

Baker, J.K. & G.P. Catley 1987: Yellow-browed Warblers in Britain and Ireland, 1968-85. – Brit. Birds 80: 93-109.

Boertmann, D., S. Sørensen & S. Pihl 1986: Sjældne fugle på Færøerne i årene 1982-85. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 121-130.

Campbell, L.H. & T.R. Talbot 1987: Breeding status of Black-throated Divers in Scotland. – Brit. Birds 80: 1-8.

Cramp, S. (ed.) 1985: The Birds of the Western Palearctic. Vol. IV. – Oxford Univ. Pr.

Fjeldså, J. 1972: Revision of the Systematic Position of Norwegian Jackdaws, *Corvus mone-dula* Ssp. – Norwegian J. Zool. 20: 147-155.

Howey, D.H. & M. Bell 1985: Pallas's Warblers and other migrants in Britain and Ireland in October 1982. – Brit. Birds 78: 381-392.

Petersen, Æ. 1984: Rósastari á Íslandi. – Bliki 3: 44-49.

Pétursson, G. & K.H. Skarphéðinsson 1983: Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 1981. – Bliki 1: 17-39.

Pétursson, G. & E. Ólafsson 1984: Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 1982. – Bliki 3: 15-43.

Pétursson, G. & E. Ólafsson 1985: Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 1983. – Bliki 4: 13-38.

Pétursson, G. & E. Ólafsson 1986: Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 1984. – Bliki 5: 19-46.

Prater, A.J. 1981: Estuary Birds of Britain and Ireland. – T. & A.D. Poyser.

Salomonsen, F. 1935: Aves. Pp. 1-269 i: Spärck, R. (red.): The Zoology of the Faeroes, vol. III, part II. – Høst & Søn, København.

Salomonsen, F. 1963: Systematisk oversigt over Nordens fugle. Bind 7 i Blædel, N. (red.): Nordens fugle i farver. – Munksgaard.

Sharrock, J.T.R. 1974: Scarce Migrant Birds in Britain and Ireland. – T. & A.D. Poyser.

Svensson, L. 1984: Identification Guide to European Passerines, 3rd edition.

Thom, V.M. 1986: Birds in Scotland. – T. & A.D. Poyser.

Williamson, K. 1945a: Recent Occurrences of Rare Vagrants and Passage Migrants in the Faroe Islands. – *Ibis* 87: 25-32.

Williamson, K. 1945b: Some new and Scarce Breeding Species in the Faroe Islands. – *Ibis* 87: 550-558.

Modtaget 5. juli 1988

Søren Sørensen
Bratskovvej 5
2720 Vanløse



Jagtfalk. Foto: John Larsen.