

Status for arter udgået af SU-listen

Stribet Ryle *Calidris melanotos* (65-66 fund af 68-69 fugle)

OLE AMSTRUP

Stribet Ryle *Calidris melanotos* er en sjælden trækfugl i Danmark. Arten yngler især ved kystnære tundraområder i det østlige Sibirien og Nordamerika. Den overvintrer hovedsagelig i Sydamerika og i mindre antal i Australien og New Zealand. I vore nabolande er der mange fund, således har Sverige og Norge henholdsvis over 150 og 100.

SU har godkendt 65-66 fund af 68-69 fugle. Stribet Ryle er relativ let at bestemme i felten, da arten har en tydelig kontrast mellem mørkstribet/-pletet bryst og hvid bug. Forveksling med andre arter kan dog forekomme, så ved godkendelse har SU lagt vægt på fuglens størrelse og jizz samt en forholdsvis detaljeret beskrivelse af både over- og underside, hovedtegning, samt benfarve

Forekomst


De første to fund stammede begge fra Amager ved København (S), hhv. 21/7 1950 og 4-6/5 1952. Det femte fund var først i 1985. Herefter var arten årlig



Geografisk fordeling af Stribet Ryle (n=65).



Foto: Ole Krogh.




Månedsfordeling af Stribet Ryle.

med undtagelser af 1988 og 1991, og antallet af fund har været jævnt stigende. Flest fund har der været i 2001 med 7-8 fund og 2005 med 7 fund. Ellers var der 6 fund i 1999 og 2004 samt 5 fund i 2000. Arten er således blevet mere almindelig, hvilket nok skyldes mere bevågenhed blandt ornitologer end fremgang for arten.

Det suverænt tidligste fund er fra 16-17/4 2005 Rærup, Vodskov (NJ). Ellers er der yderligere et fund i april. Hovedparten af forekomsterne findes i perioden maj-september med flest fund i juli (20) og maj (13). De seneste fund om efteråret er 17-18/10 1998 Flasken, Reersø (S) og 13/10 2004 Ny Frederikskog (SJ).

Stribet ryle er set i alle landets regioner bort set fra



Antal fund pr år af Stribet Ryle.

Bornholm. Arten træffes på brakvands- og ferskvands-lokaliteter, men typisk for arten er også, at den kan ses i små vandhuller og grusgrave. Herved har Stribet Ryle en jævn spredning over det meste af landet. Bedste lokaliteter er Agger Tange (NJ) og Sydamerger (S), begge med 5 fund. Den største forekomst var 3 1K-fugle sammen 14-20/9 2003 ved Ulvedybet (NJ). En af fuglene dukkede dog op den 9/9; derfor er forekomsten regnet som 2 fund af 3 fugle. Ellers har der været to forekomster med 2 fugle, 11/6 1992 Harboøre Tange (RK) og 23-26/5 2004 Sneum Engsø (RB).

Hovedparten af fuglene er angivet som 2K+/ad. Disse ses typisk fra april til august. Juvenile fugle er set fra 29/8-18/10.

Damklire *Tringa stagnatilis* (79 fund af 89 fugle)

OLE AMSTRUP

Damklire *Tringa stagnatilis* er en sjælden trækfugl i Danmark. Arten yngler i et bredt bælte fra Hvidrusland til Mongoliet. Der findes dog også enkelte ynglefund fra Sverige og Finland. Vinterkvartererne er Afrika (hovedsageligt syd for ækvator), den indiske halvø samt det sydøstlige Asien.

SU har godkendt 79 fund af 89 fugle. Ved godkendelse af beskrivelser af Damklire har SU lagt vægt på, at fuglen(e) er set godt. De vigtigste kriterier er størrelses-sammenligning med andre arter, de lange ben (især lang tibia) og tynde næb samt en beskrivelse af fuglen i flugt (især proportioner og oversidebeskrivelse).

Forekomst

De første fund var 10/5 1970 1 Borreby Mose (S) og 4/6 1972 1 Tissø (S). I 1983 havde landet det 7. fund, og herefter er arten stort set årligt med undtagelser af



Geografisk fordeling af Damklire (n=79).

Foto: Ole Krogh.




1985, 1992 og 1999. Antallet af fund har været jævnt stigende. Det bedste år har været 2001 med 11 fund. Ellers har der været 8 fund i 2005 og 6 fund i hhv. 1994, 2000 og 2002.


De tidligste fund er 19/4 1 1987 Korevlen (S) og 20-22/4 2004 2 Hølløse Bredning (S). Seneste fund er 14/10 1987 1 Nyord (LFM). I perioden juli-september er 27 fugle aldersbestemte. I juli var der 7 2K+/adulte fugle og 6 juvenile fugle. De sidste 14 fugle i august og september var alle juvenile. Tidligste juvenile fugle var allerede 14-19/7 2004 Majbølle Nor (LFM) og 22/7 2000 3 Løkkeby Enge (F).

Største forekomst har været 2-13/8 1994 4 1k Ølse-magle Revle (S) og 22/7 2000 3 1k Løkkeby Enge (F). Hovedparten af fundene ligger i månederne maj, juli og august med hhv. 18, 17 og 17 fund. Der har været nogle få langtidsstationære fugle, bl.a. 25/7-30/9 2005 Odense Fjord (68 dage) og 21/7-26/8 2001 Bøjden Nor (37 dage). For sidstnævnte lokalitet dukkede sandsynligvis samme fugl op i juli i både 2002 og 2003.

Damklire er set i alle regioner og på i alt 57 lokaliteter. Flest fund er der på Sjælland og i Nordjylland med hhv. 25 og 14 fund. Bedste lokaliteter er Hov Vig, Rørvig og Borreby Mose (begge S) samt Vesløs/Arup Vejle (NJ), alle med 4 fund.



Månedsfordeling af Damklire.



Antal fund pr år af Damklire.