


Sjældne fugle på Færøerne i 2001 og 2002

SØREN SØRENSEN og JENS-KJELD JENSEN



Rapport nr 33 fra Sjældenhedsudvalget

(With a summary in English: Rare birds in the Faroe Islands in 2001 and 2002)

Indledning

Rapporten indeholder de sager, som Sjældenhedsudvalget (SU) har færdigbehandlet i perioden 2001 og 2002. I alt er der godkendt 72 sager. De omfatter to nye arter, Lille Tårnfalk og Schwarz Løvsanger, og ny er også den amerikanske underart af Fjeldvåge. Præriemåge er truffet for anden gang. Desuden er Skeand fundet som ny ynglefugl. Der er også godkendt to nye arter, som vil indgå på den færøske liste som kategori E-fund, fordi forekomsten ikke er spontan.

De 72 sager er udtryk for en glædelig stigning i aktiviteten. Der er stadig regelmæssig registrering på Nólsoy, bl.a. med ringmærkning, men også f.eks. det vigtige søområde på Sandoy bliver nu oftere besøgt. Det er desuden positivt, at mange naturinteresserede fortsat henvender sig, f.eks. ved fund af døde fugle, som de ikke umiddelbart kender.

Ved hvert fund er nævnt: 1) årstal og dato; 2) lokalitet og ø; 3) antal, hvis der er flere end én; 4) evt. alder/dragt, køn, tilstand ved fundet; 5) observatør/finders initialer, som er forklaret i en oversigt til sidst. Finderen er angivet med en asterisk (*). Følgende forkortelser er anvendt: ad. = adult (udfarvet, kønsmoden); imm. = immatur (ungfugl som har fældet sin første fjerdragt); juv. = juvenil (ungfugl i sin første fjerdragt); ringm. = ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet: (1) antal fund og individer (adskilt ved en skråstreg) før 1950; (2) antal fund og individer 1950-2000; (3) antal fund og individer i denne rapport for

2001-2002. Antal fund kan afvige fra antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider samme dag regnes som fem fund. Der regnes også med flere fund, når et individ vender tilbage til samme lokalitet over flere år.

Sagsbehandlingen foretages fortsat af DOFs sjældenhedsudvalg (SU) efter aftale med Føroya Náttúrugripasavn (Naturhistorisk Museum i Tórshavn) og senere også Føroya Fuglafrøðifelag (FFFF). Kontaktperson for SU angående Færøerne er Jens-Kjeld Jensen. Indberetning af en sjældenhed består af oplysninger om omstændighederne for fundet, grundig beskrivelse af fuglen(e), samt eventuel anden dokumentation, f.eks. i form af foto eller båndoptagelse. Listen, som anfører de arter, der skal forelægges SU, er revideret i 2003 og kan f.eks. findes på SUs hjemmeside på internettet under www.dof.dk. Siden sidste SU-rapport udgår følgende arter: Skeand, Kongeederfugl, Stor Skallesluger, Vagtel, Trane, Polarlomvie, Sibirisk Gransanger og Dompap. Ny på listen er Thorshane.

Sidst i rapporten er anført sager, der ikke er godkendt. Indsendelse af rapporter til SU og alle henvendelser og forespørgsler kan ske til Jens-Kjeld Jensen eller Søren Sørensen på nedennævnte adresser.

Der skal rettes en tak til Marita Gulkklett, Kaj Kampp og Knud Pedersen, som har gennemlæst og kommenteret rapporten. Først og fremmest skal der dog være en stor tak til observatører og indsendere, der har skabt det nødvendige grundlag for rapporten.

Kategori A: Spontane forekomster

Category A: Species recorded in an apparently wild state

Gravand *Tadorna tadorna* Kápureyð Ont

(5/6, 6/7, 2/2)

2001: 26.5, Heimara Hálsavatn, Sandoy, *HJ (foto).

2002: 7.3, Skálabotnur, Eysturoy, *KT.

De fleste fund er fra foråret, typisk i april/maj. Arten yngler nærmest på de nordskotske øgrupper og er nyligt indvandret på Island med bl.a. 5 par i 1999 (Kolbeinsson et al. 2003).

Knarand *Anas strepera* Sutlont (0, 6/10, 1/2)

2001: 15.5, Sandsvatn, Sandoy, ♂ og ♀, *HJ (foto).

Som tidligere et forårs- eller forsommerfund, og typisk er det også et par.

Blåvinget And *Anas discors* Vongblá Ont

(0, 3/4, 1/1)

2002: 28.5, Hálsatjørn, Tórshavn, Streymoy, ♂, *JB, PMo m.fl. (video).

De foregående tre forekomster er fra november 1972 og 1980 samt fra juni/juli 1991.

Skeand *Anas clypeata* Spónont (0, 5/7, 2/9)

2002: 28.5, Hálsatjørn, Tórshavn, Streymoy, ♂, *JB, PMo m.fl. (video). – 1.6-2.8, Sandsvatn, Sandoy, 2 par og fra 12.7 ♀ med 4 pull., *JB, HJ m.fl. (foto).

Første ynglefund, og tilmed to par, hvoraf i hvert fald det ene fik unger. Mod nordvest yngler arten regelmæssigt omend yderst fåtalligt på Island. Til trods for, at de hidtil indrapporterede fund på Færøerne er overraskende få, er det nu besluttet at tage arten af SU-listen.

Taffeland *Aythya ferina* Hövuðreyð Ont

(2/2, 6/20, 1/1)

2002: 13.-22.2, Sandsvatn, Sandoy, ♂, *HJ (foto).

Overraskende nok er arten stadig en sjældenhed på Færøerne.

Kongeederfugl *Somateria spectabilis* Æðukongur

(-, 14/17, 4/4)

2001: 28.3-30.4, Hvalba, Suðuroy, ad. ♂, *VM (foto).

2002: 23-27.3, Nes, Eysturoy, ad. ♂, *NK og SiO (foto). – 17.6-24.8, Nólsoy havn, Nólsoy, 2K ♂, *JKJ og MG (foto). – 25.6-1.7, Hvannasund, Viðoy, ad. ♂, *PJS, JKJ og SH (foto).

Med fire fund er 2002 det hidtil bedste år. Samtidig må det konstateres, at fuglen ved Morskranes er væk efter



Skeand, Sandsvatn 2/8 2002. Foto: Jens-Kjeld Jensen. *Shoveler*.

mere end 20 år. Den blev senest rapporteret i 1998, men skal være set på stedet frem til maj 2001. Langt de fleste Kongeederfugle gennem tiden har været hanner i pragtdragt set i første halvdel af året. Men selv om hunner, ungfugle og fugle i eklipsedragt tilsyneladende forekommer meget sjældent, udgår arten af SU-listen fra og med 2003.

Strømand *Histrionicus histrionicus* Brimont

(0, 13/17, 2/3)

2001: 21.7, Kirkjubøur, Streymoy, ad. ♂, JKJ og MK (foto).

2002: 3.1 samt 26.3, Kirkjubøur, Streymoy, ad. ♂ og ♀, *SiO.

Der er altså fortsat to fugle, der periodevis holder til omkring Kirkjubø. De har optrådt siden 1990, og deres bidrag til sammentællingen giver et misvisende billede af denne ellers meget sjældne arts forekomst på Færøerne.

Brilleand *Melanitta perspicillata* Nakkahvít Kolont

(2/2, 2/4, 2/2)

2001: 29.5-17.6, Sandsvatn, Sandoy, ad. ♂, *HJ (foto). – 5.7, Sandavágur, Vágur, ad. ♂, *JC og *HT. Seneste fund var tre fugle i sommeren 1987, så i betragtning af hvor usædvanlig arten er kan man formode, at det her drejer sig om samme fugl. I sammenregningen er den dog talt som to forekomster.

Fløjsand *Melanitta fusca* Spegilsont (3/4, 2/3, 2/2)

2001: 5.7, Sandavágur, Vágur, 2K ♂, *JC og *HT.

2002: 16-20.6, Sandavágur, Vágur, ad. ♂, *JKJ og LS (foto).

Det er nærliggende at tro, at det har været samme individ begge år. Fløjsand er ellers senest set i marts 1987.

Stor Skallesluger *Mergus merganser* Tannont

(3/3, 13/19, 3/3)

2001: : 9-21.6, Sandsvatn, Sandoy, ♂, *HJ (foto). – 2.12, Mjáuvøtn, Streymoy, ad. ♂, *PMO (video).

2002: 22.3, Sandsvatn, Sandoy, ♂, *HJ (foto).
De 19 registrerede fund fordeler sig over vinter, forår og sommer, mens der stadig mangler fund fra efteråret. Selv om der ikke er dokumentation for det, må det antages, at arten er årligt forekommende, typisk som enkeltfugle, og den udgår fra og med 2003 af SU-listen.

Hvepsevåge *Pernis apivorus* Bývákur

(2/2, 3/3, 1/1)

2002: ca 1.10, havet øst for Nólsoy, 1K ♂ senere død, *JJ (foto).

Dette er anden gang, at en ungfugl er set om efteråret. De fire øvrige har været adulte i maj/juni.

Fjeldvåge *Buteo lagopus* Fjallvákur

Med karakterer svarende til Amerikansk Fjeldvåge ssp. *sanctijohannis* (0, 0, 1/1):

2002: 6.4, ved Kaldbaksfjørð, Streymoy, ad. fundet skadet og senere død, *RH (foto).

Fuglen blev fundet tilsølet, og den døde dagen efter. Overraskende viste en senere vask af skindet, at fuglen var usædvanlig mørk, svarende til en særpræget type af den amerikanske underart af Fjeldvåge (Jensen 2003). Det eneste kendte europæiske fund er fra Island 29-30. april 1980, ligeledes en fugl af meget mørk type (Petersen 1985). Fugle, som formodentlig har tilhørt den europæiske underart, er fundet to gange på Færøerne, henholdsvis i oktober 1931 og december 1974, mens en tredje fra 1975 ved en revurdering er blevet fundet utilstrækkeligt dokumenteret.

Fiskeørn *Pandion haliaetus* Gjødur (3/3, 8/8, 1/2)

2002: 20-21.5, Mjáuvøtn, Streymoy, 21.5 2 individer, *PMo m.fl. (video).

Det er første gang, at der er set mere end et individ. Fundene fordeler sig snævert på to perioder med 7 i maj/juni og 5 i september/november.

Lille Tårnfalk *Falco naumanni* Reyðsmýril

(0, 0, 1/1)

2001: august, Tórshavn, Streymoy, 3K+ ♂ fundet død, *AP (foto).

Ny art for Færøerne. Den blev indleveret til udstopning i februar 2002 og angiveligt fundet død i en have i Tórshavn engang i august 2001. Arten er hjemmehørende i Sydeuropa, og dette er det nordvestligste fund i Europa. Der er et fund fra Fair Isle i maj 1976.

Lærkefalk *Falco subbuteo* Vákasmyril (0, 3/3, 1/1)

2002: ca april, Hvalba, Suðuroy, 2K ♀ død, *JH (foto).

Desværre er tidsangivelsen ikke helt præcis, men det er givetvis den tidligste forekomst på Færøerne. De øvrige er fra juni, juli og "efteråret", alle i starten af 1980erne.

Vagtel *Coturnix coturnix* Vaktíl (-, -, 1/-)

2002: 2.6-5.7, Nólsoy, flere, *JKJ og *MG (audio).

Arten er kendt som uregelmæssig ynglefugl og er bl.a. beskrevet af Jensen & Kampp (1990). Registrering af Vagtler har fortsat stor interesse, men skal ikke længere godkendes af SU.

Trane *Grus grus* Trani (3/3, 9/9, 2/2)

2001: 14.5-13.6, flere steder på Sandoy, *JB, *HJ, *FL m.fl. (foto).

2002: 26.5, Saksunardalur, Streymoy, *PMo og *EM (video).

De fleste fund har været i maj/juni, og flere gange har en enkelt fugl opholdt sig i længere tid og har tilsyneladende bevæget sig omkring på flere øer. Fra og med 2003 skal arten ikke længere godkendes af SU.

Dværgryle *Calidris minuta* Dvørggrælingur

(2/2, 0, 1/1)

2002: 16.8, Borðoyarvík, Borðoy, *SiO.

Overraskende nok blot det tredje fund på Færøerne. De to første var i 1918 og 1937, begge i september. Til sammenligning er der t.o.m. 2002 17 fund på Island, også alle fra efteråret.

Lille Kobbersneppe *Limosa lapponica* Lónspógvi (8/8, 4/6, 1/1)

2002: 10-14.9, Sandsvatn, Sandoy, *HJ (foto).

Det første fund siden 1987, og totalen på blot 15 individer tyder på, at arten er overset. Til sammenligning er der rapporteret 262 på Island t.o.m. 1999 (Kolbeinsson et al. 2003).

Sortklire *Tringa erythropus* Svartstelkur

(0, 3/3, 1/1)

2001: 15.5, Heimara Hálsavatn, Sandoy, *HJ (foto).

Fjerde fund; i alt er der nu tre fra maj/juni og ét fra oktober.

Hvidklire *Tringa nebularia* Hvítstelkur (0, 2/2, 1/1)

2001: 25.5, Heimara Hálsavatn, Sandoy, *HJ (foto).

Tredje fund; de første var i juni 1957 og august 1984. Der er flere udokumenterede fund, og som i tilfældet med Sortklire forekommer det oplagt, at arten er underregistreret. Antallet af vadefuglelokaliteter – beskyttede lavvandede vige og småsøer – er begrænset på Færøerne, og regelmæssige besøg i den bedste tid vil givet kunne ændre det nuværende indtryk af forekomsterne.

Thorshane *Phalaropus fulicaria* Sundgrælingur (11/13, -/-, 1/1)

2002: 18.8, Norðskála, Eysturoy, *SiO.

Der har tidligere været formodning om, at arten ikke er

så sjælden, bl.a. baseret på forekomsterne før 1950. Den har derfor heller ikke stået på SU-listen. Men fundet fra 2002 er det første i en lang årrække, og arten er optaget på SU-listen fra og med 2002.

Præriemåge *Larus pipixcan* Heygsmási (0, 1/1, 1/1)
2002: 20.6, Nólsoy havn, Nólsoy, 2K, *JKJ, *FP og *OP (foto).

En amerikansk måge, som her optræder for anden gang. Ved det første fund 20/5 1976 var arten en stor sjældenhed i Europa. Siden er der gjort adskillige fund, i Storbritannien således 40 til og med 2001, og i det øvrige Europa et næsten tilsvarende antal (Rogers et al. 2002).

Sabinemåge *Larus sabini* Ternumási (3/3, 1/1, 2/2)
2001: 2.7, havet vest for Færøerne, subad./ad., *MJ (foto). – 3.7, havet vest for Færøerne, 2K+, *MJ (foto).

Disse to forskellige individer, med én dags mellemrum, udgør Færøernes femte og sjette fund. Også det fjerde, i 1988, blev gjort fra skib om sommeren.

Ismåge *Pagophila eburnea* Ísmási (20/20, 3/3, 1/1)
2000: ca 1.11, havet øst for Fugloy, 1K ♂ fanget, *JL (foto).

Det første dokumenterede fund siden 1980. De fleste stammer tilbage fra 1800-tallet.

Polarlomvie *Uria lomvia* Íslandslomvigi (-, 7/7, 2/2)

2001: 2.7, havet vest for Færøerne, *MJ. – 31.12, Svínoyarfjørður, skudt, *PJS.

Fuglen fra juli 2001 var ekstra sjælden ved at være en observation af en levende fugl. Fund af Polarlomvie er nemlig næsten altid sket i forbindelse med jagt. Omfanget af forekomsten er endnu uklart, men arten kan optræde hele året. Fra og med 2003 skal arten ikke mere forelægges SU.

Sneugle *Nyctea scandiaca* Snjóugla (15/15, 1/1, 1/1)

2001: 30.7, nord for Saksun, Streymoy, 2K ♂ eller ad. ♀, *KB, *BJ m.fl. (foto).

Hermed det andet dokumenterede fund efter 1900; det første gjaldt en død Sneugle fundet i efteråret 1990.

Vendehals *Jynx torquilla* Snúðurkriki (11/11, 8/8, 1/1)

2001: Nólsoy bygd, Nólsoy, fundet død 6.12, måske fra september, *PJ (foto).

I lighed med artens forekomst på Island er langt de fleste af fundene fra efteråret, typisk fra september.

Gul Vipstjert *Motacilla flava* Gulerla

Med karakterer svarende til Gulhovedet Gul Vipstjert ssp. *flavissima* (2/2, 2/2, 1/1):

2001: 9.5, Sandur, Sandoy, ♂, *HJ (foto).

Det er kun Gul Vipstjert bestemt til underart, der skal forelægges SU.

Bjergvipstjert *Motacilla cinerea* Áarerla

(1/1, 2/2, 1/1)

2001: 5.2, Vestmanna, Streymoy, ♀ fundet død, *JO (foto).

De fire fund er fra februar, juli og oktober (2). Tre af dem er gjort inden for de seneste ti år.

Hvid Vipstjert *Motacilla alba* Erla kongsdóttir
Med karakterer svarende til Sortrygget Hvid Vipstjert ssp. *yarrellii* (2/2, 2/2, 1/1):

2001: 9.7, Sandvatn, Sandoy, *SS og *IO.

Den første siden 1984.

Silkehale *Bombicilla garrulus* Reyðstapi (-, -, 1/1)

2001: 3.8, Kollafjørður, Streymoy, ad. fundet død, *ED (foto).

På Færøerne optræder arten i forbindelse med invasioner fra Skandinavien og normalt først meget sent på efteråret, og skal så ikke forelægges SU. Men denne fugl, taget af en kat, har også tidsmæssigt været på afveje.

Husrødstjert *Phoenicurus ochruros*

Dimmur velreyði (6/6, 1/1, 1/1)

2001: 21-27.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 2K+ ♂, *MS og *JKJ (foto).

På nær en enkelt forårsfugl har alle været fra sent efterår eller vinter.

Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata*

Svartstólpa (5/7, 2/2, 1/1)

2002: 12.10, Grøv ved Klaksvík, Borðoy, *SiO. Det nærmeste yngleområde er på Ydre Hebrider. De i alt 8 fund (de fleste omkring 100 år gamle) er gjort om foråret eller sent på efteråret, og passer med strejf/træk fra denne bestand. Til sammenligning er alle (!) 19 fund på Island (til og med 2000) fra foråret (Kolbeinsson et al., Birding Iceland's hjemmeside).



Præriemåge (2K), Nólsoy 20/6 2002. Foto: Jens-Kjeld Jensen. *Franklin's Gull*.



Schwarz Løvsanger, Nólsoy 18/10 2001.
Foto: Jens-Kjeld Jensen.
Radde's Warbler.

Misteldrossel *Turdus viscivorus* Diglutröstur
(0, 6/9, 1/1)

2002: 8.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K ♀ død, *EDa (foto).

De syv fund ligger omkring artens træktider om efteråret og i det tidlige forår.

Gulbug *Hippolais icterina* Gulljómarí (0, 4/4, 1/1)
2002: 23.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., *JKJ (foto).

Fire ud af fem fugle er fundet ved ringmærkning i bygden på Nólsoy. I alt er der nu 3 fra ult. maj – juni og 2 fra med. august – pri. september.

Fuglekongesanger *Phylloscopus proregulus*
Kongsljómarí (0, 2/2, 1/1)

2002: 3.10, Grøv ved Klaksvík, Borðoy, *SiO. Færøernes tredje og hidtil tidligste Fuglekongesanger. De to andre var 17/10 1987 og 1/11 1998. Bemærk, at den på Færøerne langt hyppigere Hvidbrynet Løvsanger nu ikke mere er på SU-listen.

Schwarz Løvsanger *Phylloscopus schwarzi*
Birkiljómarí (0, 0, 1/1)

2001: 18.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., *JKJ (foto).

Første fund på Færøerne af denne gæst fra det sydlige og centrale Sibirien. Arten er efterhånden en regelmæssig efterårsgæst i Vesteuropa, f.eks. med 235 fund i Storbritannien til og med 2001. De britiske forekomster har et udpræget sydligt tyngdepunkt, men netop i 2001 var der fem på Shetland, heraf to 14/10 (Rogers et al. 2002).

Lille Fluesnapper *Ficedula parva* Smánápur
(1/1, 4/4, 1/1)

2002: 13.10, Kunoy plantage, Kunoy, *SiO (foto).

Fem ud af de seks fund er fra efteråret, og det samme gælder alle 16 islandske fund.

Rosenstær *Sturnus roseus* Brandstari (5/5, 4/4, 6/6)
2001: ult. august, Tórshavn, Streymoy, ad., *AK m.fl. (foto).

2002: 25.6, Trongisvágur, Suðuroy, ad., *TV, *GV og *MV. – 13.8, Sørvágur, ad., *SM. – 22.8, Syðradalur, Streymoy, ad., *JJ. – 18.9, Klaksvík, Borðoy, juv., *AM (foto). – 5-6.10, Sandur, Sandoy, ad., *HJ (foto).

2002 gav rekordstor forekomst i hele Vesteuropa og altså fem godkendte fund på Færøerne, hvor der aldrig hidtil har været mere end ét i et kalenderår. De fem kan eventuelt omfatte gengangere, men der er yderligere nogle udokumenterede iagttagelser, så fem individer må være et absolut minimum for Færøerne i juni-oktober 2002.

Grønirisk *Carduelis chloris* Grönígða
(12/12, 3/3, 1/1)

2001: 16.1, Tórshavn, Streymoy, ♂, *JB m.fl. (video).

I alt fire fund i 1994, 1997 og 2001 skal ses i forhold til, at arten var helt fraværende i det forudgående halve århundrede. Alle tre islandske fund er fra 1997 og 1998.

Hvidvinget Korsnæb *Loxia leucoptera*
Vongblikut krossnev (2/2, 3/3, 1/1)

2002: 25.8, Kunoy plantage, Kunoy, *SiO.

Det første fund siden 1972. Ikke overraskende falder det sammen med en betydelig invasion, der i Sydskandinavien toppede netop i august.

Dompap *Pyrhula pyrrhula* Prýðisígða
(2/5, 7/10 ekskl. vinter 1994/95, 5/7)

2001: 20-24.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 2 ♀♀ heraf en ringm., *JKJ m.fl. (foto). – 25.10, Tórshavn, Streymoy, ♂, *PMo m.fl. (video). – 29.10-1.11, Nólsoy bygd, Nólsoy, ♂ ringm. 1.11, *JKJ (foto). – 29.10, Sandavágur, Vágar, *SE, ♂ taget i pleje, *SE (foto).



Karmindompap, Kunoy 26/5 2002. Foto: Jens-Kjeld Jensen. *Rosefinch*.

2002: 14-25.3, Argir, Streymoy, 2 ♀♀, *HES (foto).

Samlet udgør de fem fund den næststørste forekomst, kun overgået af invasionen i 1994/95, som blev vurderet til 80-100 individer. Dompap optræder, i lighed med f.eks. Silkehale og Lille Korsnæb, i forbindelse med invasioner i Skandinavien. Arten udgår fra og med 2003 af SU-listen.

Karmindompap *Carpodacus erythrinus* Röðafígða (0, 10/14, 3/3)

2001: 25.8, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., 1K, *JKJ (foto).

2002: 26.5, Kunoy bygd, Kunoy, ad. ♂, *MG og *JKJ (foto). – 13.9, Sumba, Suðuroy, 1K ringm., *WM (foto).

Tre fund, der ligger inden for rammerne af det kendte.

Kategori C: Fund af arter hvis bestande stammer fra udsatte eller undslupne fugle

Category C: Records relating to established feral breeding populations

Mandarinand *Aix galericulata* Seglont (3/4, 7/11, 1/2)

2001: 13-25.5, flere steder på Vágar, 2 ♂♂, *SP m.fl. (video).

Samtlige færøske fund gælder hanner i april/maj, og arten er set hvert år i perioden 1996-2001.

Kategori D: Mulige undslupne fangenskabsfugle

Category D: Possible escapes

Snegås *Anser caerulescens* Snjógås (1/1, 3/7, 2/2)

2001: 20.11-31.12 eller længere, Trongisvágur, Suðuroy, ad., *TV og BS (foto).

2002: 31.3, Porkeri, Suðuroy, ad., *LD.

De to fund formodes at gælde samme fugl, og i begge tilfælde var den bl.a. i selskab med tamgæs. Denne adfærd gør det oplagt, at den havde en oprindelse i fangenskab. Fugle, der som denne tilhørte nominatformen Lille Snegås, har flere gange sikkert eller yderst sandsynligt optrådt spontant i Vesteuropa, dvs. med nordamerikansk oprindelse. Men ingen færøske fund har helt overbevisende kunnet henføres til kategori A.

Kategori E: Sandsynlige eller sikre undslupne fangenskabsfugle

Category E: Likely or certain escapes

Sort Svane *Cygnus atratus* Svartur Svanur (1/1, 0, 1/1)

2002: 21.3-4.4, Vestmanna, Streymoy, 2K, *FJ og JKJ (foto), og formodentlig samme 15.4, Sandsvatn, Sandoy, *MH.

Denne australske art optræder hermed for anden gang, da en fugl opholdt sig på Vágar omkring 1937 (Williamson 1948). Den er anbragt i kategori E, også selv om yngel i naturen nu er velkendt i Vesteuropa.

Indisk Gås *Anser indicus* Indisk Gås (0, 0, 1/2)

2001: 14.5, Sandsvatn, Sandoy, 2 ad., *HJ, *JB m.fl. (foto).

Ny art for Færøerne, og i lighed med Sort Svane placeret i kategori E. Indisk Gås har sin naturlige udbredelse i Centralasien, men har også været indført og er fritlevende i Vesteuropa. Både Sort Svane og Indisk Gås er truffet nogle få gange på Island.

Amerikansk Sultanhøne *Porphyryla martinica* (0, 0, 1/1)

2002: 20.2, havet midtvejs mellem Newfoundland og Island, 2K ♀ på fiskeskib og bragt levende til Færøerne 24.2, *MN (foto).

Denne amerikanske fugl blev opdaget på et fiskeskib i internationalt farvand (53°21'N 37°02'W) og sejlede med til Kalsoy, hvor den kom i pleje. Den indgår i kategori E som ny for Færøerne. Blandt flere spontane fund i Europa er der to fra Island.

Forkastede sager

Records not accepted

Sortstrubet Lom *Gavia arctica* 2002: 24-28.5, Sandoy, 2. KapVerde-petrel *Pterodroma feae* 2001: 20.7, havet vest for Færøerne.

Polarlomvie *Uria lomvia* 2002: 27.12, Leirvík.

Gulbug *Hippolais icterina* 2002: 14.9, Klaksvík.

Lille Korsnæb *Loxia curvirostra* 2000: 11.7, Kunoy plantage, ynglefund.

Observatører

AK Andrea Klementsén, AM Abraham Mikladal, AP Alica Petersen, Ba Barbara, BJ Bette Johansen, BS Bergur Stórhamar, ED Emmely Djurhuus, EDa Eyðbjörn Danielsen, EM Erik Mortensen, FJ Finnboði Joensen, FL Friðleif Lydersen, FP Flemming Pedersen, GV Gunnar Vestergaard, HES Hans Eli Sivertsen, HJ Hanna Joensen, HT Hanne Tøttrup, IO Ivan Olsen, JB Jensine Boelstad, JC Jens Christensen, LDj Lars Djurhuus, JH Jens Hammer, JJ Jógvan Joensen, KJ Jens-Kjeld Jensen, JL Johan Lydersen, JO Jørgin Olsen, KB Kirstin Blom, KT Karl Thomsen, LS Lasse Sørensen, MG Marita Gulklett, MH Maja Horn, MJ Morten Jørgensen, MN Markus í Norðnástovu, MS Marnar á Skúr, MV Marin Vestergaard, NK Nils Kristensen, OP Ole Pedersen, PJ Petra Joensen, PJD Poul H. J. Debes, PJS Poul Johannes Simonsen, PMo Petur Mortensen, RH Rannvá Hansen, SE Sóleyð í Eyðansstovu, SH Sólbjörn Hansen, SiO Silas K. K. Olofson, SM Solok Mikkelsen, SP Sofus Poulsen, SS Søren Sørensen, TV Turid Vestergård, VM Vilmund Michelsen, WM Willy Mardal.

Summary

Rare birds in the Faroe Islands in 2001 and 2002

In 2001 and 2002 the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsudvalget/SU) accepted 72 records from the Faroe Islands. Two species were new to the Faroese list: Lesser Kestrel *Falco naumanni* and Radde's Warbler *Phylloscopus schwarzi*. A new subspecies was a very dark Rough-legged Buzzard identified as the North American *Buteo lagopus sanctijohannis*. An American Purple Gallinule *Porphyryla martinica* was brought to the Faroes from international waters southwest of Iceland by ship and added the category E list. Franklin's Gull *Larus pipixcan* was recorded for the second time, and a new breeding species was Shoveler *Anas clypeata*.

The details given are 1) year and date, 2) locality and island, 3) number of birds if more than one, 4) sex, 5) other details, e.g. død = dead, ringm. = ringed, 6) initials of

observer(s) with finders marked by asterisks. Documentation by photo (foto), video, audiotape or specimen (skind, død) is indicated. According to the AERC standard the numbers in brackets following the species name refer to the total number of records and individuals (separated by a slash) before 1950, from 1950 to 2000, and from 2001/2002, respectively.

Referencer

- Jensen, J.-K. 2003: A Rough-legged Hawk on the Faroe Islands. – *Birding World* 16: 20-21.
 Jensen, J.-K. & K. Kampp 1990: Vagtlen på Færøerne. – *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 84: 71.
 Kolbeinsson, Y., G. Thraínsson og G. Pétursson 2003: Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 1999. – *Bliki* 23: 21-49.
 Petersen, Æ. 1985: Nýjungar um flækingsfugla á Íslandi. – *Bliki* 4: 57-67.
 Rogers, M. J. and the rarities committie (2002): Report on rare birds in Great Britain in 2001. – *British Birds* 95: 476-528.
 Williamson, K. 1948: *The Atlantic Islands*. – Collins, London.

Antaget 2. oktober 2003

Søren Sørensen
 Bratskovvej 1 B, 1. th
 DK-2720 Vanløse
 Danmark

Jens-Kjeld Jensen
 FO-270 Nólsoy
 Færøerne