

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1997

PALLE A. F. RASMUSSEN



Rapport nr 27 fra Sjældenhedsudvalget

(With a summary in English: *Rare birds in Denmark and Greenland in 1997*)


Indledning

I denne rapport for 1997 er 225 sager for Danmark og Grønland færdigbehandlet, heraf 178 fra 1997. Ca 80% af de behandlede sager blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 75 og 85 de seneste fem år. Derudover har SU på opfordring fra lokalrapporternes redaktioner behandlet og godkendt 5 sager vedrørende arter, som er udgået af SU-listen, men som skønnes at være sjældne lokalt, og endelig har SU behandlet og godkendt et forårsfund af Fuglekongesanger *Phylloscopus proregulus*. Disse fund publiceres ikke i nærværende rapport, men i stedet i den landsdækkende årsrapport i DOFT og i lokalrapporterne; se Rasmussen (1997) angående denne nye praksis.

Den systematiske gennemgang og den regionale inddeling er som i den foregående rapport (Rasmussen 1997). Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immatur (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første fjerdragt efter pullusdragten), pull. = pullus (dununge), sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet tre tal: 1) antal anerkendte fund før 1. januar 1950; 2) antal

anerkendte og SU-godkendte fund fra og med 1. januar 1950 til og med 1996; 3) antal godkendte fund i 1997. Bemærk ændringen af opsummeringen i forhold til de seneste rapporter, hvor der nu skelnes mellem fund før 1.1 1950 (første tal i opsummeringen) og efter 1.1 1950 (andet tal i opsummeringen). Denne ændring skyldes en tilpasning til den standard som anbefales af AERC (Association of European Rarities Committees). I nærværende rapport har det dog af forskellige årsager ikke været muligt at gennemføre denne ændring for følgende arter: Slangeørn, Steppehøg, Jagtfalk, Triel, Sneugle, Høgeugle, Ellekrage,



Regionsinddelingen anvendt i denne artikel.
Geographical regions of Denmark used in this report.



Hvidrygget Ryle ad., Ulfshale, Møn 27. maj 1997. Tegning: Niels Peter Andreasen.

Sydlig Blåhals, Hvidhalset Fluesnapper og Krognæb. For disse arter gælder derfor indtil videre den hidtil anvendte opsummering, hvor der skelnes mellem fund før 1.1 1965 (første tal i opsummeringen) og efter 1.1 1965 (andet tal i opsummeringen). Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag regnes som fem fund.

Som noget nyt er der fra og med denne rapport efter observatørnavnet oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (F), videofilm (V) eller båndoptagelse (B). Desuden er finderens ved hvert fund markeret med et asterisk (*) foran observatørnavnet. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne hvem finderens er, og der kan derfor i nærværende rapport mangle enkelte markeringer. Fremover bør man i beskrivelserne til SU angive finderens, her defineret som den eller de observatører, der var til stede, da fuglen blev opdaget.

Bagest i rapporten findes en liste over forkastede fund samt rettelser til tidligere SU-rapporter.

Godkendte sager

Fra 1997 godkendtes Sumpvibe og Sibirisk Allike som nye arter for landet. Andre bemærkelsesværdige iagttagelser fra 1997 var andengangsfund af Lille Skråpe, Lille Bjergand, Ørkendompap og Hvidkindet Værbling. Desuden var der rekordmange iagttagelser af Middelhavsskråpe og Rødrygget Svale, og flere iagttagelser af Amerikansk Tundrahjule. Endelig vil 1997 nok især blive husket for den enestående invasion og de efterfølgende yngleförekomster af Hvidvinget Terne. Som ny race for landet godkendtes endvidere Islandsk Vindrossel fra 1995.

Henlagte sager

Fra tiden frem til udgangen af 1997 henligger der 18 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlet. En liste over de henlagte sager er vist bagest i rapporten.

Hertil kommer sager vedrørende Sølvmåge af formerne *Larus argentatus cachinnans/michahellis* samt Sildemåge af formen *L. fuscus heuglini*. Som



Ørkenstenpikker 2K ♂, Nordenhuse, Fyn 19. marts 1997.
Foto: Søren Nygaard.

det har været nævnt i tidligere SU-rapporter forventes det ikke, at der bliver truffet afgørelser i disse sager i den nærmeste fremtid på grund af en generel stor usikkerhed om systematik og feltbestemmelse. Imidlertid er en artikel om feltbestemmelse af disse former under udarbejdelse af danske forfattere. Det forventes at denne artikel publiceres i DOFT, og SU vil i den forbindelse tage stilling til de forskellige formers forekomst og status herhjemme.

SU-listen

Fra og med 1999 skal Rødhalsed Gås *Branta ruficollis* ikke forelægges SU. Denne letbestemmelige art iagttages nu regelmæssigt herhjemme, især i de store gåseflokke, der opholder sig i Vadehavsområdet og langs den jyske vestkyst i vinterhalvåret. Efter genbehandling anerkendes landets eneste fund af Sortbrun And *Anas rubripes* ikke længere, og arten er hermed udgået af den danske liste. Til SU-listen, som blev publiceret i den seneste SU-rapport (Rasmussen 1997), føjes Guldspætte *Colaptes auratus*; et fund af denne art fra maj 1972 er godkendt af SU (Hansen et al. 1974), og er omtalt af Dybbro (1978), men mangler i Olsen (1992). Endvidere tilføjes ubestemt albatros, fregatfugl, skrigeørn og bjergløvsanger til listen over ubestemte fugle, som bør behandles af SU. Det skal desuden bemærkes, at SU også behandler hybrider, hvor der er SU-arter involveret, og hvor det skønnes at hybridiseringen har fundet sted i naturen. Se endvidere afsnittet Kategorier.

Kategorier

Som en tilpasning til AERC-standard inddeles de i

Danmark trufne fuglearter fra og med denne rapport i 5 forskellige kategorier. Definitionen for de enkelte kategorier er følgende:

A) Arter der betragtes som spontant optrædende og er truffet mindst én gang siden 1.1 1950; f.eks. Vibe og Amerikansk Pibeand.

B) Arter der betragtes som spontant optrædende, men kun er truffet før 1.1 1950; f.eks. Krave-trappe og Steppevibe.

C) Udsatte og undslupne arter som har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten herhjemme eller i andre lande; f.eks. Nilgås og Fasan.

D) Arter der ikke betragtes som spontant optrædende fordi det vurderes som mest sandsynligt, at de er undsluppet fra fangenskab eller på anden måde unaturligt har optrådt i landet; f.eks. Kalkungrib og Gulstrubet Værling.

E) Arter som med sikkerhed er undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet; f.eks. Dværsgnegås med farvering og Steppeørn med stropper.

SU vil fremover behandle fund af arter fra alle kategorier, og for at få så fyldestgørende et billede som muligt af de forskellige arters optræden herhjemme er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret. Der vil dog nødvendigvis forekomme tilfælde, hvor det må skønnes at et fund er uden større interesse, f.eks. fund af eksotiske arter fra Australien og Afrika (Sort Svane, Undulat, glansstære m.m.). Er man i tvivl om hvorvidt et fund bør behandles af SU, kan man kontakte udvalget.

Den officielle danske liste udgøres herefter af arterne i kategori A, B og C. Fund af arter i kategori D og E behandles også af SU, men publiceres særskilt bagest i SU-rapporterne.



Steppeørnskade 1K, Skagen 26.
november 1997.
Foto: Knud Pedersen.

Sjældenhedsudvalgets medlemmer

SU bestod frem til udgangen af 1997 af følgende: Erik Christophersen (sekretær, indtil foråret 1998), Jan Hjort Christensen, Henrik Knudsen, Henrik Haaning Nielsen, Klaus Malling Olsen, Knud Pedersen (sekretær), Brian Rasmussen, Palle A. F. Rasmussen og Ole Thorup. Erik Christophersen udtrådte af udvalget i foråret 1998 og Ole Thorup i efteråret 1998. Begge takkes for godt arbejde og mange gode og seriøse diskussioner. Som nye medlemmer er Troels Eske Ortvad og Kasper Thorup tiltrådt i foråret 1998 og Ole Amstrup i efteråret 1998.

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes Ole Amstrup, David Boertmann, Henrik Knudsen, Jan Hjort Christensen, Klaus Malling Olsen, Knud Pedersen, Brian Rasmussen, Kasper Thorup og Ole Thorup. Den største tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres observationer til SU og dermed skabte grundlaget for denne rapport.

Sjældenhedsudvalgets adresse er: Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V.

Systematisk gennemgang af de godkendte sager*Accepted records***Hvidnæbbet Lom** *Gavia adamsii* (4,156,-)

1985: 26.5, Nordstrand, Skagen (NJ), 2K rastende, senere trk., *Christian Leth.
Fra foråret 1985 er der tidligere godkendt 14 fund af Hvidnæbbet Lom ved Skagen, se Rasmussen (1996). Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU.

Kuhls Skråpe *Calonectris diomedea* (0,24,3)

1997: 28.7, Grenen, Skagen (NJ), 2 eks. trk., *Erik Holm Sørensen. – 17.9, Kikhavn, Hundested (S), trk., *Michael Trasborg. – 3.10, Blåvandshuk (RB), trk., *Kasper Thorup m.fl.

Middelhavsskråpe *Puffinus yelkouan* (1,17-18,7)

1997: 7.9, Ørhage (NJ), trk., *Lars Raunsgaard. – 9.9, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., *Henrik Haaning Nielsen m.fl. – 11.9, Grenen, Skagen (NJ), *Knud Pedersen, *Lars Hansen. – 13.9, Ørhage (NJ), trk., *John K. Kyed, *Jens Jørgen Andersen. – 15.9, Grenen, Skagen (NJ), 2 eks., *Knud Pedersen m.fl. – 19.9, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., *Thomas Varto Nielsen m.fl. – 7.10, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., *Finn Lund Henriksen, *Flemming Falk m.fl.

Med hele 7 fund af 8 individer er 1997 det hidtil bedste år for arten herhjemme. Det er bemærkelsesværdigt, at alle årets fund er fra Nordjylland. Se desuden kommentarer i Rasmussen (1997).

Lille Skråpe *Puffinus assimilis* (1,0,1)

1997: 18.6, Nordsøen, *Martin Vestergaard.
Den pågældende fugl blev iagttaget fra skib i den danske del af Nordsøen ca 300 km vest for Esbjerg. Det eneste tidligere danske fund er fra 18.9 1912, hvor en adult ♀ blev indsamlet i Skagerrak (Hørring 1942).

Arten yngler nærmest på øer i den mellemste del af Atlanterhavet, hvor den menes at være til stede størstedelen året. Arten kan imidlertid tænkes at være noget mere mobil end tidligere antaget. Den træffes blandt andet regelmæssigt ved de Britiske Øer, hvor der til og med 1995 foreligger omtrent 100 fund, flest mellem maj og oktober (Evans 1994, Rogers et al. 1995, 1996). Desuden er den truffet mindst 15 gange i Frankrig og 5 gange i Tyskland (Alström et al. 1991), hvorimod der ingen fund er fra f.eks. Norge og Sverige.

Den danske fugl fra 1912 samt 9 racebestemte fugle fra de Britiske Øer havde alle karakterer svarende til ssp. *baroli* (Hørring 1942, Evans 1994). Denne form yngler på Azorerne, Madeira og de Kanariske Øer, og det er nok udelukkende fugle herfra der lejlighedsvis optræder i de vesteuropæiske farvande.

Nathejre *Nycticorax nycticorax* (3,15,1)

1997: 13.6, Røgbølle Sø, Lolland (LF), 3K+, *Klaus Malling Olsen, *Anette Friis, *Jens T. Madsen.

Andet år i træk med fund af arten herhjemme.

Tophejre *Ardeola ralloides* (2,5,0)

1971: februar, Lammefjorden nær Holbæk (S), ad. fundet død, via Palle A. F. Rasmussen.

1995: 25.6, Grønningen, Fanø (RB), *Kim Fischer.

Fundet fra februar 1971 er omtalt af Dybbro (1978) og Olsen (1992), men er først nu behandlet og godkendt af SU. Den pågældende fugl var ringmærket som redeunge i juni 1963 i Kzyl-Agachskii reservatet i Sydrusland. Da den blev fundet i februar var fuglen allerede i delvis opløsning, så den er givetvis kommet til landet noget tidligere end fundtidspunktet angiver. Fundet fra 1995 er det første herhjemme siden 1987.

Knortegås *Branta bernicla*

Med karakterer svarende til Sortbuget Knortegås ssp. *nigricans* (0,5,1):

1996: 13.11, Indvindingen, Vester Vedsted (RB), ad., *Ole Thorup.

1997: 26.9-5.12, kyststrækningen mellem Voerså og Geraa, Sydøstvendssyssel (NJ), ad., *Palle A. F. Rasmussen, Terje Seidenfaden.

Med disse to fund er formen nu truffet tre år i træk her-

hjemme. Fundet fra Nordjylland i 1997 er i øvrigt det første uden for Sydvestjylland. Se endvidere kommentarer i Rasmussen (1997).

Rødhalsed Gås *Branta ruficollis* (6,21,5)

1996: 16-18.10, Filsø (RB), ad., Morten Benzon Hansen m.fl.

1997: 26.1, Ballum Enge (SJ), 2 eks., *Morten Benzon Hansen, Hans Harrestrup Andersen m.fl. – 28.1, 2 eks., Ballum Enge (SJ), *Søren Gjaldbæk, *Niels Larsen, *Michael Mosebo. – 29.1, Ballum Enge (SJ), *Jesper Nelby Kristiansen via Morten Benzon Hansen. – 30.1, 3 eks., Ballum Enge (SJ), *Morten Benzon Hansen m.fl. – 1.2, Ballum Enge (SJ), 2 eks.. *Morten Benzon Hansen, Martin Jessen, Orla Jessen m.fl. – 2.2, Astrup Enge, Skærbæk (SJ), *Søren Nygaard, *René Christensen (F). – 5.2, Ballum Enge (SJ), *Niels Larsen m.fl. (F). – 28.2, Ballum Enge (SJ), via Morten Benzon Hansen. – 1.3, Ballum Enge (SJ), 3 eks., *Morten Benzon Hansen m.fl. – 30.3, Rudbøl Kog (SJ), 2 eks., *Morten Benzon Hansen m.fl. – 17.11, Kilen, Struer (RK), 2 eks. trk., *Helge Røjle Christensen. Fundet fra 1996 er tidligere godkendt, men kun for 17.10 (Rasmussen 1997).

Forekomsten i Vadehavsområdet i Sønderjylland i 1997 omfattede mindst fem forskellige individer, som på grund af forskelle i dragten kunne adskilles fra hinanden. To fugle set sammen i dette område ved flere lejligheder gennem hele vinteren var givetvis et par, og regnes kun som ét fund i opsummeringen. I øvrigt er 1997 med 5 fund af 7 individer det hidtil bedste år for arten herhjemme.

Amerikansk Pibeand *Anas americana* (0,6,1)

1996: 15.4-25.5, Sønderland, Rømmø (SJ), ad. ♂, Morten Benzon Hansen m.fl.

1997: 19.4, Margrethe Kog (SJ), ad. ♂, *Martin Kviesgaard, *Egon Mogensén, *Stinne Aastrup. Fundet fra 1996 er tidligere godkendt, men kun for perioden 15.4-12.5 (Rasmussen 1997). Fundet fra 1997 er det andet fra Vadehavsområdet i Sønderjylland; de øvrige er fra Nordjylland (2) og Ringkøbing Amt (3). I øvrigt er det fjerde år i træk arten træffes herhjemme.

Pibeand/Amerikansk Pibeand *Anas penelope/ americana*

1997: 29.6, Sneum Sluse (RB), hybrid ♂ i fældning til eklipsestrag, *Klaus Malling Olsen m.fl. Det er første gang SU har godkendt et fund af denne type. Det pågældende fund understreger imidlertid, at der bør udvises stor forsigtighed ved bestemmelse af Amerikansk Pibeand herhjemme. I øvrigt skulle en hybrid Pibeand/Amerikansk Pibeand ♂ være set gentagne gange i Vadehavsområdet mellem oktober 1996 og oktober 1997, men SU har kun modtaget dokumentation for den ovennævnte dato.

Krikand *Anas crecca*


Med karakterer svarende til Amerikansk Krikand ssp. *carolinensis* (0,10,1):

1997: 1.5, Solbjerg Engesø, Kagerup (S), ad. ♂, Jan Hjort Christensen m.fl.

Helt usædvanligt sås der samtidigt på den samme lokalitet en Blåvinget And ♂. I øvrigt er det tredje år i træk formen optræder herhjemme.

Sortbrun And *Anas rubripes* (0,0,0)

Det hidtil eneste danske fund (Hammeren (B) oktober 1988) anerkendes efter genbehandling ikke længere, og arten er hermed udgået af den danske liste. Fundet er nævnt i Olsen (1992).



Carl Chr. Tofte, 28/4 1997.

Blåvinget And *Anas discors* (1,8,3)

1997: 26.4-14.5, Solbjerg Engesø, Kagerup (S), ad. ♂, Carl Christian Tofte m.fl. (F). – 18-22.5, Tryggelev Nor (F), ad. ♂, Søren Nygaard. – 30.5-13.6, Hindemaj, Haderslev (SJ), ad. ♂, Søren Nygaard, Michael Bladt, Knud Fredsøe, Michael Mosebo Jensen m.fl. (F).

Tre fund fra samme år er helt uhørt herhjemme, og de tre forekomster kunne tænkes at vedrøre det samme individ. Iagttagelserne er dog her regnet som tre særskilte fund. Der er kun ét tidligere fund uden for Jylland; 5.5 og 16.5 1981 Borreby Mose på Sjælland (Pedersen 1984). De jyske fund er fordelt med 4 i Nordjylland, 2 i Ringkøbing Amt og 3 i Sønderjylland. I øvrigt var de to fund, som blev omtalt i forrige SU-rapport (Rasmussen 1997), begge fra Sønderjylland; fundet fra 1995 var således det andet og ikke som angivet det første i Sønderjylland.

Hvidøjed And *Aythya nyroca* (4,19,2)

1992: 8.2-18.3, Haderslev Inderdam (SJ), ad. ♂, *Carsten Olsen, Morten Benzon Hansen m.fl.

1997: 27.4-1.5, Bunken, Skagen (NJ), ad. ♂, *Eigil Torp Olesen, *Jan Kahne, Knud Pedersen m.fl. (F). – 13.5-14.7, Vejlerne (NJ), ad. ♂, *Palle A. F. Rasmussen m.fl.

Fundet fra 1992 er tidligere godkendt, men kun for 18.3 (Frich & Nordbjærg 1994). Beskrivelserne sammenholdt med fotos viser, at de to fund fra Nordjylland i 1997 helt sikkert drejer sig om to forskellige individer.

Lille Bjergand *Aythya affinis* (0,1,1)

1997: 25.3-16.4, Harboør Tange (RK), ♀, *Pal-le A. F. Rasmussen, *Henrik Haaning Nielsen, Klaus Malling Olsen m.fl. (F).

Andet danske fund af denne nordamerikanske art; det første er fra Bygholm Vejle i Nordjylland, hvor en adult ♂ sås 5-7.5 1985 (Rasmussen 1996). Arten er til og med 1996 truffet omkring 30 gange i Europa, heraf ca 15 gange på de Britiske Øer (Evans 1996), men det eneste tidligere fund af en hun i Europa er fra november 1996 i England (Flumm 1996). Det første vestpalæarktiske fund af en hun er imidlertid fra de Kanariske Øer, hvor en hun sås på Tenerife fra november 1994 til februar 1995 (Clarke et al. 1995).

Brilleand *Melanitta perspicillata* (0,14,2)

1997: 20-22.6, Blåvandshuk (RB), ad. ♂, *Per Kjær, Søren Haaning Nielsen, Michael Bjerregaard m.fl. – 16.9-15.10, Blåvandshuk (RB), ad. ♂, *Henrik Mouritsen m.fl. – 5.10, Lild Strand (NJ), 2K+ ♂ trk., *Thomas Varto Nielsen.

De to forekomster ved Blåvand menes at dreje sig om samme individ, og er derfor kun regnet som ét fund i opsummeringen. Se i øvrigt kommentarer i Rasmussen (1996) vedrørende den geografiske og tidsmæssige fordeling af de danske fund.

Slangeørn *Circaetus gallicus* (-,17,2)

1997: 1.9, Stignæs (S), trk., *Torben Evald. – 26.9, Højerup, Stevns Klint (S), trk., *Tim Andersen m.fl.

Steppehøg *Circus macrourus* (15,52,4)

1997: 28.4, Nordstrand, Skagen (NJ), 2K+ ♀, rastende, senere trk., *Knud Pedersen, *Kurt Rasmussen m.fl. (F). – 25.5, Jydelejet, Møn (M), 2K+ ♀, *Peter Koch m.fl. – 26.5, Bødkermosen, Møn (M), 2K+ ♀ trk., *Jan Blichert-Hansen. – 2.6, Hellebæk Avlsgård, Hellebæk (S), 2K+ ♀ trk., *Steen Søgaard. – 29.6, Skallingen (RB), 2K ♀, *Klaus Malling Olsen m.fl.

Iagttagelserne på Møn 25.5 og 26.5 regnes kun som ét fund i opsummeringen, idet der givetvis har været tale om samme individ. Fire fund fra et enkelt år er flere end normalt, men dog ikke enestående; senest har der blandt andet været 7 fund i 1992 og 5 fund i 1993.

Ørnevåge *Buteo rufinus* (1,6,1)

1996: 15.8, Sønderho, Fanø (RB), 1K trk., *Kim Fischer. – 27.8, Bødkermosen, Møn (M), antagelig ad., *Per Schiermacker-Hansen, Freddy Jørgensen.

1997: 29.6, Lille Vildmose (NJ), antagelig ad., *Uffe Gjøl Sørensen, *Erling Krabbe, *Jens Fri-mer Andersen.



Ørnevåge, Lille Vildmose 29. juni 1997. Tegning: Jens Frimer Andersen.

Fuglen på Fanø i 1996 regnes som den samme, der tidligere er godkendt fra Blåvandshuk 12-15.8 1996 (Rasmussen 1997), og fundet er derfor ikke opsummeret. Som omtalt i Rasmussen (1997) skal de seneste danske fund nok ses i sammenhæng med, at arten træffes stadig hyppigere i f.eks. Østrig og Ungarn, især i perioden juni-august.

Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* (9,70-72,2)

1992: 31.5, Fakkebjerg, Sydlangeland (F), ad. trk., *Hans Lehrmann Ægidius.

1995: 12.9, Gedser Odde (LF), imm. trk.fors., *Thomas W. Johansen m.fl.

1996: 26.9, Fakkebjerg, Sydlangeland (F), imm. trk., *Jan Holm Jensen (F).

1997: 8-9.5, Rørvig (S), ad., *Erik Vikkelsø Rasmussen m.fl. – 1.6, Råbjerg Mose (NJ), ad. trk., *Erik Christophersen, *Lars Thorhauge Rask. Med iagttagelsen fra 1992 kommer totalen dette år op på 13 fund, det hidtil højeste tal herhjemme. Fuglen ved Gedser Odde 12.9 1995 kunne være identisk med den der tidligere er godkendt fra Hyllekrog på Lolland 15.9 1995 (Rasmussen 1997), men er dog her regnet som et særskilt fund. Fuglen ved Rørvig 1997 sås på trækforsøg sidst på eftermiddagen 8.5, hvorefter den gik ned til rast i området. Næste formiddag lettede den og trak kort efter mod øst.

Stor Skrigeørn *Aquila clanga* (3,37,1)

1988: 24.10, Højerup, Stevns Klint (S), 3K+ trk., *Kurt Willumsen, *Lennart Pedersen.

1997: 20.9, Dueodde (B), ad. trk., *Jens Christensen, *Tommy Kruse, *Per C. Pedersen.

Lille Skrigeørn/Stor Skrigeørn *Aquila pomarina/clanga*

1997: 9.5, Hellebæk Avlsgård, Hellebæk (S), trk., *Steen Søgaard, *Gert Østerbye m.fl.

Den pågældende fugl kunne være identisk med den Lille Skrigeørn, som forlod Rørvig ca tre timer tidligere samme dag.

Steppeørn *Aquila nipalensis* (0,15,1)

1997: 16.10, Højerup, Stevns Klint (S), 3K+ trk., *Troels Eske Ortvad m.fl. (F).

Den pågældende fugl er givetvis identisk med den fugl, der sås ved Falsterbo i Sverige 15-16.10 1997; på førstedagen sås den på trækforsøg, og dagen efter trak den ud kl. 12:40. Fuglen ved Stevns blev set trække ind ca kl. 13:15. Det er det første fund herhjemme siden 1992, hvor der blandt andet sås en indtrækkende fugl på samme lokalitet 7.9 (Rasmussen 1997).

Lille Tårnfalk *Falco naumanni* (2,3,1)

1997: 16.10, Klydesøen, Amager (S), ad. ♂ trk., *Morten Jørgensen.

De to seneste fund af arten herhjemme er fra 20.9 1986 ved Gedser Marinestation på Falster (Olsen 1988) og 11.5 1981 ved Rubjerg Knude i Nordjylland (Pedersen 1984). De tre øvrige fund er fra november 1944, juni 1945 og oktober 1956 (Salomonsen 1963). Fundet fra 1956 er af Salomonsen (l.c.) og Dybbro (1978) (men ikke af Olsen (1992)), nævnt som en mulig undsluppet fangenskabsfugl.

I oktober 1997 blev arten tillige truffet i Småland i Sverige, men her var der tale om en 2K ♂ (Gantlett 1998).

Jagtfalk *Falco rusticolus* (41,53,4)

1980: 23-31.12, Fanø (RB), 1K, *Kim Fischer.

1981: 5.2 og 21.2, Fanø (RB), 2K, *Kim Fischer.

1993: 8.10, Sønderho, Fanø (RB), 1K trk., *Kim Fischer. – 30.10, Sønderho, Fanø (RB), *Kim Fischer.

1997: 1.2, Svinø Strand, Svinø (S), 2K, *Lars Bardtrum, *Jens Bardtrum, *Bent Bardtrum. – 1.2, Gavnø (S), 2K, *Tim Andersen, *Jørgen Hulbæk Christiansen. – 20.4, Kvottrup Mose, Tilst (ÅH), 2K trk., *Svend Møller Jensen. – 14.10, Vest Stadiil Fjord (RK), 1K, *Jørgen Ballegaard, *Jens Ballegaard. – 15.11, Astrup Enge, Skærbæk (SJ), 1K, *Søren Nygaard, *Thor Bue Hansen, *Michael Bladt.

Iagttagelserne fra Fanø i december 1980 og februar 1981 vedrører det samme individ, og er kun regnet som ét fund i opsummeringen. Den trækkende fugl ved Sønderho på Fanø 8.10 1993 menes at være identisk med den der tidligere er godkendt fra Skallingen i Ribe Amt 15-30.9 1993 (Frich & Nordbjerg 1995), og fundet er derfor ik-

ke opsummeret. Endelig regnes iagttagelserne fra Svinø Strand og Gavnø på Sjælland i februar 1997 kun som ét fund. Derudover skal bemærkes, at fuglen fra Sønderho på Fanø 30.10 1993 ud fra beskrivelsen ikke sikkert kunne aldersbestemmes.

Triel *Burhinus oediconemus* (22,11,1)

1997: 19-21.11, Blæsbjerg, Vendsyssel (NJ), 1K, via Thorkil Duch (F).

Den pågældende fugl opholdt sig på en mark tæt ved en ejendom. Den 21.11 sås den i svækket tilstand, og senere samme dag blev den fundet død i ejendommens indkørsel.

Sortvinget Braksvale *Glareola nordmanni* (2,2,1)

1997: 18-19.5, Tipperne (RK), ad., *Ole Amstrup, Henrik Knudsen, Jens Ryge Petersen (F).

De kun fire tidligere fund herhjemme er alle fra Nordjylland, og de to seneste er begge fra Vejlerne; henholdsvis 14-23.6 1980 (Pedersen 1982, 1984) og 20-27.6 1987 (Olsen 1988).

Amerikansk Tundrahjgle *Pluvialis dominica* (0,2,4)

1997: 26.7, Lejodde, Korsør (S), ad. i sdr., antagelig ♂, *Jørgen Bech. – 2.9, Stensnæs (NJ), ad. i sdr., *Palle A. F. Rasmussen. – 4-16.9, Ølseagle Revle (S), 2K, *Knud Nielsen, Tim Andersen m.fl. – 21.9 og 24.9, Østerild Fjord og Hovsør Røn (NJ), 1K, *Henrik Haaning Nielsen, John Kristensen Kyed.

Med blot to tidligere forekomster herhjemme, henholdsvis august 1991 og august 1996, er fire fund fra samme år meget overraskende. Sammenlignet med artens optræden på de Britiske Øer, hvor den er truffet ca 200 gange (Rogers et al. 1996), er juli-fundet usædvanlig tidligt, mens fundene fra august og september passer bedre med det britiske fundmønster. I Sverige derimod er halvdelen af de i alt 10 fund til og med 1996 fra juli, og i juli 1997 sås arten desuden i Holland (Gantlett 1998).

Sibirisk Tundrahjgle *Pluvialis fulva* (0,7,0)

1993: 11.9, Borreby Mose (S), 1K trk., *Jørgen Bech.

Amerikansk/Sibirisk Tundrahjgle *Pluvialis dominica/fulva* (0,5,1)

1987: 9.8, Stignæs (S), ad. i sdr. trk., Morten Møller Hansen.

1997: 31.8, Ølseagle Revle (S), ad. i odr. trk., *Morten Jørgensen.

Fuglen ved Ølseagle Revle i 1997 blev iagttaget kun få dage før opdagelsen af den Amerikanske Tundrahjgle på den samme lokalitet. Ifølge beskrivelserne er der imidlertid ikke tale om den samme fugl.

Sumpvibe *Chettusia leucura* (0,0,1)

1997: 13-14.7, Tissø (S), ad., *Jytte Petersen, *Morten Ellis Petersen m.fl. (F). – 15.7-10.8, Borreby Mose (S), ad., *Jan Rasmussen, Michael Bladt, Stefan Stürup m.fl. (F).

Ny art for landet. De to forekomster drejer sig givetvis om samme individ og er kun regnet som ét fund i opsummeringen. I 1997 blev arten tillige bemærket flere andre steder i Europa; blandt andet blev formentlig det samme individ set på fire forskellige lokaliteter i Sverige inden for perioden 22.6-14.7. Derudover sås arten i Finland (maj), Polen (maj) og Ungarn (september), samt i Grækenland, hvor der var flere fund mellem april og september; heriblandt et fund af en flok på fire individer i juli (Gantlett 1998). I 1975 optrådte arten tilsvarende invasionsagtigt i Europa (Alström et al. 1991).

Den danske forekomst er sammen med de øvrige europæiske fund nærmere beskrevet af Ortvad (1997).

Hvidrygget Ryle *Calidris fuscicollis* (0,9,1)

1997: 27-30.5, Ulfshale, Møn (M), ad. i sdr., *Bo Netterstrøm, Niels Peter Andreasen, Per Schiermacker-Hansen m.fl. (F).

Arten er tidligere truffet to gange på Møn, begge gange ved Ulfshale i 1978; henholdsvis 17.7 (landets første) og 26.10 (Hansen 1978, Pedersen 1980). De øvrige danske fund er fordelt med 3 på Sjælland (1982, 1986, 1993) og 4 i Ringkøbing Amt (1984, 1985, 1990 2). Den månedlige fordeling er maj 2, juni 1, juli 4, august 1, september 1 og oktober 1.

Stribet Ryle *Calidris melanotos* (0,23,3)

1997: 2.6, Grønningen, Fanø (RB), *Kim Fischer. – 16-19.7, Kofoeds Enge, Amager (S), ad. ♂, *Preben Berg m.fl. – 10-21.8, Ulfshale, Møn (M), ad. ♀ i sdr., *Jan Eske Schmidt, *Andreas Bruun Kristensen, Per Schiermacker-Hansen m.fl. Fundet fra Ulfshale er det første fra Møn.

Prærieløber *Tryngites subruficollis* (1,13,1)

1995: 19.9, Bøtø Nor (LF), *Thomas W. Johansen, *Gert Green.

1997: 14.8, Borreby Mose (S), *Jan Fischer Rasmussen.

Langnæbbet/Kortnæbbet Sneppeklire *Limnodromus scolopaceus/griseus* (0,6,0)

1995: 7.9, Blåvandshuk (RB), trk., *Rasmus Strack.

1996: 23.8, Blåvandshuk (RB), ad. i sdr. trk., *Henrik Knudsen.

Stor Kobbersnepe *Limosa limosa*

Med karakterer svarende til Islandsk Stor Kobbersnepe ssp. *islandica* (0,1,2):

1997: 7.5, Tovsig, Tømmerby Fjord (NJ), ad. ♂ i sdr., *Kent Olsen, *Palle A. F. Rasmussen, Thomas Varto Nielsen. – 20.8, Kammerlusen (RB), ad. ♂ i sdr., *Ole Thorup m.fl.

Det første danske fund af denne race er fra 1995 og er kommenteret i Rasmussen (1997).

Damklire *Tringa stagnatilis* (0,37,5)

1990: 26.5, Havnø, Mariager Fjord (NJ), ad. i sdr., *Calle Ljungbjerg m.fl.

1997: 15.4, Sønderland, Rømmø (SJ), ad. i sdr., *Morten Benzon Hansen, Søren Nygaard. – 28.4, Ilbro Enge, Tårs (NJ), ad. i sdr., *Lars H. Mortensen. – 2.8, Hov Vig, Rørvig (S), *Erik Vikkelsø Rasmussen m.fl. – 28.8, Hov Vig, Rørvig (S), 1K, *Svend Aage Linderstrøm. – 29.9, Margrethe Kog (SJ), *Hans Harrestrup Andersen, *Mariusz Ostanski, *Niels E. Vedel.

Fundene fra Rømmø og Margrethe Kog i 1997 er de første fra Sønderjylland. Iagttagelsen fra Rømmø er den hidtil tidligste herhjemme; den næsttidligste er fra Korevlen på Sjælland 19.4 1987 (Olsen 1988). Den månedlige fordeling af de danske fund er: april 7, maj 12, juni 6, juli 5, august 9, september 2 og oktober 1.

Gulbenet Klire *Tringa flavipes* (1,1,1)

1997: 4-6.6, Læsvig, Vejlerne (NJ), *Thomas Varto Nielsen, Kent Olsen, Palle A. F. Rasmussen m.fl. (F).

Blot tredje danske forekomst; de to tidligere er fra henholdsvis efteråret 1912 ved Sønderborg i Sønderjylland (Salomonsen 1963) og 23.7 1982 ved Kalløgrå på Lolland (Boertmann et al. 1986). Bemærk, at et fund fra Skallingen i Ribe Amt 28.5 1987 efter genbehandling ikke længere anerkendes (Frich & Nordbjærg 1995).

Bonapartemåge *Larus philadelphia* (0,2,0)

1996: 7-8.3, Hirtshals Havn (NJ), 3K i odr., *Anders Østerby, Kurt Prentow m.fl.

Fundet vedrører det samme individ, som tidligere er godkendt fra samme lokalitet 7.11-3.12 1995 (Rasmussen 1997).

Hvidskægget Terne *Chlidonias hybridus* (0,13,0)

1992: 22-25.5, Bygholm Vejle (NJ), 4 ad., hvoraf de to udgjorde et par, som forsøgte at yngle, *Henrik Haaning Nielsen, *Palle A. F. Rasmussen m.fl. (F).

1996: 22.10, Harboør Tange (RK), 1K, *Palle A. F. Rasmussen.

Forekomsten fra 1992 er tidligere godkendt (Frich & Nordbjærg 1994), men først nu som yngleforsøg, i øvrigt det første herhjemme. Til trods for det korte ophold næde parret at bygge rede og parre sig, hvilket afgjort bør betragtes som et yngleforsøg. De øvrige to fugle udgjorde givetvis også et par, men yngleadfærd iagttoges ikke.

Høgeugle 2K, Bogø 18. januar 1997.
Foto: Michael Bayldon.



De fire fugle sås flere gange sammen, og forekomsten er derfor kun regnet som ét fund.

Fundet fra oktober 1996 er landets tredje fra det sene efterår; de to tidligere er begge fra Vejlerne i Nordjylland, henholdsvis 10-20.10 og 30.10 1987 (Olsen 1988) samt 25.10-6.11 1988 (Olsen 1989).

Hvidvinget Terne *Chlidonias leucopterus* (3,54,4 ud over invasionen i 1997)

1979: 23.5-4.6 og 11.6, Bygholm Vejle (NJ), par i yngleforsøg, via Helge Røjle Christensen.

1996: 6.8, Sønderho, Fanø (RB), 1K, *Kim Fischer.

1997: 20.8, Ølsemagle Revle (S), 1K trk., *Tim Andersen. – 22.8, Lønnerup Fjord (NJ) og 25-30.8, Bygholm Vejle (NJ), ad. i odr., *Thomas Varto Nielsen m.fl. – 28.8, Stensnæs (NJ), 1K trk., *Palle A. F. Rasmussen. – 30.8, Mandehoved, Stevns Klint (S), 1K trk., *Tim Andersen, Jan Fischer Rasmussen. Fundet fra 1979 er tidligere godkendt (Pedersen 1982), men først nu som yngleforsøg. Parret opholdt sig i en koloni af Sortterne *Chlidonias niger*, hvor de parrede sig og ivrigt hævdede territorium. Yngleforsøget blev imidlertid opgivet efter at kolonien var blevet præderet af en Trane *Grus grus*, og 11.6 sås kun hannen. Yngleforsøget bliver således det første herhjemme.

Ud over de fire godkendte fund fra august 1997 har SU godkendt invasionen i maj 1997 og yngleforsøgene i forbindelse med invasionen en bloc, og fund fra perioden 10.5-1.8 skal således ikke forelægges SU. Invasionen i Danmark og i de omkringliggende lande er omtalt nærmere af Thorup et al. (1997), og yngleforsøgene herhjemme i forbindelse med invasionen er beskrevet af Grell & Rasmussen (1997).

Slørugle *Tyto alba*

Med karakterer svarende til nominatformen ssp. *alba* (0,3 ud over invasionen i 1990/91,2):

1997: 27.3, Hasselholt, Vinderup (RK), ♀, fundet trafikdræbt, *Terje Seidenfaden, *Dennis Nielsen (F). – juli, Sønderjylland (SJ), ♂, *Bjarne Nielsen, *Klaus Dichmann.

Fuglen fra Sønderjylland yngede sammen med en ♀ af ssp. *guttata*, og parret fik udruget 4 unger. Kuldet blev imidlertid præderet af en husmår inden det blev flyvedygtigt. Det er første gang nominatformen er konstateret yngende herhjemme.

Sneugle *Nyctea scandiaca* (-,27,3)

1997: 5.1, Røsnæs (S), 2K ♂, *Torben Sebro. – 25.1, Avedøre Holme (S), imm. eller ad. ♀ trk., *Morten Jørgensen, *Michael Fink Jørgensen, *Poul Jørgensen. – 13.3-10.4, Dalmose, Skælskør (S), 2K ♂, Ivan Olsen, Søren Nygaard m.fl. (F).

De tre fund gør 1997 til det tredjebedste år for arten herhjemme i SU-perioden; de to største forekomster er fra 1990 med 7 fund 29.1-18.4, samt fra vinteren 1986/87 med 4 fund i perioden 22.12 1986-29.3 1987. Med de tre iagttagelser fra 1997 er der nu 9 fund på Sjælland i SU-perioden. De øvrige fund siden 1965 er fordelt med 18 i Jylland, heraf 13 ved Skagen, samt et enkelt på Bornholm.

Høgeugle *Surnia ulula*

(ca 30,32 ud over invasionen i 1983/84,0)

1996: 30.11-24.2 1997, Bogø (M), 2K, Klaus Malling Olsen m.fl. (F).

Ellekrage *Coracias garrulus* (-,20,1)

1997: 18-25.5, Østtøm (M), *Vagn Valentinussen, Per Schiermacker-Hansen m.fl. (F).

Et fund fra 1982, som er nævnt i forrige SU-rapport (Rasmussen 1997), er ikke som angivet det første fra Sønderjylland, men dog det første SU-godkendte fund herfra, idet et fund fra maj-juni 1971 ikke har været forelagt SU og heller ikke er omtalt af Rasmussen (1977).

Korttået Lærke *Calandrella brachydactyla* (0,22,3)

1995: 11.6, Grønningen, Fanø (RB), *Kim Fischer, Carsten K. Pedersen.

1996: 29.4, Sønderho, Fanø (RB), *Kim Fischer.

1997: 6.10, Sønderho, Fanø (RB), *Kim Fischer. – 26.10, Blåvandshuk (RB), trk., *Henrik Hanning Nielsen, *Søren Haaning Nielsen, *Jan Rasmussen. – 15.11, Langli, Ho Bugt (RB), *Jens Christian Friis Nielsen, *Max Ejvind Nitschke.

Fjerde år i træk med fund af denne art herhjemme. De ovennævnte forekomster er de første fra Sydvestjylland.

Rødrygget Svale *Hirundo daurica* (0,34,7)

1997: 15.5, Grenen, Skagen (NJ), trk.fors., *Lars Raunsgaard m.fl. – 17.5, Grenen, Skagen (NJ), 2 eks. trk.fors., *Troels Eske Ortvad, *Lennart Pedersen m.fl. – 22.5, Batterivej, Skagen (NJ), trk.fors., *Gunner Pedersen, *Finn Ennemark, *Peter Arp-Povlsen. – 24.5, Bygholm Vejle (NJ), *Palle A. F. Rasmussen, Helge Røjle Christensen m.fl. – 25.5, Hanvejle (NJ), *Henrik Haaning Nielsen, *Palle A. F. Rasmussen, *Kent Olsen m.fl. – 28.5, Hanvejle (NJ), 2 eks., *Kent Olsen, *Palle A. F. Rasmussen m.fl. – 8.6, Vesløs Vejle (NJ), *Ole Goldschmidt, Susanne Bruun, Helge Røjle Christensen.

Selv om flere af de ovennævnte fund kunne vedrøre de samme individer, har SU af forskellige årsager valgt at betragte alle årets forekomster som særskilte fund. Dermed er 1997 med 7 fund af 9 individer det hidtil bedste år for arten herhjemme; andre gode år har været 1988 med 6 fund og 1996 med 3 fund. Iagttagelserne fra Skagen 17.5 og Hanvejle 28.5 er de første herhjemme med mere end ét individ involveret. I øvrigt er det overraskende, at arten ikke blev iagttaget andre steder end i Nordjylland i 1997.

Bjergpiber *Anthus spinoletta* (0,21,8)

1995: 21.3, Tøndermarsken (SJ), sdr., *Lars Maltha Rasmussen, sdr. (F). – 20-22.12, Sønderho, Fanø (RB), vdr., *Kim Fischer.

1996: 19.11-11.4 1997, Bygholm Vejle (NJ), min. 6 eks. i vdr., hvoraf 2 eks. senere sås i sdr., *Palle A. F. Rasmussen, *Thomas Varto Nielsen, *Henrik Haaning Nielsen m.fl. – 20.12-21.3 1997, Arup Vejle (NJ), min. 2 eks. i vdr., *Palle A. F. Rasmussen, *Thomas Varto Nielsen. – 6.12, Årup Dambrug, Thy (NJ), 2 eks. i vdr., *Henrik Haaning Nielsen, *Thomas Varto Nielsen.

1997: 16-17.1, Gilleleje (S), vdr., *Jan Hjort Christensen m.fl. – 28.1, Aggersborg Vildtreservat (NJ), 2 eks. i vdr., *Thomas Varto Nielsen. – 15.2, Kyndby Vig (S), vdr., *Edith Nielsen, *Jan Haaning Nielsen. – 29-30.3, Strøby Enge, Stevns (S), 1 eks. i vdr. og 3-4 eks. i sdr., *Tim Andersen,

*Anita Petersen, *Thomas W. Johansen. – 20.11-16.12, Buttervej og Nederrose, Skagen (NJ), min. 20 eks. i vdr., *Henrik Haaning Nielsen, *Dennis Nielsen, *Thomas Varto Nielsen, Rolf Christensen m.fl. – 25.11, Tipperne (RK), vdr., *Henrik Knudsen. – 25.11 og 5.12, Stensnæs (NJ), 2 eks. i vdr., *Palle A. F. Rasmussen. – 27.12-1.1 1998, Elling Å's udløb, Frederikshavn (NJ), vdr., *Erik Holm Sørensen.

Arten er udgået af SU-listen fra og med 1998. Det synes nu, især på baggrund af forekomsterne de seneste vintre, at være veldokumenteret at arten forekommer som en regelmæssig vintergæst mellem oktober-november og april, i et antal som ikke berettiger artens tilstedeværelse på SU-listen. Arten ses stadig flere steder herhjemme, men de fleste fund og de største antal er fra Nordjylland, hvor Vejlerne, Skagenområdet og Gravlev Ådal synes at være faste overvintringspladser. Et samlet overblik over artens optræden herhjemme fås ved at sammenholde nærværende rapport med Rasmussen (1997), hvor der også findes yderligere kommentarer.

Bemærk, at opsummeringen var ukorrekt i forrige SU-rapport (Rasmussen 1997), hvor den skulle have været (0,4,7,5).

Gul Vipstjert *Motacilla flava*

Med karakterer svarende til Sorthovedet Gul Vipstjert ssp. *feldegg* (0,3,1):

1997: 12-13.5, Lund Fjord (NJ), ♀, *Kent Olsen, *Palle A. F. Rasmussen.

Det første fund herhjemme siden 1992, og det første af en ♀. Alle fire danske fund er fra Nordjylland, og det aktuelle er det tredje fra Vejlerne.

Citronvipstjert *Motacilla citreola* (0,10,1)

1997: 25-26.9, Højerup, Stevns Klint (S), 1K, *Tim Andersen, *Jørgen Hulbæk Christiansen, Jan Pedersen m.fl.

Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos* (2,50,1)

1996: 22.5-22.6, Ishøj Strand (S), syng. og iagttaget, *Robert Trojaborg, Ivan Olsen m.fl. (B).

1997: 24.5, Fællesskoven, Stevns (S), *Svend Aage Linderström.

Et fund fra maj 1984 på Christiansø (Boertmann et al. 1986) anerkendes efter genbehandling ikke længere. Opsummeringen er derfor ændret.

Blåhals *Luscinia svecica*

Med karakterer svarende til Sydlig Blåhals ssp. *cyanecula* (-,23,0):

1996: 22-24.4, Sønderho, Fanø (RB), ♂, syng., *Kim Fischer.

Vær opmærksom på at fund af Sydlig Blåhals stadig skal forelægges SU, hvilket også gælder for yngleområderne i Sønderjylland.

Blåstjert *Tarsiger cyanurus* (0,4,1)

1997: 28.9, Hanstholm Fyr (NJ), 1K ringm., *Jens Jørgen Andersen, Leo Salmonsens, John Kristensen Kyed m.fl. (F).

Andet år i træk med fund af denne art herhjemme.

Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata*

Med karakterer svarende til Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl ssp. *mauralstejnegeri* (0,27,0):

1996: 23.4, Sønderho, Fanø (RB), 2K+ ♂, *Kim Fischer.

Ørkenstenpikker *Oenanthe hispanica* (0,3,1)

1995: 23-26.11, Sønderho, Fanø (RB), ♀, *Kim Fischer m.fl. (F).

1997: 16-29.3, Nordenhuse, Nyborg (F), 2K ♂, *Bo K. Stephensen, Tim H. Hansen m.fl. (F).

Fundet fra 1995 er tidligere godkendt, men kun fra 25.11 (Rasmussen 1997). Fuglen fra marts 1997 havde karakterer svarende til den østlige form ssp. *melanoleuca*. De to øvrige danske fund er begge fra efteråret 1987 (Olsen 1988).

Nonnestenpikker *Oenanthe pleschanka* (0,3,1)

1997: 15.5, Batterivej, Skagen (NJ), ad. ♂, *Morten Christensen, Erik Christophersen, Knud Pedersen m.fl. (F).

De tidligere danske fund er fra Skagen 13.6 1991 samt Christiansø 27.10-7.11 1991 og 7.10 1992 (Frich & Nordbjærg 1993, Rasmussen 1997).

Rødstrubet/Sortstrubet Drossel *Turdus ruficollis*

Med karakterer svarende til Sortstrubet Drossel ssp. *atrogularis* (2,4,0):

1993: 10.10, Sønderho, Fanø (RB), 1K ♂, *Kim Fischer.

De øvrige danske fund er fra 1822, 1872, 1983, 1986 og 1991, og alle er fra november-december, bortset fra landets første, som er et udateret efterårsfund.

Vindrossel *Turdus iliacus*

Med karakterer svarende til Islandsk Vindrossel ssp. *coburni* (0,2,0):

1995: 24.10, Blåvandshuk (RB), ad. ringm., *Rasmus Strack m.fl. (F). – 1.11, Blåvandshuk (RB), 1K ringm., *Rasmus Strack m.fl.

De første godkendte fund herhjemme af denne race, der yngler på Island og Færøerne. Den overvintrer almindeligt på de Britiske Øer samt i Frankrig og på den Iberiske Halvø. Racen kan være overset herhjemme, idet den kun med sikkerhed kan bestemmes i hånden.

Flodsanger *Locustella fluviatilis* (3,88,-)

1985: 11.5, Hanvejle (NJ), syng., *Palle A. F. Rasmussen, John Pedersen.

Fund efter 1988 skal ikke forelægges SU.



Foto: Jens Jørgen Andersen.

Blåstjert 1K, Hanstholm 28. september 1997.

Buskrørsanger *Acrocephalus dumetorum* (0,22,3)

1997: 5-28.6, Christiansø (B), ringm. (5.6) og syng., *Jacob Sterup Andersen, Michael Johansen (F). – 6.6., Christiansø (B), syng. og jagttaget, *Jacob Sterup Andersen, Michael Johansen, Mogens Henriksen. – 4-8.7, Køge Sydstrand (S), syng. og jagttaget, *Tim Andersen m.fl. (F+B).

Hvidskægget Sanger *Sylvia cantillans* (0,29,2)

1996: 24.4, Sønderho, Fanø (RB), ♂, *Kim Fischer.

1997: 28.4, Langli, Ho Bugt (RB), 2K ♂ ringm., *Jens Hjerrild Hansen (F). – 20-22.5, Blåvandshuk (RB), ♂, syng., *Søren Haaning Nielsen, Henrik Knudsen, Bent Jacobsen m.fl. (V).

Sorthovedet Sanger *Sylvia melanocephala* (0,2,2)

1997: 4.5, Sønderland, Rømø (SJ), ♀, *Ole Thorup. – 22.5, Batteriskoven, Skagen (NJ), 2K ♂, *Rolf Christensen, Erik Christophersen m.fl. (F).

De to tidligere danske forekomster er fra henholdsvis Christiansø 1.6 1978 (Pedersen 1980) og Hvide Sande i Ringkøbing Amt 23.5 1982 (Boertmann et al. 1986). Begge fund vedrører hanner, som blev ringmærket. Det første drejer sig ifølge beskrivelsen i Pihl & Rabøl (1979) om en 2K ♂, hvilket ikke fremgår af Pedersen (1980).

Brun Løvsanger *Phylloscopus fuscatus* (0,28,1)

1997: 18.10, Klarskov, Vestsjælland (S), *Jørgen Bech.

Vestlig Bjergløvsanger *Phylloscopus bonelli* (0,13,0)

1995: 25.8, Sønderho, Fanø (RB), ad., *Kim Fischer.

Som omtalt i den forrige SU-rapport (Rasmussen 1997) betragtes den vestlige race *bonelli* og den østlige race *orientalis* af bjergløvsanger nu som to selvstændige arter, henholdsvis Vestlig Bjergløvsanger og Østlig Bjergløvsanger *Phylloscopus orientalis*. Imidlertid er ikke alle tidligere danske fund racebestemt, og indtil de er genbehandlet efter de nyeste bestemmelseskriterier omhandler opsummering derfor alle fund af bjergløvsanger herhjemme. Som det ser ud lige nu er imidlertid kun Vestlig Bjergløvsanger truffet i Danmark. Bemærk endvidere at SU også fremover behandler fund af bjergløvsangere, som ikke artsbestemmes.

Hvidhalset Fluesnapper *Ficedula albicollis* (18,145,5)

1996: 19.5, Nordby, Fanø (RB), ♂, *Kim Fischer.

1997: 5.5, Christiansø (B), ad. ♂ ringm., *Jacob Sterup Andersen, *Michael Johansen (F). – 5.5, Christiansø (B), 2K ♂ ringm., *Jacob Sterup Andersen, *Michael Johansen. – 10.5, Saltholm (S), ad. ♂, *Torben Sebro, *Niels Linnet. – 11.5, Kongelunden, Amager (S), ad. ♂, *Lars Thorhauge Rask m.fl. – 11.5, Christiansø (B), 2K+ ♀ ringm., *Jacob Sterup Andersen, *Michael Johansen (F). Arten er udgået af SU-listen fra og med 1998. Se i øvrigt kommentarer i Rasmussen (1996, 1997).

Rosenbrystet Tornskade *Lanius minor* (3,35,2)

1997: 25.5, Magleby og Ny Borre, Møn (M), ad. ♂, *Tim Andersen, Per Schiermacker-Hansen m.fl. (F). – 4.6, Flyndersø, Rørvig (S), antagelig ad. ♂, *Henning Vikkelsø Rasmussen m.fl. Tredje år i træk med fund herhjemme.

Sydlig Stor Tornskade *Lanius meridionalis* (0,2,1)

Med karakterer svarende til Steppetornskade ssp. *pallidirostris*:

1997: 19-26.11, Buttervej, Skagen (NJ), 1K, *John Pedersen, Knud Pedersen, Rolf Christensen m.fl. (F).

Tredje danske fund; de to første er begge fra 1996, se Rasmussen (1997).

Sibirisk Allike *Corvus dauuricus* (0,0,1)

1997: 12.4, Blåvandshuk (RB), ad. trk., *Per Kjær, *Søren Haaning Nielsen, *Lasse Strandgaard. Ny art for landet. Denne sibiriske art er før 1997 kun truffet ganske få gange i Europa, i april-juni: Finland (1883), Sverige (1985), Holland (1995) og Frankrig (1995). Det svenske fund er omtalt af Olsson (1988) og det hollandske af Meijer (1996). I 1997 sås arten tillige i Holland, hvor det samme individ blev set trække mod nord på tre forskellige

lokaliteter langs kysten i perioden 8-11.5 (Gantlett 1998). Denne fugl kunne være identisk med den danske. Det er også tænkeligt, at fundene fra maj 1995 i Holland og juni 1995 i Frankrig vedrører samme fugl.

Rosenstær *Sturnus roseus* (18,34,1)

1995: 13.9-5.10, Nordby, Fanø (RB), 1K, *Kim Fischer, Steen Brølling m.fl. (F).

1997: 6-15.6, Selbjerg Vejle, Bygholm Vejle og Kærup Holme (NJ), 2K+, *Kent Olsen, Thomas Varto Nielsen, Palle A. F. Rasmussen, Henrik Haaning Nielsen m.fl.

Ørkendompap *Bucanetes githagineus* (0,1,1)

1997: 2.6, Aflandshage, Amager (S), hunfarvet, *Preben Berg, Vagn Valentinussen (F).

Det andet danske fund; det første er fra Christiansø, hvor en han sås i perioden 22.6-3.7 1982 (Boertmann et al. 1986). Fra Nordvesteuropa foreligger der kun yderligere 10 fund, hvoraf hovedparten tidsmæssigt falder pænt sammen med de to danske forekomster: Sverige 2 (juni), Tyskland 1 (juli) samt de Britiske Øer 7 (maj-juni 5, august-september 2).

Krognæb *Pinicola enucleator* (-,16-23,1)

1997: 5.10, Skagen Nordby (NJ), ad. ♂, *Knut Erik Christensen.

Det hidtil tidligste fund herhjemme i SU-perioden; de næsttidligste er fra henholdsvis 12.10 1975 ved Skagen i Nordjylland (Pedersen 1980) og 12.10 1991 ved Solrød Strand på Sjælland (Frich & Nordbjærg 1993). De øvrige danske fund siden 1965 er alle fra perioden 2.11-14.3.

Hvidkindet Værling *Emberiza leucocephalos* (0,1,1)

1997: 18-19.10, Christiansø (B), ♂, *Rasmus Turin, Jacob Sterup Andersen m.fl.

Andet danske fund; det første er fra 1973, hvor en han sås ved Skjern i Ringkøbing Amt (Pedersen 1980). Arten optræder tilsyneladende stadigt hyppigere vest for udbredelsesområdet i den centrale og østlige del af Asien, fra Ural mod øst til Sakhalin, og der foreligger nu adskillige fund fra en lang række lande i Europa, de fleste fra efterårs- og vintermånederne, se f.eks. Alström et al. (1991) og Snow & Perrins (1998). Ret overraskende overvintrer arten tilsyneladende regelmæssigt i Italien, hvor der blandt andet i vinteren 1995/96 sås en flok på 40-50 individer, hvoraf 13 blev ringmærket (Corso 1996).

Ved bestemmelse af Hvidkindet Værling bør man være opmærksom på, at hybridisering med Gulspurv *Emberiza citrinella* er ret udbredt i den vestlige del af udbredelsesområdet, og hybrider mellem de to arter er flere gange truffet i Europa.

Pileværling *Emberiza rustica* (0,36,0)

1996: 22.9, Sønderho, Fanø (RB), hunfarvet, *Kim Fischer.

Dværgværling *Emberiza pusilla* (0,51,1)

1993: 21.4, Sloen, Fanø (RB), *Kim Fischer.

1997: 8.5, Ålebæk Strand (M), *Per Schiermacker-Hansen m.fl.

Hætteværling *Emberiza melanocephala* (0,14,1)

1997: 5.6, Mandø (RB), ad. ♂, *Niels Knudsen, *Keld Bakken m.fl.

Kategori D: Arter der ikke betragtes som spontant optrædende
*Cathery D (Possible escapes)***Kalkungrib** *Cathartes aura* (0,0,1)

1997: 1-3.6, Skagen (NJ), ad. trk.fors. og rastende, *Henrik Mouritsen, *Dennis Nielsen m.fl. (F) og 6.6, Kallesmærsk Hede (RB), trk., *Henrik Knudsen m.fl.

Første gang denne amerikanske art træffes herhjemme. Fuglen viste ingen tegn på tidligere fangenskab, og da spontan optræden, eventuelt via skibsassistance, ikke helt kan udelukkes, er fundet indtil videre placeret i Kategori D. Det samme er tilfældet med to fund fra de Britiske Øer (Henrik Mouritsen i brev). Det danske fund må eventuelt revurderes senere, f.eks. hvis der kan påvises en sammenhæng med forekomsterne ved Gibraltar og Tarifa i Sydspanien, hvor der i efterårene 1995, 1996 og 1997 angiveligt er set én eller måske to Kalkungribbe. De oplysninger SU indtil nu har kunnet fremskaffe om disse fund synes imidlertid at være behæftet med en vis usikkerhed, og de er derfor ikke anvendt i vurderingen af det danske fund.

Kategori E: Undslupne fangenskabsfugle*Cathery E (Certain escapes)***Dværgsnegås** *Anser rossii* (0,0,1)

1997: 7.2-7.3, Vejlerne (NJ), ad., *Palle A. F. Rasmussen, Henrik Haaning Nielsen, Albert Schmidt m.fl.

Denne nordamerikanske art er truffet flere gange i Europa, men ikke tidligere herhjemme. Bortset fra flere vinterfund i Holland siden 1985 af givetvis de samme 1-2 tilbagevendende individer, betragtes ingen af de europæiske forekomster indtil videre som spontane. Den danske fugl var helt sikkert undsluppet fra fangenskab, idet den var mærket med en farvering på det ene ben. Fra de Britiske Øer kendes der flere fund af helt sikre undslupne fangenskabsfugle, mens det danske tilsyneladende er det første fra det europæiske fastland.

Artens optræden i Europa, herunder spørgsmålet om spontanitet, er blandt andet behandlet af Scott (1995).

Gåsegrib *Gyps fulvus* (0,0,1)

1988: 8.5, Husby Sø (RK), *Christian Hjort m.fl. – 11.5, Esbjerg Havn (RB), trk., via Rolf Christensen. – 13-18.5, Fanø (RB), via Rolf Christensen.

I alle tre tilfælde drejer det sig om samme individ, som ca tre uger tidligere var undsluppet fra en rovfuglepark i Bayern i Sydtykland. Fuglen blev efter nogle dages ophold på Fanø indfanget og hentet tilbage til fangenskab.

Det er det første fund af arten herhjemme, hvor der med sikkerhed har været tale om en undsluppet fangenskabsfugl. De tre øvrige fund fra henholdsvis foråret 1858, maj 1985 og oktober 1986 betragtes alle som spontane (Olsen 1992). Fundet fra 1988 er tidligere omtalt af Olsen (1992), men er først nu behandlet og godkendt af SU.

Grønland**Stor Regnspove** *Numenius arquata*

1997: 7.7, Zackenberg, A.P. Olsen Land, Nordøstgrønland, *Hans Meltofte.

Det femte grønlandske fund; et fund fra 1980 var i øvrigt fra samme område (Boertmann 1994).

Bysvale *Delichon urbica*

1997: 3.7, Traill Ø, Nordøstgrønland, *Antti Below, *Paavo Hellstedt.

Der er kun tre tidligere grønlandske fund; det seneste er fra foråret 1989 (Boertmann 1994).

Endnu ikke færdigbehandlede sager*Records still under consideration by the committee*Dværgørn *Hieraaetus pennatus* 1992: 7.6, Nymindegab (RB), mørk fase.Lannerfalk *Falco biarmicus* 1993: 28.8, Sønderho, Fanø (RB), ad. ♂.Lille Tårnfalk *Falco naumanni* 1995: 19.8, Grønningen, Fanø (RB), 2K ♂.Jomfrutrane *Anthropoides virgo* 1973: Toftum, Rømhø (SJ). Rødhalset Ryle *Calidris ruficollis* 1997: 8.6, Agger Tange (NJ), ad. i sdr.Ringnæbbet Måge *Larus delawarensis* 1997: 2.10, Grønningen, Hvidbjerg Strand (RB), 1K.Stor Sorthovedet Måge *Larus ichthyaetus* 1986: 6.8, Grønningen, Fanø (RB), 3K (F). – 1994: 1.11, Esbjerg Havn (RB), 2K.Bonapartemåge *Larus philadelphia* 1989: 27.3, Esbjerg Havn (RB), 2K.Klippesvale *Ptyonoprogne rupestris* 1997: 13.6, Islands Brygge, København (S).Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata maurastejnegeri* 1994: 19-26.3, Blåvandshuk (RB), ♂ (F).Sibirisk Gærdesanger *Sylvia curruca blythi* 1984: 16.10, Blåvandshuk (RB), ringm. (F).

Ørkengærdesanger *Sylvia curruca minula* 1992: 20.10, Blåvandshuk (RB), 1K ringm. (F).
 Humes Sanger *Phylloscopus humei mandellii* 1990: 22.10-5.11, Christiansø (B), ringm. (F).
 Iberisk Sanger *Phylloscopus brehmii* 1997: 31.5-5.7, Fællesskoven, Stevns (S), syng. og iagttaget (B). – 22.6-16.7, Svanninge Bakker, Faaborg (F), syng. og iagttaget (B).
 Hvidhalset Fluesnapper *Ficedula albicollis* 1996: 25-27.5, Stenholt Indelukke, Grib Skov (S), 2K ♂ syng.
 Steppetornskade *Lanius meridionalis pallidirostris* 1997: 19.10, Præstø Fed (S).

Forkastede sager

Records not accepted

Kuhls Skråpe *Calonectris diomedea* 1996: 31.8, Sønderho, Fanø (RB), 2 eks. trk. – 1997: 11.4, Korshage, Rørvig (S), trk. 19.9, Gilleleje (S), 2 eks. 21.9, Hundested Fyr (S), 21.9, Ørhage (NJ).
 Lille Skråpe *Puffinus assimilis* 1997: 4.10, Blåvandshuk (RB), trk.
 Fregatfugl *Fregata* sp. 1994: 18.9, Ørhage (NJ), trk.
 Purpurhejre *Ardea purpurea* 1997: 7.6, Vesløs Vejle (NJ), imm. 14.6, Ulvedybet (NJ).
 Amerikansk Pibesvane *Cygnus columbianus columbianus* 1994: 10.12, Ulvedybet (NJ), ad. – 1997: 22.2, Østereng, Skovby (ÅH).
 Dværggås *Anser erythropus* 1994: 20.4, Sønderho, Fanø (RB), trk.
 Rødhalsed Gås *Branta ruficollis* 1993: 29.9, Sønderho, Fanø (RB), trk.
 Sortbrun And *Anas rubripes* 1988: 26.10, Hammeren (B), trk.
 Amerikansk Sortand *Melanitta nigra americana* 1996: 3.12, Sønderho, Fanø (RB), ♂.
 Slangeørn *Circaetus gallicus* 1997: 14.5, Mern, Sydsjælland (S), trk.
 Steppehøg *Circus macrourus* 1997: 6.6, Fakkebjerg, Langeland (F), 3K+ ♀ trk.
 Ørnevåge *Buteo rufinus* 1997: 8.5, Slettestrand (NJ), trk.
 Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* 1997: 9.5, Rødovre (S), trk.
 Stor Skrigeørn *Aquila clanga* 1997: 19.9, Kolding (VE), trk.
 Dværgørn *Hieraetus pennatus* 1997: 16.5, Ølene (B), mørk fase trk.
 Eleonorafalk *Falco eleonorae* 1997: 12.6, Nørrevang, Rørvig (S), trk.
 Slagfalk *Falco cherrug* 1981: 23.2-14.3, Sønderho, Fanø (RB), 2K. – 1995: 25-26.5, Skagen (NJ), trk.fors. – 1996: 1.10, Margrethe Kog (SJ), ad. 2.10 Ballum Forland (SJ), ad. ♂. 6-10.10, Sønderho, Fanø (RB), ad. ♂.
 Jagtfalk *Falco rusticolus* 1993: 17-18.9, Sønderho, Fanø (RB), trk. – 1997: 18.9, Sønderbjerg, Anholt (ÅH).
 Stribet Ryle *Calidris melanotos* 1993: 14.8, Borreby Mose (S).
 Islandsk Stor Kobbersneppe *Limosa limosa islandica* 1997: 2.8, Bygholm Vejle (NJ), ad. i sdr.
 Sildemåge *Larus fuscus heuglini* 1994: 1.11 og 22.11, Esbjerg Havn (RB), ad.

Rosenterne *Sterna dougallii* 1997: 24.7, Sønderho, Fanø (RB), ad. i sdr. trk.
 Rødrygget Svale *Hirundo daurica* 1997: 17.5, Gilbjerg Hoved (S), trk.
 Citronvipstjert *Motacilla citreola* 1995: 20.9, Gedser Odde (LF), ad. ♂ i sdr.
 Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos* 1984: 16.5, Christiansø (B), syng. (B). – 1997: 8.5, Anholt (ÅH), ringm. 22.5, Aflandshage, Amager (S), syng.
 Gærdesanger *Sylvia curruca* 1990: 17.3, Skovlunde (S), syng. og iagttaget.
 Schwarz Løvsanger *Phylloscopus schwarzi* 1997: 9.10, Hanstholm (NJ).
 Lundsanger *Phylloscopus trochiloides* 1990: 20.5, Jydelejet, Møn (M), syng. og iagttaget.
 Hvidhalset Fluesnapper *Ficedula albicollis* 1981: ultimo maj, Råmosen, Ballerup (S), ad. ♂. – 1997: 28.5, Anholt (ÅH), ♂.
 Korttået Træløber *Certhia brachydactyla* 1997: 8.5, Vandet Sø (NJ), ringm. (F).
 Steppetornskade *Lanius meridionalis pallidirostris* 1997: 7.12, Borreby Mose, Møn (M).
 Indisk Huskrage *Corvus splendens* 1996: 10.9, Horsens (VE).
 Krognæb *Pinicola enucleator* 1990: 7.4, Gilleleje (S), hunfarvet trk.
 Dværgværling *Emberiza pusilla* 1989: 11.9, Sønderho, Fanø (RB), trk.
 Gulbrystet Værling *Emberiza aureola* 1997: 6.6, Bramming (RB), ♂.

Summary

Rare birds in Denmark and Greenland in 1997

In 1997 the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsudvalget, SU) processed 225 records of which about 80% were accepted.

The main section of the report, Accepted records, includes species on the Danish list belonging to category A, B, and C, according to the AERC standard; species belonging to category D and E are treated after the main section, before the sections dealing with records from Greenland, records still under consideration, and records not accepted.

For each record the following details are included: 1) year and date, 2) locality (see map for regions), 3) number of individuals if more than one, 4) other details if known: sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transition plumage, K = calendar year, fundet død = found dead, ringm. = ringed, and 5) name of observer(s), with finders marked by asterisks. Where applicable, documentation by photo (F), video (V) or tape (B) is indicated.

The three numbers in brackets after the species name refer to, respectively, the total number of records (not individuals) in Denmark (1) before 1951, (2) from 1951 to 1996 incl., and (3) in 1997.

The present report adds two new species to the Danish list: White-tailed Lapwing *Chettusia leucura* and Daurian Jackdaw *Corvus dauuricus*. A new subspecies was Ice-

landic Redwing *Turdus iliacus coburni* (from 1995). Other remarkable occurrences in 1997 were second records of Little Shearwater *Puffinus assimilis*, Lesser Scaup *Aythya affinis*, Trumpeter Finch *Bucanetes githagineus*, and Pine Bunting *Emberiza leucocephalos*, and an unprecedented invasion of White-winged Black Tern *Chlidonias leucop-terus*, including several breeding attempts.

Referencer

- Alström, P., P. Colston & I. Lewington 1991: A field guide to the rare birds of Britain and Europe. – Domino Books Ltd.
- Boertmann, D., K.M. Olsen & B.P. Nielsen 1986: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i årene 1982, 1983 og 1984. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 35-57.
- Boertmann, D. 1994: An annotated checklist to the birds of Greenland. – Meddr Grønland, Biosci. 38.
- Dybbro, T. 1978: Oversigt over Danmarks fugle. – DOF, København.
- Clarke, T., J. Antonio Lorenzo Gutiérrez & J. King 1995: The Lesser Scaup on the Canary Islands: the first female for the Western Palearctic. – Birding World 8: 52-55.
- Corso, Andrea 1996: The Pine Buntings in Italy. – Birding World 9: 14.
- Evans, L.G.R. 1994: Rare birds in Britain 1800-1900. – LGRE Publications Ltd., Buckinghamshire.
- Evans, L.G.R. 1996: Lesser Scaups in Britain. – Birding World 9: 144-145.
- Flumm, D. 1996: The Lesser Scaup in Cornwall - the first female for Britain. – Birding World 9: 431-432.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1993: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1991. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: 231-241.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1994: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1992. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: 99-110.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1995: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1993. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: 101-110.
- Gantlett, S. 1998: 1997, the Western Palearctic year. – Birding World 11: 21-37.
- Grell, M. & L.M. Rasmussen 1997: Første ynglefund af Hvidvinget Terne *Chlidonias leucopterus* i Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 121-124.
- Hansen, E., Per Schiermacher Hansen & Bent Pors Nielsen 1974: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1973. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 68: 138-144.
- Hansen, P. S. 1978: Hvidrygget Ryle *Calidris fuscicollis* på Ulvshale, Møn, den 17. juli 1978. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 72: 221-224.
- Hørring, R. 1942: Om 6 for Danmarks Fauna nye Fuglearter. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 36: 40-54.
- Meijer, A.W.J. 1996: Daurische Kaww in Hollandse kuststreek in mei 1995. – Dutch Birding 18: 226-231.
- Olsen, K.M. 1988: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986 og 1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 81-100.
- Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: 131-149.
- Olsen, K.M. 1992: Danmarks Fugle - en oversigt. – DOF, København.
- Olsson, C. 1988: Klippkaja *Corvus dauuricus* för första gången anträffad i Sverige. – Vår Fågelvärld 47: 197-199.
- Ortvad, T.E. 1997: Sumpvibe på Sjælland. – DOF NYT 1997(4): 23.
- Pedersen, B.B. 1980: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1977 og 1978. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 74: 127-140.
- Pedersen, B.B. 1982: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1979 og 1980. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 76: 111-122.
- Pedersen, B.B. 1984: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1981. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 78: 81-92.
- Pihl, S. & J. Rabøl 1979: Sorthovedet Sanger *Sylvia melanocephala* - ny art for Danmark og Skandinavien. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 73: 247-248.
- Rasmussen, E.V. 1977: Danske forekomster af Hærfugl *Upupa epops* 1969-1975, Biæder *Merops apiaster* og Ellekrage *Coracias garrulus* 1970-1975. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 71: 37-42.
- Rasmussen, P.A.F. 1996: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1994. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: 141-152.
- Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og 1996. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 133-150.
- Rogers, M.J. & the Rarities Committee 1995: Report on rare birds in Great Britain in 1994. – British Birds 88: 493-558.
- Rogers, M.J. & the Rarities Committee 1996: Report on rare birds in Great Britain in 1995. – British Birds 89: 481-531.
- Salomonsen, F. 1963: Oversigt over Danmarks Fugle. – Munksgård, København.
- Scott, M. 1995: The status and identification of Snow Goose and Ross's Goose. – Birding World 8: 56-63.
- Snow, D.W. & C.M. Perrins 1998: The birds of the Western Palearctic. Concise edition. – Oxford University Press.
- Thorup, K., J.J. Madsen & T. Ortvad 1997: Hvidvinget Terne blev årets begivenhed. – DOF NYT 1997(3): 3-4.

Rettelser til SU-rapport nr 26, DOFT 91: 133-150, 1997

Amerikansk Krikand 1996: 16-17.4, Hjortlund Hede, Grindsted (RB) skal være *ad. han*.

Amerikansk Tundrahøjle 1996: 24.8, Nekso Sydsstrand skal være 24-25.8.

Prærieløber 1996: 17-21.5, Bygholm Vejle (NJ), 2 eks., dog kun ét eks. 17.5 skal være 17.5 2 eks., herefter kun 1 eks. til og med 21.5.

Fuglekongesanger: Fundet fra 1989 ved Fyns Hoved var allerede godkendt og publiceret i SU-rapporten for 1989 (Olsen 1991). Opsummeringen ændres derfor til (0, ca 85,-).

Gulirisk: Fuglen ved Skagen 30.11 1995 - 19.3 1996 var landets tredje og ikke andet vinterfund som omtalt, se Christensen & Søby (1998).

Antaget 22. august 1998

Palle A. F. Rasmussen
Svendsgade 6, 3. th
9000 Aalborg